Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung.)

373. L. albulata Schiff. (3465.) Nur ein Stück 31. 5. 12 Steffenshagen (P.). — Nach Spormann zuweilen sehr zahlreich aufden Ryckwiesen und bei Kieshof und Jeeser.

374. L. testaceata Don. (3471.) Nur zwei Falter: 7. 6. 30 Potthagen, 2. 7. 27 Wampener Wald (L.). — Nach Pietsch auch bei Kieshof 375. L. obliterata Hufn. (3474.) Nach Spormann bei Greifswald, Eldena, Potthagen, Kieshof, Jeeser.

376. L. luteata Schiff. (3475.) Ich fing nur ein 3 am 29. 5. 28 auf der Rehwiese im Elisenhain.

377. L. flavofasciata Thnbg. (3476.) Von Pietsch bei Kieshof erbeutet (Spormann).

378. L. bilineata L. (3481.) 11. 6. bis 1. 8. Greifswald-Stadt, Kieshofer Moor, Potthagen, Wampener Wald, Lubmin. f. infuscata Gmppb. unter der Stammform (L.).

infuscata Emppo. unter der Stammform (L.).
 L. sordidata F. (3485.) Ein Falter 26. 6. 14 Steffenshagen (P.). — Nach Spormann bei Greifswald (am Licht), Lubmin.
 L. autumnalis Ström. (3486.) 25. 5. bis 30. 6. Wampener Wald, Kieshof, Elisenhain, Potthagen, Goor bei Putbus. f. obsoletaria Schille neben dem Typus (L.).
 L. capitata H. S. (3488.) fand Pietsch im Mai und Juni 1898

bei Éldena.

382. L. silaceata Hb. (3489.) Ein Falter 5. 6. 30 Elisenhain (L.). — Hier auch schon von Pietsch festgestellt.
383. L. corylata Thnbg. (3491.) 22. 5. bis 8. 7. Potthagen, Steffenshagen, Kieshofer Moor, Wampener Wald, Stubnitz. Meist nicht selten. — Nach Spormann auch bei Jeeser und Ludwigsburg.

f. effusaria Stgr. Ein 9 8. 6. 27 Wampener Wald, ein weiteres Stück 9. 6. 30 Stubbenkammer (L.).

384. L. badiata Hb. (3494.) Von Pietsch sehr selten in Greifswald am Licht gefangen.

385. L. berberata Schiff. (3498.) Ein Falter am 31. 7. 25 im Kieshofer Moor (P.). Bisher in Neuvorpommern nur zweimal ge-

funden (Demmin, Splietsdorf [Spormann]).

386. L. comitata L. (3503.) Nur zwei Falter. Ein Stück Anfang September 1912 (P.) und ein \(\preceq 25.7.27 \) am Licht in Greifswald (L.). — Nach Pietsch bei Greifswald selten. — Prof. Peter fand die Art im August 1918 viel auf Hiddensoe an Echium vulgare L. und im August 1924 bei Koserow.

387. Asthena candidata Schiff. (3505.) Vielleicht in letzter Zeit übersehen. Nach Spormann nicht selten bei Greifswald, Grubenhagen, Potthagen, Kieshof.

388. Tephroclystia oblongata Thnbg. (3511.) Ziemlich häufig bei

Greifswald (Spormann).

389. T. pusillata F. (3535.) 24. 5. 12 Steffenshagen (P.), häufig am 7. 6. 30 bei Potthagen in Fichtenbeständen (L.). — Nach Pfau auch bei Buddenhagen. — Die Angabe I. E. Z. XXIII (1929), Seite 82 für Diedrichshagen ist zu streichen.

390. T. indigata Hb. (3537.) Ein & 13. 5: 28 an einer Kiefer bei Diedrichshagen (L.). — Pietsch fand die Art mehrmals bei

Jeeser (Spormann).

391. T. bilunulata Zett. (3538.) = strobilata Hb. nec Bkh. Nach Spormann bei Greifswald, Jeeser, Kieshof vereinzelt, doch nicht gerade selten, Ende Mai, Juni.

392. T. pimpinellata Hb. (3553.) Nach Spormann selten bei Greifs-

wald. Mai bis August.

393. T. assimilata Gn. (3559.) Von Pietsch bei Greifswald, Kies-

hof, Jeeser Mitte Juni bis Juli gefunden.

394. T. absinthiata Cl. (3560.) Bei Greifswald ziemlich selten (Spormann). — Angabe I. E. Z. XXIII (1929), S. 83 ist zu streichen.

395. T. vulgata Hw. (3569.) Ende April bis Juli nicht selten bei

Greifswald (Spormann).

396. T. trisignaria H. S. (3573.) Nicht selten bei Greifswald, Ende Juli (Spormann).

397. T. castigata Hb. (3575.) Mai, Juni, bei Greifswald, zuweilen häufig (Spormann).

398. T. subnotata Hb. (3580.) Von Pietsch mehrfach bei Greifswald gefunden. Juli

wald gefunden. Juli. 399. T. helveticaria B. (3592.) fand Pietsch im Juni bei Jeeser. 400. T. satyrata Hb. (3595.) Mai, Juni. Bei Greifswald meist

häufig (Spormann).

401. T. succenturiata L. (3600.) Von Mai bis Ende Juni ziemlich selten: Greifswald, Potthagen, Kieshof, Neuenkirchen (Spormann).

f. subfulvata Hw. und

f. oxydata Tr. unter der Art.

- 402. T. scabiosata Bkh. (3604.) Juni. Pietsch fand die Art vereinzelt bei Kieshof.
- 403. T. pygmaeata Hb. (3627.) Fliegt nach briefl. Mitteilung von Pfau am Rande des Buchwaldes bei Jeeser, im Juni. Von Plötz häufig bei Eldena gefangen. Anscheinend recht lokal in Pommern.

404. T. nanata Hb. (3634.) Pietsch fing die Art in Greifswald

(Spormann).

405. T. innotata Hufn. (3636.) Raupen ziemlich häufig bei Potthagen und Gristow im Herbst an Artemisia campestris L. gefunden. Falter von Mai bis Ende August (Spormann). f. fraxinata Crewe und

f. tamarisciata Frr. nach Spormann unter der Art.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Lommatzsch Wilhelm

Artikel/Article: Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald. 239-240