© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ein ♂ von Menado Celebes, dessen Vdfl.-Länge nur 36 mm beträgt; die Thoraxzeichnung ist hell kirschrot, die zwei nebeneinanderliegenden schwarzen Punkte darin sind groß.

Oberseite d. Vfl. verdunkelt mit schwacher Marmorierung.

Hinterfl. ohne die schwarze Discalbinde, der Basalfleck ist mattschwarz, die Außenrandbinde schmal, die Adern im gelben Discus treten hervor und sind schwarz.

Unterseite aller Flügel in der distalen Hälfte geschwärzt mit verloschenen Bindenzeichnungen bis auf den gelben Analteil der Hinterflügel.

Proserpinus proserpina Pall. bei Hamburg.

Zu dem Artikel „Wandernde Schmetterlinge" von Herrn Dr. A. Bergmann in Nr. 21 dieser Zeitschrift möchte ich bekannt geben, daß es meinem Sammelkollegen Herrn Laplace und mir gelang, am 16. August d. J. bei Geesthacht, einem Hamburger Orte nördlich der Elbe, zusammen 4 Raupen des Nachtkerzenschwärmers (*Proserpinus proserpina* Pall.) an Epilobium angustifolium zu finden. Der Fund ist um so bemerkenswerter, da meines Wissens diese Art noch nie hier gefunden wurde, und es sich daher um eine für die Hamburger Fauna vollständig neue Art handelt. Der nördlichste Punkt ihres Vorkommens lag bisher in der Umgegend von Magdeburg. Das Vorhandensein in hiesiger Gegend dürfte wohl mit dem in diesem Jahr besonders günstigen Flugwetter zusammenhängen, welches auch den hier sehr seltenen Wolfsmilchschwärmer (*Deilephila euphorbiae* L.) wieder nach Hamburg geführt hat. Die Raupen dieses Schwärmers wurden von den Herren Strauß und Laplace an derselben Oertlichkeit gefunden.

Gustav Stück, Wandsbek/Hamburg.

Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung.)

425. *Ellopia prosapiaria* L. (3720.) Nur ein Falter 29. 6. 24 Steffenshagen (P.). — Nach Spormann in Neuvorpommern sehr spärlich, von Pfau häufiger gefunden.

426. *Metrocampa margaritata* L. (3723.) 28. 6. bis 21. 7. Meist nur vereinzelt gefunden. Guester Moor, Wrangelsburg, Putbus, Stubnitz (hier 1918 häufig) (P.).

427. *Ennomos autumnaria* Wernb. (3725.) 19. 8. bis 8. 10. Greifswald (Anlagen), Elisenhain, Kieshofer Moor, Rosental,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Stück Gustav

Artikel/Article: Proserpimis proserpina Pall, bei Hamburg. 278-279