Von links nach rechts:

1. Reihe: niphona Butler of. Nagasaki Japan;
niphona Butler of. Nagasaki Japan;
niphona Butler of. Mt. Yunomaru, Prov. Shinano, Japan, (Wiener Museum);

niphona Butler Q, Japan, (Berliner Museum);

Reihe: niphona Butler subsp christophi Stgr. J. Suifunfluß, Ussurigebiet; niphona Butler subsp. christophi Stgr. J. Suifunfluß, Ussurigebiet; niphona Butler subsp. christophi Stgr. P. Suifunfluß, Ussurigebiet; niphona Butler subsp. christophi Stgr. Q, Suifunfluß, Ussurigebiet;

3. Reihe: niphona Butler subsp. christophi Stgr. Q. Amur. (Berliner Museum); niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß J. Sei-Shin, Nord-Korea, Type;

niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß o, Sei-Shin,

Nord-Korea, Cotype;

niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß of, Sei-Shin, Nord-Korea, Cotype, (Berliner Museum);

4. Reihe: niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß Q, Sei-Shin, Nord Korea, Type;

niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß φ, Sei-Shin, Nord-Korea, Cotype;

niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß Q, Sei-Shin, Nord-Korea, Cotype, (Berliner Museum);

niphona Butler subsp. christophi Stgr. var. coreana Reiß ah confluens Reiß & Sei-Shin, Nord-Korea, Type, (Berliner Museum);

Reihe: niphona Butler subsp. christophi var. coreana Reiß ab. confluens Reiß Q, Sei-Shin, Nord-Korea. Typ?, (Berliner Museum); purpuralis Brünn. var. caledonensis Reiß of. Oban, Westschottland,

Type;

caledonensis Reiß o, Oban, Westschottland, purpuralis Brunn. Cotype;

achilleae Esp. subsp. caledonica Reiß of, Morven, Westschottland, Type; 6. Reihe: achilleae Esp. subsp. caledonica Reiß ♀, Morven, Westschottland, Type; lydia Stgr. 3. Malatia, Asia minor, Type, (Sammlung Dr. 0. Staudinger); lydia Stgr. 2. Malatia, Asia minor, Type, (Sammlung Dr. 0. Staudinger); lydia Stgr. Q, Malatia, Asia minor, Cotype, (Sammlung Dr. O. Staudinger);

7. Reihe: lydia Stgr. subsp. hadjinensis Reiß of, Hadjin, Asia minor, Type, (Sammlung Dr. O. Staudinger):

lydia Stgr. subsp. hadjinensis Reiß Q, Hadjin, Asia minor, Type; lydia Stgr. subsp. hadjinensis Reiß J, Hadjin, Asia minor, Cotype, (Sammlung Dr. O Staudinger);

meliloti Esp. var. anglica Reiß J. Lyndhurst, Südostengland, Type;

S. Reihe: meliloti Esp. var anglica Reiß of, Lyndhurst, Südostengland, Cotype; meliloti Esp. var. anglica Reiß of, Lyndhurst, Südostengland, Type; meliloti Esp. var. anglica Reiß of, Lyndhurst, Südostengland, Cotype; filipendulae I. var. (ab.?) lismorica Reiß of, Insel Lismore, Schottland, Type.

Berichtigung.

Im Aufsatz "Lyc. ismenias Meigen 1830" ist in der Tafelerklärung zu den Falterabbildungen Tafel I leider eine unangenehme Verwechslung der Fundortangaben zu den Unterseiten-Figuren 6a und 6c vorgekommen. Es muß heißen: 6a Lyc. ismenius Mg. Unterseite 3 Reims, Nord-Frankreich.


3 fig. 6, Wiesbaden. 6c

An der Verletzung des Saums am Analwinkel des rechten Hinterflügels ist die Identität von Ober- und Unterseite (fig. 6 u. 6c) als zum gleichen Falter (von Wiesbaden) gehörig ganz offensichtlich. Ferner muß es bellojontanensis Stempffer heißen. Ich danke Herrn Beuret für den Hinweis auf diesen versehentlichen Fehler. Dr. F. Heydemann.

-360 -

Ein neuer Sphingiden-Hybrid.

Von W. Niepelt, Zirlau.



Hybridus Celerio euphothymali m. Hybr. nov. (Cel. euphorbiae L. $\circlearrowleft \times$ tithymali Bds. \circlearrowleft).

Herr Gehlen, Lichterfelde, übersandte mir 1 $\delta \circ$ dieses Hybriden, welcher meines Wissens noch nicht beschrieben worden ist.

Kopf, Thorax olivbraun, seitlich weiß gerandet, Fühler weiß, Schulterdecken auf dem Thorax weiß abgesetzt, wie bei tithymali, doch matter; dies tritt auch bei euphorbiae mitunter auf. Abdomen in Farbe und Zeichnung wie beim Elternpaar, Oberseite der Vorderfl. wie bei tithymali, die olivbraune Färbung am Costalrand wie bei tithymali, jedoch schmäler, so daß der helle, discale Schrägstreif breiter ist als bei tithymali. Der olivbraune, postdiscale Streif ist distal unregelmäßig eingebuchtet, wie bei euphorbiae, das olivgraue Saumfeld breiter als bei tithymali.

Hinterfl. wie bei euphorbiae, das rote Discalband ist breit, der submarginale, schwarze Streif schmal, wie bei euphorbiae.

Unterseite wie bei *tithymali*, gelblich grau mit mattem rosa Anflug, der schwarze Fleck am Zellende der Vorderfl. tritt wenig hervor, ebenso sind die dunklen Querlinien der Hinterfl. unscheinbar.

Vorderfl.-Länge \circlearrowleft 38 mm, \circlearrowleft 41 mm. Typen 1 \circlearrowleft , 1 \circlearrowleft Coll. Gehlen, Lichterfelde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Heydemann Fritz

Artikel/Article: Berichtigung. 359-360