



dagegen zeigt der rechte Hinterflügel die Färbung der Form *P. bryoniae* O. Im übrigen schlüpfen mir noch manche aber weniger abweichend gezeichnete Pieriden.

### Eine Anfrage zur Benennung der *tiliae*-Formen.

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Herrn Martin Steeg und mir (vgl. diese Zeitschrift Nr. 41, S. 417 und Nr. 45, S. 457) hat sich dahin aufgeklärt, daß Herr Steeg als ab. *brunnea* Bartel Stücke mit bräunlichem Mittelfeld und grünem Außenfeld bezeichnet hat, während ich nur ganz braune Tiere, die Steeg als ab. *ulmi* Bartel bezeichnet, als var. *brunnea* ansehe. Die Färbungsunterschiede der *tiliae* bedürfen offenbar einer Klarstellung. Wer kann die Originalbeschreibung von Bartel für seine *brunnea* und seine *ulmi* angeben? Wer hat eine Form *brunnescens* beschrieben und wo? Vielleicht bedarf die hiesige Form, welche nicht nur braun, sondern braunrot ist, eines besonderen Namens.

Prof. F. Lenz, Herrsching b. München.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Lenz Friedrich

Artikel/Article: [Eine Anfrage zur Benennung der tiliäe-Formen. 496](#)