

Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes und
des Reichsverbandes Deutscher Entomologen-Vereine

26. Jahrgang.


8. Mai 1932.

Nr. 6.

Inhalt: Niepelt: Eine neue *Castnia*-Rasse. — Aue: *Pararge megera* L. — Marquardt: Die Großschmetterlingsfauna des östlichen Hinterpommerns. (Fortsetzung.) — Aus den Sitzungsberichten der Entomologischen Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg für das Jahr 1930.

Eine neue *Castnia*-Rasse.

Von W. Niepelt, Zirlau.



Castnia satrapes var. *pomposa* Niep. var. n.

Überragt mit 59 mm Vorderflügelänge alle *satrapes* um ein Drittel an Größe. Die Vorderfl. oberseits wie bei den andern Formen. Hinterfl. rostgelb; die schwarze Außenrandbinde ist relativ schmaler als bei *satrapes*; die internervalen Flecke haben Würfelform und sind bedeutend größer. Die roten Flecke am Innenrand der Außenrandbinde, welche nach Dr. Strand für die ♀♀ charakteristisch sein sollen, fehlen.

Unterseits ist die Binde schmaler und die Flecke sind größer. Die zweite proximale, bläuliche Fleckenreihe fehlt.

1 ♀ ohne Patria, wohl Mato Grosso.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Niepelt Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Eine neue Castnia-Rasse. 65](#)