© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

brechen eine außergewöhnlich große, kreisrunde Oeffnung von etwa 5 mm Durchmesser mit sehr sauber geglättetem Rand, wohl die Folge reichlicher Feuchtigkeitsabsonderung.

Die Gross-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung.

Von E. Brombacher, Freiburg im Breisgau.

(Fortsetzung.)

254. *Dianthoecia filigrama* Esp. f. *xanthocyanea* Hb. Im Juni 1931 bei Vogtsburg an Silene nutans gefangen. Selten. Die Art wurde von mehreren Freiburger Sammlern auf dem Kaiserstuhl gefangen.
255. *D. albimacula* Bkh. Wie vorige verbreitet, vereinzelt an Silene nutans.
256. *D. nana* Rott. Wasenweiler und bei Vogtsburg bei Tag vereinzelt an Baumstämmen zu finden. 1924 von Otto Hoffmann ein ♂ am Kirschenstamm gefunden.
257. *D. compta* F Wie vorige verbreitet nicht häufig. 1931 an einer Lößwand bei Vogtsburg 3 ♂ abgelesen.
258. *D. capsincola* Hb. Im Juni bei Vogtsburg nachts zahlreich an Silene schwärmend.
259. *D. cucubali* Fuessl. Wie vorige verbreitet, nicht selten.
260. *D. carpophaga* Bkh. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig, besonders an blühender Berberitze.
261. *Miana strigilis* Cl. Auf dem Kaiserstuhl häufig am Köder, sehr variabel.
262. *M bicoloria* Vill. Wie vorige verbreitet, häufig.
ab. *vinctuncula* Hb. Bei Wasenweiler und Vogtsburg vereinzelt am Köder.
263. *Bryophila algae* F Bei Vogtsburg vereinzelt am Köder. sehr variabel.
264. *Diloba caeruleocephala* L. Die Raupe auf dem Kaiserstuhl häufig auf Schlehen, Apfel u. a. m. Der Falter am Licht.
256. *Apamea testacea* Hb. Bei Wasenweiler, Ihringen und Vogtsburg am Licht. bei Tag an Baumstämmen gefunden.
266. *A. dumerilii* Dup. 1930 in der Faulen Waag ein ♀ am Licht erbeutet. 9. 9. 1932 von Elsner bei Wasenweiler am Köder gefangen. In Heft 14/15, 1924. Siehe bei *Acr. strigosa.*
267 *Celaena matura* Hufn. Auf dem Kaiserstuhl überall, besonders bei Vogtsburg zahlreich am Köder, den Falter dort an Grashalmen geleuchtet.
268. *Hadena porphyrea* Esp. Auf dem Kaiserstuhl verbreitet, besonders bei Vogtsburg zahlreich am Köder. Die Raupen im Juni bei Ihringen geleuchtet.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

269. *H. ochroleuca* Esp. In Juli 1920 bei Wasenweiler und Ihringen bei Tag auf Disteln gefangen. Seither wurde die schöne Eule öfter auf dem Kaiserstuhl erbeutet. 1920 auch von Dr O. Schröder im Kaiserstuhl erbeutet.

270. *H. monoglypha* Hufn. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig am Köder und Licht.

ab. *intacta* Peters. 1928 und 1929 bei Vogtsburg am Köder gefangen.

ab. *infuscata* White. Wie vorige.

ab. *aethiops* Th. Mieg. In mehreren Exemplaren bei Vogtsburg am Köder erbeutet.

271. *H. lithoxylea* F Wasenweiler, Vogtsburg und in der Faulen Waag vereinzelt am Köder.

272. *H. sublustris* Esp. Ueberall auf dem Kaiserstuhl, besonders bei Vogtsburg häufig am Köder.

273. *H. rurea* F Vereinzelt am Köder bei Wasenweiler und Vogtsburg.

274. *H. hepatica* Hb. Die Raupen und Puppen bei Wasenweiler gefunden. Den Falter in der Faulen Waag und am Jägerhof zahlreich am Köder.

275. *H. scolopacina* Esp. 1924 ein ♂ bei Wasenweiler am Köder gefangen.

276. *H. basilinea* F Bei Vogtsburg im Juni zahlreich an blühenden Gräsern.

277. *H gemina* Hb. Am Jägerhof und bei Burkheim am Köder und Licht gefangen.

278. *H. unanimis* Tr. Bei Wasenweiler die Raupen und Puppen gefunden.

279. *H. secalis* L. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig am Köder sehr variabel.

280. *H struwei* Ragusa. 1928 ein ♂ von mir bei Vogtsburg am Köder gefangen. Siehe Gubener Entomologische Zeitschrift 25. Jahrgang 1931, Nr. 15, Seite 153.

281. *Episema glaucina* Esp. 1926 ein ♂ der Stammform bei Vogtsburg am Köder gefangen. Siehe Gubener Entomologische Zeitschrift, 21. Jahrgang 1927, Nr. 25, Seite 204.

ab. *dentimacula* Hb. Gleichzeitig an selber Stelle von Heilig am Licht gefangen. 1927 von mir bei Vogtsburg an Grashalmen gefunden.

282. *Aporophyla lutulenta* Bkh. Bei Wasenweiler vereinzelt am Köder. 1931 die schöne Raupe bei Achkarren Bahnhof geleuchtet. 1929 von Settele bei Vogtsburg am Köder gefangen.

283. *A. nigra* Hw. Bei Wasenweiler und Ihringen je ein ♂ am Köder und Licht gefangen.

284. *Ammoconia caecimacula* F Auf dem Kaiserstuhl verbreitet, besonders bei Vogtsburg häufig am Köder.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: Die Gross-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung. 402-403