

*pyramidea* L., *Xylina socia* Rott. und *ornithopus* Rott., *Cal. exoleta* L., *Taen. pulverulenta* Esp. und *populeti* Tr., *Orthosia litura* L., *helvola* L., *nitida* F., *Orrhodia rubiginea* F., *Xanthia citrigo* L., *Pechipogon barbalis* Cl., *Agrotis xanthographa* F., *Brephos parthenias* L., *Geometra papilionaria* L., *Euchloris vernaria* Hb., *Thalera lactearia* L., *Minoa murinata* Sc., *Codonia punctaria* L., *Bapta temerata* Hb., *Larentia sordidata* L., *corylata* Thnbg., *pomoearia* Ev., *spadicearia* Bkh., *Tephroclystia lanceata* Hb., *Spil. mendica* Cl.

6. (Na): An für Naumburg neuen Arten und Formen hat das Jahr 1932 gebracht:
1. am 14. 5. *Larentia tristata* L. mehrfach,
  2. am 25. und 31. 8. — im Grase abends geleuchtet — je 1 ♀ von *Apamea nickerli* Frr.,
  3. am 22. 9. 32 — geschlüpft — 1 *Larentia cuculata* ab. *circulata* Rbl.
7. (Ro): Neu festgestellt: *Phibalapteryx vitalbata* Hb. im Herbst 1931 als Raupe bei Köstritz geklopft. Falter am 18. 5. 32, *Sarotripus degenerana* Hb. 20. 5. 32 am Licht.

(Fortsetzung folgt.)

## Die Gross-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung.

Von E. Brombacher, Freiburg im Breisgau.

(Fortsetzung.)

485. *A. corvivalaria* Kretschm. Nach Reutti in der Faulen Waag im Juni.
486. *A. umbellaria* Hb. Vereinzelt bei Ihringen von Juni ab. Von Gremminger auch bei Vogtsburg gefunden.
487. *A. strigillaria* Hb. Wie vorige verbreitet, seltener.
488. *A. ornata* Sc. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig in zwei Generationen.
489. *Codonia pendularia* Cl. Bei Wasenweiler und Ihringen vereinzelt, von Mai ab und wieder im August.
490. *C. orbicularia* Hb. Vereinzelt bei Wasenweiler und Achkarren-Bahnhof. Die ♀ fliegen gern zum Licht und dürfen, so man dieselben zur Eiablage verwenden will, nicht ins Giftglas gebracht werden, da selbst nach kürzester Betäubung keine Eier mehr abgelegt werden. Die Raupe soll auf Ulmen, Eichen, Birken, Erlen und Weiden leben, dies dürfte, außer an Weide, für unser Gebiet kaum zutreffen. *C. orbicularia* ist nach meinen mehrjährigen Zuchterfahrungen nur mit *Salix caprea* erfolgreich durchzubringen. Auch an den Flugstellen habe ich die Raupen noch nie auf einer anderen Futterpflanze außer *Salix caprea* finden können.

491. *C. annulata* Schultze. Von Mai ab und wieder im Juli, August in den Wäldern auf dem Kaiserstuhl nicht selten. Der Falter ist aus niederen Feldahorngebüschten oft in Anzahl zu klopfen.
492. *C. porata* F. Vereinzelt bei Ihringen und Vogtsburg, vom April ab. Den Falter aus Eichenbüschten geklopft.
493. *C. punctaria* L. Wasenweiler, Ihringen und im Liliental nicht selten, bei Tag aus Gebüsch geklopft.
494. *C. linearia* Hb. Wie vorige verbreitet, nicht häufig in zwei Generationen.
495. *Rhodostrophia vibicaria* Cl. Auf dem Kaiserstuhl verbreitet, jedoch nicht häufig. Die Raupen findet man beim Leuchten oft in Anzahl.  
ab. *roseata* Ersch. Vereinzelt unter der Art bei Vogtsburg gefunden.
496. *Timandra amata* L. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig in zwei Generationen.
497. *Ortholita plumbaria* F. Auf dem Kaiserstuhl verbreitet und bisweilen häufig von Mai ab.
498. *O. limitata* Sc. Wie vorige verbreitet, häufig.
499. *O. moeniata* Sc. Auf dem Kaiserstuhl sehr lokal, nur auf dem Hochbuck bei Ihringen von Juli ab gefunden.
500. *O. bipunctaria* Schiff. Auf dem Kaiserstuhl gemein, von Juni ab.
501. *Mesotype virgata* Rott. Bei Vogtsburg häufig am Licht und bei Tag an Grashalmen oder aufgescheucht kurze Strecken fliegend.
502. *Minoa murinata* Sc. Auf dem Kaiserstuhl häufig, besonders bei Vogtsburg in zwei Generationen.
503. *Odezia atrata* L. Bei Wasenweiler und in der Faulen Waag häufig.
504. *Anaitis plagiata* L. Auf dem Kaiserstuhl verbreitet und häufig von Mai ab, in zwei Generationen.
505. *Chesias spartiata* Herbst. Vereinzelt auf dem Hochbuck bei Ihringen, im Oktober.
506. *Ch. rufata* F. 1. 5. 1926. Von Heilig bei Vogtsburg ein ♀ am Licht gefangen, ziemlich selten.
507. *Lobophora polycommata* Schiff. Bei Ihringen und Vogtsburg nicht selten im März. Die Raupen von Liguster geklopft.
508. *L. halterata* Hufn. Vereinzelt bei Wasenweiler, Liliental und Ihringen im April, bei Tag an Eschenstämmen.
509. *L. sexalata* Retz. 1930 am Jägerhof ein Exemplar am Licht gefangen.
510. *L. viretata* Hb. Vereinzelt bei Vogtsburg von April ab, bei Tag an Kirschbaumstämmen.
511. *Anisopteryx aceraria* Schiff. 29. 11. 31. Bei Bickensohl 1 ♂ an Telegraphenstange gefunden.
512. *A. aescularia* Schiff. Von Februar ab in den Wäldern auf dem Kaiserstuhl an Baumstämmen zu finden. Nicht häufig.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: [Die Gross-Schmetter lings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung 271-272](#)