

Neue Gattungsbezeichnungen minierender Tenthrediniden (Hymenopt.).

Von

Prof. Dr. Martin Hering (Zoologisches Museum Berlin).

Unter den wenigen Hymenopteren-Gattungen, die im Innern der Blätter minieren, lebt eine nach unseren bisherigen Erfahrungen ausschließlich in Ranunculaceen; sie ist bisher als *Pelmatopus* Hart. bezeichnet worden. Herr Dr. H. Hedicke macht mich darauf aufmerksam, daß dieser Name bereits früher für eine Käfergattung vergeben wurde (*Pelmatopus* Fisch. Waldh., in: Entomogr. Russ., vol. 2, p. 163 u. 200, 1824), so daß der Name von Hartig (Aderfl. p. 244, 1837) ein Homonym dazu darstellt. Es möge deshalb der letztere Name geändert werden in *Phyllopais* nom. nov., mit dem Generotypus *Ph. fuscus* Klg.

Unter den Arten dieser Gattung fällt die als *Pelmatopus anemones* Hering (Minenstudien IV in Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere, vol. 2, p. 239, 1924) beschriebene Art dadurch auf, daß der Nervus recurrens im Vorderflügel nicht wie bei den übrigen Arten in die zweite, sondern in die dritte Cubitalzelle mündet. Herr O. Conde (Riga) machte mich darauf aufmerksam, daß dieses Merkmal gut als gattungstrennend verwendet werden könnte. Es möge deshalb diese Art einer neuen Gattung *Endophytus* gen. nov. angehören, die durch die Einmündung des rücklaufenden Nervs in die dritte Cubitalzelle von der Gattung *Phyllopais* Hering verschieden ist. Generotypus ist *E. anemones* Hering.

Der Veronikaberg und das Wipfratal bei Ilmenau in Thüringen.

Ein Beitrag zur Fauna des Thüringer Hügellandes.

Mit 1 Kartenskizze.

Von Ing. E. Döring-Ilmenau.

(Fortsetzung.)

Fauna.

Rehe sind auf dem Vkgb. immer anzutreffen; nur zweimal traf ich einen Dachs. Im Wipfratal sind Kaninchen sehr häufig. Die Vogelwelt ist im Laubwaldteil des Vkgbs. besonders heimisch. Finken und Laubsänger spektakeln den ganzen Tag. Die Nester von Erdbrütern habe ich öfters entdeckt. Dem Eichelhäher begegnet man vornehmlich im Kiefernwaldteil auf Schritt und Tritt. Die Insekten sind naturgemäß am stärksten vertreten. Viele Käfer- und Wanzenarten harren der Bestimmung. Mücken und Stechfliegen stellen sich zu jeder Nadelpause in Mengen ein.

Von den Libellen ist *Aeschna cyanea* auf dem Vkgb. und im Wptl. gleich häufig. An den Streichteichen fliegt *Calopteryx virgo*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Hering Martin

Artikel/Article: [Neue Gattungsbezeichnungen ruinierender Tenthrediniden \(Hymenopt.\) 353](#)