

Aus den Sitzungsberichten der Entomologischen Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Heimattforschung zu Hamburg.

18. Sitzung am 27. 11. 31.

Herr Horch spricht über seine Sammelreise 1931 in das Oetz-tal (Tirol), wo er sich 18 Tage lang aufhielt. Sölden im oberen Tale wurde zunächst als Standquartier gewählt. Von hier aus wurde das Rettenbach- und Windachtal besammelt. Es wurden dann mehrfach Ausflüge in das untere Gurgl- und Venter-Tal un-
ternommen. Die letzten Tage verbrachte H. in Obergurgl. Erbeutet wurden folgende Arten: *P delius* mit *casta*, *apollo phrynius* mit *spheragon* und *ampliusmaculata*, *Pieris napi bryoniae*, *L. sinapis*, *C. palaeno europomene* mit *illgneri*, *phicomone* mit *hyalides*, *pallida* und *distincta* + *fasciata*, *P cardui*, *M cynthia*, *cinxia*, *athalia* mit *terriolensis*, *parthenie* v *varia*. *dictynna alpestris*, *Arg. selene* trans. ad *hela*, *pales* mit ♀ *napaea*, *amathusia*, *aglaia*, *niobe* v *intermedia* und v. *eris*, *E. epiphron nelamus*, *melampus*, *pharte*, *manto*, *ceto*, *medusa hippomedusa*, *goante*, *ligea monticola*, *lappona*, *tyndarus*, *P maera*, *C. satyrion*, *Chr. virgaureae montana* mit ♀ ab. *seriata*, *hippotohō eurybra*, *phlaeas*, *dorilis subalpina*, *L. argus alpina*, *argyrognomon*, *optilete cyparissus*, *orbitulus* mit *alboocellata*, *pheretes*, *astrarche allous*, *eumedon*, *icarus*, *semiargus montana*, *arion nigricans* und *obscura*, *H. cacaliae*, *P palaemon*, *E. comma alpina*, *P geryon*, *Z. purpuralis nubigena*, *loniceræ*, *ochsenheimeri*, *exulans* mit *flavilinea* und *costali-elongata*, *achilleae alpestris*, *Ph. irrorella andereggi*, *E. roscida*, *aurita ramosa* nebst *imbuta*, *L. complana*, *C. cribraria punctigera*, *P plantaginis*, *D. proxima*, *D. caesia*, *C. quadripunctata*, *A. cordigera aethiops*, *Pl. gamma*, *hochenwarthi*, *Ac. immorata*, *incanata*, *contiguaris*, *O. bipunctaria*, *O. atrata*, *Apaludata imbutata*, *L. populata*, *L. variata*, *immanata*, *salicata*, *montanata* tr. ad *lapponica*, *caesiata*, ab. *annosata*, *flavicinctata*, *nobiliaria*, *incultaria*, *frustata*, *galiata*, *hastata subhastata*, *alchemillata*, *minorata*, *albulata*, *furcata tricolorata*, *autumnalis*, *berberata*, *Gn. glaucinaria*, *serotinaria*, *dilucidaria* mit tr. ad *brunnearia*, *myrtillata obfuscaria*, *Ps. alticollaria*, *alpinata*, *noricana*, *coracina* mit *wahlbergi*, *canaliculata*, *quadri-fasciaria*, *P fusca*, *T brunneata*, eine Anzahl von Kleinschmetterlingen.

Im Anschluß an den Vortrag legt Herr Meyer-Pinneberg *Euprepia pudica* als Raupe aus einer Eizucht vor. Die Art war von ihm in Spanien erbeutet worden. Sie lebt an Gräsern.

—

Am 11. 12.31 fand ein Tauschabend statt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Aus den Sitzungsberichten der Entomologischen Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg 412](#)