

ringes nach vorn, also kopfwärts) ist bei beiden, Arten auffallend lang.




Abb. 5. *Athetis selini* B. (Neugraben).

Der Aedoeagus ist schwach bewaffnet, ohne auffällige unterscheidende Merkmale. Bei beiden Arten ist in der Mitte ein stärker chitinisiertes Streifen, der aus dicht stehenden Dornen besteht.

(Fortsetzung folgt.)

Der Veronikaberg und das Wipfratal bei Ilmenau in Thüringen.

Ein Beitrag zur Fauna des Thüringer Hügellandes.

Mit 1 Kartenskizze.

Von Ing. E. Döring-Ilmenau.

Aufzählung der bisher bekannten Rhopaloceren, Sphingidae, Arctiidae und Zygaenidae des Veronikaberges und Wipfratales.

(Notodontidae, Noctuidae und Geometridae folgen später im II. Teil.)

1. *Papilio podalirius* L.
Vkg. selten. Nach den Reinsbergen zu häufiger von April bis Juni auf dem Kammweg.
2. *Papilio machaon* L.
Vkg. vereinzelt im Mai und August.
3. *Pieris brassicae* L. Vkg. und Wptl. zahlreich von Mai bis September.
4. *Pieris rapae* L.
Vkg. auf Schlag III, IV und V vor allem im September—Oktober zahlreich. Im Walde nie gefunden.
5. *Pieris napi* L.
Vkg. und Wptl. häufig, vorwiegend im Wald, von Mai bis Oktober.

6. *Euchloë cardamines* L.
Vkg. und Wptl. sehr häufig April bis Juni.
7. *Leptidia sinapis* L.
Vkg. häufig April bis Juni, seltener August.
8. *Colias hyale* L.
Vkg. jahrweise sehr häufig in 2. Generation April bis Juni, August bis Sept.
9. *Colias edusa* F.
Vkg. 1927 und 28 häufig. Seither nicht wieder.
10. *Gonepteryx rhamni* L.
Vkg. und Wptl. häufig von August überwintert bis Juni.
(*Apatura iris* L. Ranitzsch: selten. Belegstück fehlt.)
11. *Limenitis populi* L.
Ranitzsch schreibt: Heyda 1905 24 Puppen, 1906 4 Puppen. (Falter davon in meiner coll. Dö.)
12. *Limenitis sibylla* L.
Vkg. Juni bis August meist häufig.
13. *Pyrameis atalanta* L.
Vkg. Mai bis Juni, August bis 3. Oktober. Ziemlich selten. Jahrweise fehlend.
14. *Pyrameis cardui* L.
Vkg. Wptl. Mai und August. Jahrweise fehlend.
15. *Vanessa io* L.
Vkg., Wptl. April bis Juni, August bis Oktober häufig.
16. *Vanessa urticae* L.
Vkg., Wptl. April bis September häufig.
17. *Vanessa polychloros* L.
Vkg. im Juli vereinzelt.
18. *Vanessa antiopa* L.
Vkg., Wptl. im August bis Mai zahlreich.
19. *Polygonia c-album* L.
Vkg. Mai bis Juni, Oktober bis April.
20. *Melitaea cinxia* L.
Ranitzsch schreibt: Zahlreich auf dem Vkg. — Von Ranitzsch gefangene Falter in m. coll.
21. *Melitaea athalia* Rott.
Vkg. Juni bis Juli gemein.
22. *Melitaea aurelia* Nick.
Ranitzsch: Vkg. nach der Halskappe zu. 1934 zum erstenmal auf Schlag II gefunden. Schon am Flugbild von *athalia* zu unterscheiden.
- 22a. *Melitrea aurinia* Rott. Am Südhang des Vkg. auf Quellstellen des Röt wiederholt von Dr. Bergmann gef. (10. 6. 1924).
23. *Argynnis selene* Schiff.
Wptl. vom 6. bis 28. Juni und vom 9. 8. bis 17. 9. auf örtlich begrenztem Flugplatz zahlreich.
24. *Argynnis euphrosyne* L.
Vkg. Mai bis Juli im Buchenwaldteil zahlreich.
25. *Argynnis dia* L.
Vkg. im Mai, Juli, August und September gefangen; häufig.
26. *Argynnis latonia* L.
Vkg. im Mai und August meist vereinzelt. Jahrweise gemein.
27. *Argynnis aglaia* L.
Vkg. Juni bis August zahlreich, manchmal häufig.
(*Argynnis niobe* kommt auf dem Vkg. noch nicht vor. Erst in den Hochtälern des Thür. Waldes ist diese Art verbreitet und nicht selten.)
28. *Argynnis adippe* L.
Vkg., Halskappe wie *aglaia*.
29. *Argynnis paphia* L.
Vkg., Wptl. Juli, August häufig, ♀ v. *valesina* vereinzelt.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Döring-Ilmenau E.

Artikel/Article: [Der Veronikaberg und das Wipfratal bei Ilmenau in Thüringen 447-448](#)