

10. Sitzung am 10. 6. 32.

Herr Evers spricht über die paläarktischen Agrotiden der Sammlung des Hamburger Museums.

Herr Meyer-Pinneberg legt *A. caja* in der spanischen Form *lusitanica*, sowie eine Anzahl Abarten vor, unter welchen die Form *phantasma* besonderes Interesse in Anspruch nimmt, gleichfalls 2 Stücke von *lutescens*.

Neben diesen Freilandtieren interessierten noch zur Vorlage gebrachte Kälteformen, die sich nach zwei Richtungen hin bewegen und zwar Aufhellung und Verdunkelung, deren Schlußglied die Form *obscura* nahezu erreicht. Die nach der Aufhellungsseite hin erzielten Stücke dagegen übertreffen die im Freien vorkommende Form *phantasma* noch insofern, als nicht nur die Vfl., sondern auch die Htfl. zu einem Crèmeweiß aufgehellt sind.

Von Funden der Vereinsmitglieder sind zu erwähnen: *Hopl. milhauseri* (Laplace und Stück) bei Neugraben, *Cerura bicuspis* bei Düneberg an Erle und *Not. carmelita* bei Sprötze (Zukowsky).

11. Sitzung am 24. 6. 32.

Der Sitzungsabend wurde durch reichhaltige Vorlagen verschiedener Mitglieder ausgefüllt. Für die Hamburger Fauna sind zu erwähnen: Raupen von *P. rubricosa* aus einer Eizucht, desgl. *Hopl. milhauseri*, Falter von *Dendr. pini*, *Mal. castensis*, *Agr. subrosea*, *castanea*, *Pt. palpina*, *L. bicoloria*, *M. nebulosa*, *Metr. margaritata*.

Literaturbericht.

Von Dr. Victor G. M. Schultz, Lage (Lippe)

Dr. Adalbert Seitz, Die Großschmetterlinge der Erde. I. Hauptteil. Fauna palaeartica. Supplement. Lief. 53 u. 54 (Bd. III, S. 169—184, Taf. 13; Bd. IV, S. 1—8, Taf. 1 u. 2).

In Lieferung 53 findet die Bearbeitung der *Amphipyrrinae* ihre Fortsetzung. Beginnend mit der Gattung *Trachea* führt sie bis zu 89. Gattung dieser Unterfamilie, nämlich bis zu *Namangana*. Besonders zahlreiche Arten umfaßt die Gattung *Athetis*, aber diese bildet — wie Prof. Dr. Draudt schreibt — „zur Zeit noch ein fast unentwirrbares Chaos, und Warren hat im Hauptband sehr viele Fehler gemacht“. Einzelne Gruppen sind allerdings schon mehr untersucht worden, so u. a. von Nordström und Filipjev. Aber eine in Aussicht stehende größere Arbeit konnte nicht mehr verwertet werden, so daß erst der Nachtrag darüber berichten kann, falls bis dahin diese Arbeit erschienen ist. Im wesentlichen ist deshalb die Warrensche Reihenfolge des Hauptbandes beibehalten worden. Auf der Tafel finden wir außer einigen *Agrotis*-Arten eine große Reihe von *Dianthoecien* abgebildet.

Die Lieferung 54 eröffnet die Ergänzungen zum IV. Band. Die Bearbeitung liegt in den Händen von L. B. Prout. Von dem Geometriden-Band des Hauptteiles ist sein Name allen, die sich mit den Spannern beschäftigen haben, bekannt. Die meisterhafte Bearbeitung dieser Familie, die wir ihm zu verdanken haben, hat allgemeine Anerkennung gefunden. Wir freuen uns deshalb sehr zu sehen, daß nun auch die Ergänzungen ihm übertragen sind. Auf den ersten 8 Seiten des Supplements werden die drei Unterfamilien *Brephinae*, *Oenochrominae* und *Hemitheinae* behandelt. Die beiden vorzüglichen Tafeln bringen Abbildungen aus den zu diesen Unterfamilien gehörigen Gattungen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [29-49](#)

Autor(en)/Author(s): Schultz Victor G. M.

Artikel/Article: [Literaturbericht. 24](#)