

Rot, mehr ein Ziegelrot, und ein nicht so durchscheinendes Schwarz; auch endet hier die Außenbinde der Hinterflügel, wenn sie breit vorhanden ist, nie so plötzlich vor dem Innenwinkel, wie dies bei den 3 *Z. erebus* der Fall ist. Ferner hat *Z. freyeri* (*orion* H.-Schäff. oder *ephemerina* Bgff., der Verf.) in den mir vorliegenden 6 Stücken statt des mittleren Keilflecks stets zwei weit getrennte runde Flecke, die viel runder und ganz anders geformt sind als bei den beiden Stücken von *Z. erebus*, wo dieser Keilfleck gleichfalls getrennt auftritt.“

Burgeff scheint bei seiner Beschreibung der *Z. chaos* nur die lateinische Diagnose der *Z. erebus* Stgr. zu Grunde gelegt zu haben, da er ausdrücklich auf diese Diagnose verweist und am Schlusse seiner Ausführungen darauf hinweist, daß er unter ziemlich zahlreichen Exemplaren von *erebaea* Reiß (s. Reiß in Seitz-Suppl. 2, Seite 9 und Tafel 1h) keine interrupten Stücke gefunden hätte. Dies letztere kann ich bezüglich der Stücke meiner Sammlung ebenfalls bestätigen.

Die ♂-Type Staudingers aus der von Weißenborn'schen Sammlung mit dem Etikett „ex Caucaso“, die einzig und allein maßgebend ist und die auf der beigegebenen Tafel abgebildet ist, hat mir Herr Bang-Haas freundlicherweise sofort aus der Staudinger'schen Sammlung leihweise zur Verfügung gestellt. Es ist dadurch zweifelsfrei erwiesen, daß *erebus* Stgr. und *chaos* Bgff. dasselbe Tier ist und daß Romanoff *erebus* Stgr. richtig abgebildet hat.

Herr Bang-Haas sandte mir außerdem ein weiteres auch auf der Tafel abgebildetes als *erebus* Stgr. bezeichnetes ♂, dessen Fangdaten 29. 5. 1873 lauten. Ueber dem Datum steht M; Fundort südlicher Kaukasus. Bei diesem Stück, das stärkere Fühlerkolben hat und auch etwas stärker beschuppt ist, geht die breite Hflgl.-Umrandung sich langsam verschmälernd auch auf den Innenwinkel über. Der Vflgl. zeigt die Flecke 3 und 5 weit getrennt. Ich halte dieses Tier für die interrupte *erebaea* Reiß, also nicht für *erebaea* Bgff. (= *erebus* Stgr.). Das Vorkommen der interrupten *erebaea* Reiß scheint hierdurch erwiesen, ihr Vorkommen ist auch sehr wohl möglich. — S. auch unter Z. 4. —

Die Typenrasse der *erebaea* Bgff. nehme ich aus der Umgebung von Tiflis an, von wo ich ein der Type entsprechendes Exemplar in meiner Sammlung habe. Ich halte mich hier auch an Romanoff, der *erebus* Stgr. bei Tiflis, bei Borjom, südl. Baku und nördlich Kutais als vorkommend bezeichnet. (Fortsetzung folgt.)

Ein Sammeljahr im oberen Wippertal.

Von E. Haeger, Gewiesen, Krs. Rummelsburg (Pom.).

(Schluß.)

344.—367. **T. sobrinata* Hb., **Chl. debiliata* Hb., **C. sparsata* Tr.,
A. melanaria L., *sylvata* Sc., **B. bimaculata* F., *teme-*

rata Hb., *D. pusaria* L., *exanthemata* Sc., **N. pulveraria* L. (2), **E. prosapiaria* L., *M. margaritata* L., *E. quercinaria* Hufn., *A. prunaria* L., **Ou. sambucaria* L., *Eu. dolabraria* L., *S. notata* L., **signaria* Hb. (zl. häufig), **liturata* Cl., *H. marginaria* Bkh., *defoliaria* Cl., **A. aescularia* Schiff., *Ph. pedaria* F., *B. cinctaria* Schiff.

*368. *Boarmia ribeata* Cl. (3883). 1 ♀ bei Bärenkamp am 11. 8. geködert.

369.—386. *B. repandata* L., *roboraria* Schiff., *consortaria* F., **crepuscularia* Hb. und f. *defessaria* Frz., **consonaria* Hb., **luridata* Bkh. (1), **punctularia* Hb., **G. obscuraria* Hb., *E. atomaria* L., *B. piniarius* L., *Th. wauaria* L., **brunneata* Thnbg., *Ph. petraria* Hb., *clathrata* L., *P. strigillaria* Hb., **N. cucullatella* L., **strigula* Schiff. (1), **confusalis* H. S. (1).

**387. *Sarrothripus degeneraria* Hb. (4126d). Diese von Hering 1881 für Misdroy registrierte Art fing ich nach der Ueberwinterung am 30. 4. und 4. 5. in 3 Exemplaren bei Wilhelmstal.

388.—407. *Sp. lubricipedum* L., *Ph. fuliginosa* L., *P. plantaginis* L., *D. sanio* L., *A. caja* L., *hebe* L. (nur ♂♂ am Licht), **C. dominula* L., *C. mesomella* L., *G. rubricollis* L., **L. griseola* Hb., **lurideola* Zinck., **sororcula* Hufn., **P. muscerda* Hufn., *Z. trifolii* Esp., *loniceræ* Scheven, *I. pruni callunæ* Spul., *statices* L., **A. atra* L. (= *opacella* H. S.), *P. unicolor* Hufn., *Ph. graslinella* B.

*408. *Psychidea bombycella* Schiff. (4517). Die ♂♂ flogen im Juli ziemlich häufig bei Gewiesen-Mühle und Wilhelmstal.

409.—411. *F. casta* Pall., *C. cossus* L., *H. hecta* L.

Nachtrag.

412.—422. **X. fulvago* L., *X. socia* Rott., *E. uncula* Cl., *T. amata* L., **L. viridaria* F. (1), **L. testaceata* Don., **L. sordidata* F., *A. marginata* L., *O. luteolata* L., **S. alternaria* Hb., *Sp. menthastri* Esp.

Literaturverzeichnis.

- Chappuis, In den Sumpfwäldern Pommerns. Berl. Ent. Ztschr., Band LVIII, 1913.
 Haeger, Im Hinterpommerschen Moor. Int. Ent. Ztschr., Guben, 19. Jahrg. (1925).
 — Um den Garder-See. Wie vor., 20. Jahrg. (1926).
 — Col. v. europome und Sel. ericetaria in Pommern. Wie vor., 21. Jahrg. (1927).
 — Entomologisches aus Hinterpommern. Wie vor., 22. Jahrg. (1928).
 — Was konnte ich 1928 für die Vervollständigung der Pommern-Fauna tun? Wie vor., Jahrg. 23 (1929).
 — Mein Sammelnjahr 1929. Wie vor.
 — Neu für Deutschland! Wie vor., Jahrg. 25 (1931).
 — Etwas vom Lokalfaunisten. Wie vor., Jahrg. 26 (1932).
 — Melanismus in meiner Pommernsammlung. Pomm. Nat. Gesellschaft, Dohrniana, 12. Band (1933).

- Heinrich, Beitrag zur Kenntnis der in Hinterpommern heimischen Großschmetterlinge. Abh. und Berichte der Pomm. Nat. Gesellschaft, Jahrg. 7 (1926).
- Hering, Die pomm. Falter. Stett. Ent. Ztg., Jahrg. 1—4 (1840/43).
 — Die Geometriden Pommerns. Wie vor., Jahrg. 41 (1880).
 — Die pommerschen Rhopaloceren, Sphingiden, Bombyciden u. Noctuiden. Wie vor., Jahrg. 42 (1881).
- Heydemann, Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Pommerns. I. E. Ztschr., Guben, Jahrg. 19 (1925).
- Jeschke, Die Auffindung von *Cal. lutosa* u. ihre Abarten. Soc. entomol., Jahrg. 45 (1930).
 — Etwas über *A. hebe*. Wie vor., Jahrg. 44 (1929).
- Marquardt, Beitrag zur Kenntnis der ostpomm. Großschmetterlinge. 3 Teile. Abh. u. Berichte der Pomm. Nat. Gesellsch., Jahrg. 7—9 (1926/28).
 — Die Sesiiden Ostpommerns. Wie vor., Jahrg. 10 (1929).
- Meyer, Noack, Richter, Ule, Urbahn, Die Großschmetterlinge des pomm. Oderaltals — mit 2 Nachträgen. Stett. Ent. Ztg., Jahrg. 85—86 (1925), 90 (1929) u. 94 (1933).
- Pfau, Beitrag zur Lebensweise u. Entwicklung von *A. formosaria* Ev. Abh. u. Ber. der Pomm. Nat. Gesellsch., Jahrg. 5 (1925).
 — Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge Pommerns. Wie vor., Jahrg. 9—10 (1928/29).
- Richter, Melanismus bei pomm. Schmetterlingen. Wie vor., Jahrg. 2 (1931).
 — Zur Schmetterlingsfauna des Kreises Neustettin. Wie vor. Jahrg. 6 (1925).
- Speiser, Die Schmetterlingsfauna der Prov. Ost- u. Westpreußen. Physikal. ökon. Gesellsch. zu Königsberg (1903).
- Spormann, Die im nordwestl. Neuvorpomm. bisher beobachteten Schmetterlinge. Jahresbericht des Gymnasiums z. Stralsund 1907 u. 1909.
- Ule, Ueber Auftreten u. Verbreitung von *Amph. betularia* f. *carbonaria* auf dem Kontinent. I. Ent. Ztschr. Guben, Jahrg. 18 (1924).
- Urbahn, Zur Biologie von *H. taenialis* Hb. u. *P. obtusa* HS. Stett. Ent. Ztg., Jahrg. 93 (1932).
 — Gehört die Noctuide büttneri Hering zur Gattung *Simyra*? Wie vor., Jahrg. 94 (1933).
 — Zur Lebensweise von *Sedina büttneri* Hering u. *Pelusia obtusa* HS. Wie vor.
 — *Larentia cognata* Thnbg. in Pommern. Wie vor., Jahrg. 89 (1928).
- Warnecke, *Agr. subrosea* Steph. auf dem europ. Festlande, ihre Formen, ihre Verbreitung u. ihre Biologie. Frankf. Ent. Ztschr. 1926/27.
 — Der nördl. Verbreitungskreis der *Sel. ericetaria* Vill. I. E. Ztschr. Guben, Jahrg. 25 (1931).
 — Zur Verbreitung v. *V. oleagina* F. in Mitteleuropa, insbesondere in Pommern. Stett. Ent. Ztschr., Jahrg. 92 (1931).

Ueberhandnehmen des Spanners *Amphidasis betularia* L. ab. *doubledayaria* Müll. (= *carbonaria* J.).

Von F. Bander mann, Halle.

Als ich die Nr. 5 der Gubener Zeitschrift vom 1. Mai erhielt, hatte ich einen Artikel über den Werdegang dieses Spanners schon zur Hälfte geschrieben. Die Mitteilungen von Herrn Professor Dr. Hasebroek-Hamburg über das Auftreten des Industriemelanismus der Schmetterlinge Deutschlands ist sehr lehrreich. Ich habe schon wiederholt über das Auftreten des Spanners geschrieben und seit dem Jahre

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [29-49](#)

Autor(en)/Author(s): Haeger Erich

Artikel/Article: [Ein Sammeljahr im oberen Wippertal. 124-126](#)