

Internationale Entomologische Zeitschrift

29. Jahrgang.

8. Oktober 1935.

Nr. 26.

Inhalt: Niepelt: Neue Formen der Gattung *Catagramma* Bsd. — Dr. C. Fiedler: Die amerikanische Rüblergattung *Diplogrammus* Chevr. (Fortsetzung). — Heese: Die Rotschwanzraupe (*Dasychira pudibunda*). — Grabe: Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten (Fortsetzung). — Aus der Praxis für die Praxis.

Neue Formen der Gattung *Catagramma* Bsd.

Von W. Niepelt.

Mit 2 Abbildungen.




Fig. 1.

Fig. 2.

Catagramma kolyma Hew. f. *subobscura* n. f. (Fig. 1).

Auf der Useite d. Hfl. ist das sonst discale blaue, schwarz umrahmte Feld, in welchem die schwarzen, nierenförmigen, blau gekernten Flecke stehen, bis auf einen schmalen, proximalen, blauen Streifen schwarz, die hellblauen Flecke sind in sich zusammengeflossen u. unregelmäßig geformt.

1 ♂ Teffé, Amazonas, 1934.

Catagramma eunomia Hew. f. *hades* n. f. (Fig. 2).

Htfl. Useite schwarz mit einem gelben, kreisförmigen Streif, welcher mit den Flügelrändern parallel läuft. Arand mit blauem Limbalstreif, proximal von diesem ein schwarzer Streif, über dem oberen blauen Fleck ein dünner, halbmondförmiger gelber Strich, im unteren Discalfeld 2 kleine, blaue, nebeneinanderstehende Flecke. Fransen schwarz u. gelb gefleckt.

4 ♂♂ Oxapampa, Tarapato, Peru, 1933.

Catagramma cynosura Dbl. u. Hew. f. *larseni* n. f.

Oseite, Vfl.: Der orangefarbene Subapicalstreif ist vergrößert, der rote Costalstreif am Hfl. ist breiter u. länger.

Useite, Vfl.: Die blaue sublimbale Linie im oberen Teil dünner, der gelbe subapicale Streif breiter als bei d. Stammform.

Hfl. Die gelbe Grundfarbe dominiert, die schwarzen Binden u. Zeichnungen sind verschmälert, die postdiscale, schwarze Binde ist nur halb so breit als bei der Stammform, die blauen, halbmond-förmigen Streifen in dieser zu feinen Strichen verschmälert; das gelbe, submarginale Band am Arand doppelt so breit wie bei d. Stammform, die 8-förmige, discale, schwarze Zeichnung wird quer durch die gelbe Grundfarbe in 2 reduzierte Flecke getrennt; der oberste hat eine bizarre Form, die blauen Flecke wie bei der Stammform, doch kleiner; der orangefarbene Costalstreif ist länger u. breiter

1 ♂ St. Cruz, Bolivia, 1932.

Benannt zu Ehren des Herrn Larsen, Faaborg, einem eifrigen Nymphaliden-Sammler.

Die vorstehend beschriebenen Formen sind ohne Ausnahme Zustandsformen u. kommen zwischen d. Stammform vor.

Die amerikanische Rüsslergattung *Diplogrammus* Chev.

(Col. Curc. Cryptorhynch.)

Revidiert von Dr. Carl Fiedler, Suhl i. Thüringen.

(Fortsetzung.)

Beschreibung der Arten.

1. *Diplogrammus 4-vittatus* Chev. (Ann. Soc. Ent. de France, VII., p. 181, 1877; — *Rhynchaenus 4-vittatus* Oliv. Ent. V. 23., p. 203, tab. 17, fig. 215; — *Cryptorhynchus 4-vittatus* Schönh. Curc. VIII., 1. gen. 511, p. 324, 71.) Oblong-oval, subrhomboidal, tiefschwarz, die Orbitae gelb umrandet, Stirn und Rüsselbasis, sowie die Seiten des Rüssels gelb beschuppt; Proth. blaß rosenschwarz, mit 7 schwarz beschuppten Flecken: 1 auf dem Discus, breit-oval, vorne und hinten meist eingebuchtet, oftmals durch eine durchgehende, zarte, gelbe Binde in 2 Teile getrennt oder völlig 2-teilig, in der Größe sehr veränderlich; 2 längsovale an den Seiten, die hinten unten meist \pm eingebuchtet sind; 2 rundliche über den V.Hüften und 2 hinter den Augen unten, diese oft recht verkleinert und undeutlich. Elytren mit 2 dicht beschuppten, graden, schmalen Längsbinden auf den 4. und 8. Interstitien, die am Apex breit verbunden sind, an der Basis nicht; auch die Schultern vorne unten und der apikale Rand der Elytr. schmal gelb beschuppt; alle Hüften ebenfalls gelb, das Metasternum rosenschwarz, seine Außenpartien \pm dunkel. Abdomen schwarz, das 1. Segment am H.-Rande gelblichweiß, die 4 anderen Segmente am V Rande, die 3 mittleren auch noch mit 2 \pm breiten Längsbinden von gleicher Farbe; sind die letzteren breit, hat man den Eindruck, als sei

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [29-49](#)

Autor(en)/Author(s): Niepelt Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Neue Formen der Gattung Catagramma Bsd. 301-302](#)