

INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Organ
des Internationalen

Entomologen-
Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.
Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzelle oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Neues über die Gattung *WAIGEUM*. — Neue *Lycaeniden* des Papua-Gebiets. — Das Verzeichnis der von C. H. Beske in den Jahren 1826 bis 1829 bei Hamburg gefundenen *Lepidopteren* (Fortsetzung). — Vom Werte des Sammelns biologischer Objekte (Fortsetzung). — Studien über die Hautfarbe bei Käfern und Schmetterlingen. — *Entomologisches Tagebuch* für 1907 (Fortsetzung).

Neues über die Gattung *WAIGEUM*.

— Von H. Fruhstorfer. —

Die Smith'sche Behandlung der *Waigeum*-Arten fordert eine Nachprüfung, die Ribbe, Iris 1900 p. 337, z. T. bereits gegeben hat.

Nach meinem Material und den vorhandenen Abbildungen verteile ich die Species wie folgt:

1. *Waigeum ribbei* Röber 1886.

- a) *ribbei ribbei* Röber. Sekar, S. W. Holl.-N.-Guinea. Iris 1886 p. 52 t. 4. f. 2; ♂ Staudinger Iris 1895 p. 34/35. t. VI. f. 6 ♂ f. 7, 8 ♀ Sekar und Ati-Ati-Onin, S. W. H.-N.-Guinea, Oberthür Etudes, Aug. 1894 p. 11. t. 2 f. 8 ♂. Wandesi Holl.-N.-Guinea, gegenüber der Insel Roon. Synonym evtl. forma *corusians* Grose Smith, l. c. III April 1899 p. 30 t. 19. f. 9, 10 ♂. Kapaur (S. W. H.-N.-Guinea. *W. ribbei* und *corusians* Ribbe, Iris 1900 p. 337 ohne Fundort.
- b) *ribbei subcoeruleum* (*Waig. subcoeruleum* als Art beschrieben von Grose Smith, II l. c. f. 4, 5 ♀ p. 35.) Waigiu.
- c) *ribbei makriki* Ribbe Ceram. Iris 1900 p. 337 t. 6. f. 4 (Synonym *Waigeum ceramicum* Druce, P. Z. S. 1902 p. 115, t. 11 f. 6.)

2. *Waigeum miraculum* Druce.

Thysonotis miraculum Druce, P. Z. S. 1893 p. 552 t. 46 f. 12; *Waigeum miraculum* Stdgr. Iris 1895 p. 153; Grose Smith l. c. II p. 37 f. 11, 12 ♂; *Waigeum ribbei* var. *miraculum* Ribbe, Iris 1900 p. 337.

Miraculum zerfällt in 5 Formen und stellt einen der variabelsten bekannten Tagfalter dar.

a) forma *miraculum* Druce.

♂ Oberseits vorherrschend schwarz mit basalem dunkelblauem Anflug. Hinterflügel ohne weißen Diskus. Unterseite aller Flügel braun.

b) forma *roschia* nova.

♂ Oberseits vorherrschend hellblau, Hinterflügel mit weißem Diskalfleck. Unterseite wie bei a.

♂ Koll. Fruhstorfer.

c) forma *thauma* Stdgr. (Von Staudinger als Art beschrieben!)

Oberseite von ♂ mit breiter weißer Schrägbinde, Basalanflug hellblau.

Unterseite vorherrschend weiß mit braunen Schrägbinden. Smith Figur 1, 2.

4 ♂♂ Waigiu, Koll. Fruhst.

d) forma *depicta* nova.

♂ Oberseite wie bei c mit fast verschwundenem und dunkelblauem Basalanflug.

2 ♂♂ Waigiu, Koll. Fruhst. = Smith fig. 3 ♂ nec ♀.

e) forma *simplex* Smith. (Von Smith als Art beschrieben l. c.)

Oberseite ähnlich *depicta* m.

Unterseite weiß ohne braune Mittelbinde der Hinterflügel. Waigiu.

3 Species *Waigeum* mußten somit zu bloßen Formen degradiert werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Neues über die Gattung WAIGEUM 113](#)