© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

formen unter sich einen koordinierten Rang in der wissenschaftlichen Nomenklatur einräumt. Der Name *hades* ist also zu verwerfen.

d. **A. critias regillus** Fruhst., (Soc. ent. l. c.) aus Ecuador ist keine *critias-*, sondern eine *tereas*-Form, wie es Autor bei der ersten Veröffentlichung (Ent. Zeit. Stettin, l. c.) richtig getroffen hat. Sie fällt zusammen mit *Euterpe rosacea* (= *Archonias tereas rosacea*) Btl. und der Name kann höchstens vermöge reduzierter Fleckbildung des Vorderflügels als Bezeichnung einer unbedeutenden Zustandsform erhalten bleiben. Wir müssen aber in beiden Fällen **regilla** schreiben.

Auffallend ist die geringe Größe eines ♂ dieser Form meiner Sammlung aus Balzapamba (No. 2551), welches nur 22 mm Vorderflügellänge mißt.

(Fortsetzung folgt.)

Neue Rhopalocerenrassen der Insel Bali.

Von *H. Fruhstorfer.*

Troides helena mannus nov. subspec.

♂♀ durchweg kleiner als *helena* L. von West-Java, auch habituell hinter Ostjavanen zurückbleibend.

♂ fast ausnahmslos mit jenen breiten weißen Strigae, wie sie auch bei der Ostjava-Rasse von *helena* vorkommen.

Der schwarze Distalsaum der Hinterflügel breiter als bei ostjavanischen *helena* L.

Patria: Bali, 2 ♂♂ Koll. Fruhstorfer, 4 ♂ 2 ♀ Koll. Dr. Martin.

Papilio macareus albinovanus nov. subspec.

Aehnlich *macareus* Godt. von Java, aber alle Strigae der Vorderflügel breiter und die cellulare und circumcellulare Partie der Hinterflügelzelle mehr aufgehellt.

Patria: Bali, Type in Koll. Dr. Martin.

Delias belisama balina nov. subspec.

(*Delias glance* [sic!] de Nicéville.)

Kleiner als *belisama nakula* Smith von Ostjava; der schwarze Apikalsaum der Vorderflügel proximal tiefer eingekerbt, jener der Hinterflügel ober- wie unterseits schmäler; die Hinterflügel analwärts breiter hellgelb bezogen als Ostjava-Exemplare.

Die Vorderflügelunterseite am Innenrand ausgedehnter weiß aufgehellt als Javanen. Mit *glance* Butl. hat *balina* nicht die geringste Aehnlichkeit.

Patria: Bali, 3 ♂♂ Koll. Fruhstorfer.

Salatura panda balina nov. subspec.

Habituell kleiner als *panda* Godt. von Java, heller gelb und mit stark verschmälerten schwarzen Rändern der Flügel-Oberseite und fast obsoletem schwarzem Subapikalband der Vorderflügelunterseite. Art neu für Bali.

2 ♀♀ in Koll. Fruhstorfer, ♂♂ ♀♀ in Koll. Martin.

Tachyris nero F.

Neu für Bali! Von Javanen anscheinend nicht verschieden! ♂♀ Koll. Fruhstorfer.

Appias leptis balinus nov. subspec.

Neu für Bali! Auffallend verschieden von *leptis leptis* Feld. durch die stark verschmälerten Außenränder aller Flügel und die wesentlich eingeengte schwarze Subapikalbinde der Vorderflügel.

Bali, Septbr., 2 ♂♂ Koll. Fruhstorfer.

Macroploea corus defiguratus nov. subspec.

Dr. Martin's javanischer Sammler hatte das Glück, eine große Serie dieser für die Insel neuen *Euploea* zu fangen, die mir in Ostjava nie begegnet ist, von mir aber in mäßiger Anzahl in Palabuan gefangen wurde. Verglichen mit *corus pavellae* Zincken von Java stellt *defiguratus* eine verdunkelte Satellitinselrasse dar, ausgezeichnet durch die violetten statt weißen inneren Submarginalmakeln der Vorderflügel und die viel kleineren, meist aber völlig fehlenden Antemarginalpunkte aller Flügel. Daß *defiguratus* auch von Gestalt kleiner ist als Javanen ist bei einem Balifalter selbstverständlich.

In Lombok hatte ich nicht das Glück, eine *Macroploea* zu fangen, trotzdem solche dort an der Südküste im September gewiß zu finden sind.

Patria: Bali, Sept. 1906. 2 ♂♀ Koll. Fruhstorfer.

Euploea crameri singaradha nov. subspec.

♂♀ kommen der *crameri pagenstecheri* Hagen am nächsten, von der *singaradha* hauptsächlich durch das Auftreten großer weißer Medianpunkte der Vorderflügel differiert.

Von *crameri* Lucas aus Borneo entfernen sich Bali-Exemplare schon durch ihre Kleinheit, die zierlichere Submarginalpunktierung aller Flügel und das Erscheinen riesiger weißer Diskalmakeln der Vorderflügel bei den ♀♀.

Patria: Bali, Sept. 2 ♂♂ Koll. Fruhstorfer, ♂♀ Koll. Dr. Martin.

Mit der javanischen *crameri tanggerensis* m. hat *singaradha* gar keine Aehnlichkeit.

Tanaëcia palguna balina nov. subspec.

♂♀ nähern sich der *stygiana* Fruhst. von Lombok, die weiße Diskalbinde aller Flügel jedoch dunkler bestäubt, wesentlich schmäler.

Die Unterseite ist noch mehr verdunkelt, die weißlichen Längsbinden grauweiß statt reinweiß, deren distale braune Begrenzung beim ♀ weniger markant als bei Lombok-Exemplaren.

Habituell bleibt *balina* wie fast alle Balifalter sowohl hinter *palguna* Moore von Java, wie insbesondere hinter *stygiana* von Lombok zurück.

Patria: Bali, Septbr. 1906, ♂♀ Koll. Fruhstorfer.

Symbrenthia hippoclus balinus nov. subspec.

(*S. hippoclus* de Nicéville, J. As. S. Beng. 1898 p. 690.)

Trotz der Nähe von Java hat sich *hippoclus* auf Bali sogar sehr auffallend von *hippocla* Hb. und ebenso von der östlichen Nachbarrasse (*lombokensis* Fruhst.) differenziert. Die subapikale rötlichgelbe Querbinde der Vorderflügel schmäler als bei Javanen.

♀. Die weiße Subapikalbinde der Vorderflügel und die weiße Submarginalbinde der Hinterflügel wesentlich schmäler als bei *lombokensis* und *hippocla*.

Die Unterseite der ♀♀ wesentlich dunkler als bei Java ♀♀. *Balinus* bleibt wie üblich habituell hinter ihren Schwesterrassen zurück.

Das ♀ war bisher von Bali unbekannt, es gehört der weißen Form an.

Patria: Bali, Septbr. 1906. 3 ♂♂ 1 ♀ Koll. Fruhstorfer.

Symbrenthia hypselis redesilla Fruhst.

3 ♀♀ anscheinend identisch mit der unterseits viel bunter gefärbten Ostjava-Form, die ich von der westjavanischen *hypselis hypselis* Godt. abtrennte.

Eine neue Neptis von der Insel Saleyer.

Von *H. Fruhstorfer.*

Neptis hylas saleyra nov. subspec.

♂. Steht der *celebensis* Hopf., wie sie mir aus Nord-Celebes in großer Anzahl vorliegt, sehr nahe und zeigt dieselben verdüsterten weißen Binden der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: Neue Rhopalocerenrassen der Insel Bali. 238