

Die Gewohnheit der Benennung von Einzelwesen zieht immer weitere Kreise. Der Abbé Ch. Cabeau machte die Gattungen *Apatura* und *Limenitis* zum Gegenstand „neuer“ Aberrationsspaltung (Revue mens. Soc. entom. Namuroise, 1910 Nr. 1). Er benennt: *Apatura iris* ab. *iolata* eine Zwischenform vom Typus zu *iole*, bei der die Vorderflügel nur 5 kleine weiße Punkte haben. (Es bleiben also noch Namen übrig für Individuen mit 4, 3, 2 und 1 Punkt. Welche aussichtsvolle Fülle für Autorenstolz!) Ferner: *A. ilia* ab. *transvelata*: eine *clytie*-Stufe von sehr hellbrauner Färbung, das beiderseits gut begrenzte braune Mittelband des Hinterflügels nicht durch Gelb zerteilt. Soll in beiden Geschlechtern gemein sein; sodann ab. *circumpunctata*: ebenfalls *clytie*-Stufe, sehr lebhaft gelbrot mit rosig-blauem Reflex; das braune Mittelband des Hinterflügels ist an der Distalseite (Außen-seite) von einer Reihe starker schwarzer runder Fleckchen begleitet. Das Analauge besitzt eine bläuliche Pupille, die gelbe Saumbinde sehr breit, dunkle Berandung kaum bemerkbar. Weiter: ab. *irradiata*: ♂ Oberseite gelbrötlich, dunkler als bei der vorigen, im Hinterflügel die braune Mittelbinde in Flecke aufgelöst, diese Flecke bilden längliche Strahlen, deren distale (nach außen weisende) Spitzen weit in den gelblichen Saumteil vordringen. Jeder der Flecke enthält einen länglichen gelben Kern, mehr oder weniger deutlich. Reflex blau-violett. Weiter: ab. *trochoides*: ♂ Oberseite bräunlichgelb, im Hinterflügel die Mittelbinde in Flecke aufgelöst, diese bilden hier schwarze längliche, an beiden Seiten stumpfe Strahlen, die sehr gut voneinander getrennt sind. Saumfeld gelb, sehr schwach bräunlich gerandet. Unterseite teilweise olivfarben. Reflex wie bei *clytie*. Endlich: *Limenitis populi* ab. *auronitens*: ♂ Vorderflügel oben wie bei der Hauptform mit leichter Neigung zu ab. *tremulae*, also die Flecke etwas trübe. Die farbige Submarginalbinde lebhaft goldgelb statt ockergelb. Unterseite bleicher in der Farbe. Alle Formen gefangen bei Virton im Juli.

In gleichem Organ beschreibt Dr. A. Dormal ein im Juli bei Namur gefangenes ♀ *Lasiocampa quercus* ab. *pusilla*: Sehr klein (45 mm Spannweite), die Vorderflügel zeigen keine besonderen Eigentümlichkeiten, im Hinterflügel das Wurzelfeld nicht gelblich, sondern ebenso wie im Vorderflügel gefärbt. Autor findet auch bei Tutt (Brit. Lepid. Vol. III), der die Art eingehend analysiert hat, keine Form, die mit *pusilla* zu vergleichen ist (nb: Das will allerdings viel sagen, denn als einen „großen Treffer“ möchte ich es bezeichnen, noch abweichende Individuen zu finden, die Tutt nicht bereits mit Namen bedacht hat, falls er die betreffende Art überhaupt behandelte!). Dr. Dormal schließt an seine Beschreibung die Betrachtung, daß man Zwergtiere der Art wohl gewaltsam erhalten kann, wenn man die Raupen zwingt, ausschließlich Fichte (? oder Kiefer) zu fressen, die sie in der Natur verschmähen. In der Natur dagegen ist dieser Fall nicht anzunehmen, weil die Raupe eine genügende Zahl Futterpflanzen annimmt und sehr wanderlustig ist. Es müssen also andere Ursachen wirken, durch welche solche Zwergtiere entstehen.

In Halle a. S. hat sich aus dem Verein für Naturkunde eine Entomologische Gesellschaft auskristallisiert. Sie wurde 1907 gegründet und hat sich die Erforschung der Halleschen Lokalfauna in systematischer und biologischer Hinsicht zum Ziel gesetzt. Sehr fördernd hierbei ist die Herausgabe von Mitteilungen im Buchdruck, von denen kürzlich Heft 1 als Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für

Naturwissenschaften“ (Band 81) erschienen ist. Das Heft ist reichhaltig und der Inhalt meist recht interessant und lehrreich; er legt ein beredtes Zeugnis über die Tätigkeit der Halleschen Kollegen ab. Sehr bevorzugt erscheint hiernach die Biologie und Bionomie. Für Vogelfreunde interessant sind die Beobachtungen von Daehne über die Angriffe der Vögel auf Schmetterlinge unter dem Titel „Schmetterlingsfeinde aus der Klasse der Vögel“. Nicht weniger als 21 Vogelarten hat D. auf der Schmetterlingsjagd ertappt, im Sprunge, im Fluge, im Laufen und Sitzen, einige Fälle, in denen man beabsichtigtes Ablesen erkennen kann, andere vielleicht Zufalls- oder Gelegenheitsraub. Interessant erscheint mir besonders die Liebhaberei eines Baumfalken (*Falco subbuteo*) für allerlei Schmetterlinge. D. traf ihn beim Zerpflücken von Tagfaltern und beim Ergreifen von Schwärmern. Selbst ausgesprochene Körnerfresser (Sperlinge) verschmähen ein Lepidopteron nicht und das erklärt D. damit, daß sie diese zarte Kost für ihre Nestjungen gebrauchen. Auf einige andere Artikel der „Mitteilungen“ komme ich später zurück.

Die E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, versandte Lieferung 20 und 21 von Berge's Schmetterlingsbuch, von denen namentlich die letztere wegen des darin enthaltenen „allgemeinen Teiles“ (Anfang) höchst bemerkenswert ist. Autor, Prof. Rebel, beschäftigt sich darin auch mit dem Wesen der Systematik, dem Artbegriff und der Nomenklatur. Es ist dies das erste Mal, daß diese noch vielfach unverständenen Fragen in erquickender Klarheit und Kürze populär behandelt werden. Hieran schließt sich, gleich faßlich und lehrreich, ein Kapitel über die Organisation der Lepidopteren mit erläuternden Abbildungen und vielseitigem Inhalt, der den neueren Forschungen und Erkenntnissen auf diesem Gebiet vollauf Rechnung trägt und für jeden Interessenten eine Grundlage darstellt, die dazu dient, um solchen Dingen überhaupt das nötige Verständnis entgegenzubringen

(Unter eigener Verantwortlichkeit des Verfassers.)

Die Gattung *Sternotomis* Westwood und ihre nächsten Verwandten. (Cerambycidae.)

Artenübersicht, zusammengestellt von
Emil Ross, Berlin N. 58, Schliemannstr. 25.

I. *Zographus* Castelnau [1840].

- | | |
|---|-----------------|
| aulicus Bertol., Nov. Comm. Ac. Bonon. X, p. 428, pl. X, fig. 4. (1849). — Gerstäcker, Peters Reise, p. 328, pl. XX, fig. 1. (1862). | Mozambique. |
| ferox Harold, Mitt. München. Ver. p. 111. (1878). | Central-Afrika. |
| v. pulverulentus Nonfried, Stettiner ent. Zeitg., p. 226. (1906). | Mozambique. |
| balteatus Heath, Entomologist XXXVI, p. 273. (1903). | Ost-Afrika. |
| hieroglyphicus Gerstäcker, Monats. Berlin. Academ., p. 267. (1855.) — id., Peters Reise, p. 329, pl. XX, fig. 2. (1862). | Mozambique. |
| lanei Heath, Entomologist XXXVIII, p. 74, fig. 1. (1905). | Angola. |
| modestus Pering, Tr. S. African. Phil. Soc. IV, p. 180. | Süd-Afrika. |
| niveisparsus Chevrol., Rev. Zool., p. 343. (1844.) — Westwood, Arcan. ent. II, p. 156, pl. 84, fig. 5. (1845.). | Port Natal. |

oculator Fabr., Syst. Ent. App., p. 823. — Olivier, Entomol., IV, 67, p. 67, pl. II, fig. 11. — Casteln., Hist. nat. II, p. 474. (1840.) — Heyne-Taschenb., exot. Käfer, pl. 37, fig. 20. (1908.) **Süd-Afrika.**
ocellatus Degeer, Mém., VII, p. 654, pl. 49, fig. 1. (1778.) „
maculatus Voet, Cat. II, p. 9, pl. VII, fig. 21 „
v. Ruschi Nonfried, Stettiner ent. Ztg., p. 225. (1906.) „
plicaticollis Thoms., Phys. I, 6, p. 169 **Kongo.**
8.

II. **Baliesthes** Gahan [1886].

alboguttatus Fairm., C. R. ent. Belgique, 1885, p. 9. — Fairm., Ann. Soc. Ent. France (6), VII, p. 336. — Gahan, Ann. Nat. Hist. (6) XIV, p. 411. **Ost-Afrika.**

1.

III. **Timoreticus** Pering. [1896].

armaticeps Pering., Tr. ent. Soc. London, 1896, p. 181. (1896.) **Süd-Afrika.**
hamafus Auriv., Dt. ent. Zeitschrift, Berlin 1907, p. 79. (1907.) **West-Afrika.**
imbellis Gahan, Distant, Ins. Transvaal I, p. 132, pl. XII, fig. 1. (1904.) **Transvaal.**
mashalli Auriv., Ark. Zool. 3, No. 18, p. 20. Stockholm, 1907. **Mashunaland.**

4.

IV. **Pinacosterna** Harold [1876].

Mechowi Quedenf., Berliner ent. Zeitschrift, XXV, p. 289 u. 345, pl. VI, fig. 3. (1882.) **Angola.**
mimica Jordan, Nov. Zool. X, p. 164. (1903.) **Afrika.**
Nachtigali Harold, Col.-Heft XVI, p. 190. (1876.) — Heyne-Taschenb., exot. Käf., pl. 35, fig. 19. (1908.) **Angola.**
nigra Auriv., Ark. Zool. 3, No. 18, p. 22. (1907.) **Kongo.**
Smithi Jordan, Nov. Zool. X, p. 164. (1903.) **Afrika.**
Weymanni Quedenf., Berliner ent. Zeitschrift XXV, p. 346. (1882.) **Riv. Quango.**

6.

V. **Sternotomis** Westwood. [1836].

aenea Parry, Trans. ent. Soc. V, p. 185, pl. 8. (1849.) **Guinea.**
aglaura Kolbe, Stettin. ent. Zeitschr., 1894, p. 61. (1894.) **Uganda.**
amabilis Hope, Ann. nat. Hist. XI, p. 369. (1843.) — Westwood, Arcan. ent. II, p. 152, pl. 86, fig. 4. (1845.) **Aschanti.**
amoena Westw., Ann. nat. Hist. VIII, p. 123. (1841.) — Arcan. ent. II, p. 85, pl. 69, fig. 3. (1845.) — Thoms., Phys. I, 6, p. 174. (1868.) **Guinea.**
Bohemani Chevrol., Rev. Zool. 1844, p. 343. (1844.) — Westwood, Arcan. ent. II, p. 154, pl. 85, fig. 3. (1845.) **Port Natal.**
Ferreti Westwood, l. c. p. 153, pl. 85, fig. 1. — Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1850, p. 396, pl. 24,

fig. 7. — Heyne-Taschenberg, exot. Käf., pl. 35, fig. 11. (1908.) **Abessinien.**
Bohndorffi Waterh., Ann. Nat. Hist. (5) XVII, p. 501. **Niam-Niam.**
Cailliaudi Latr., Voy. Cailliaud. Ins. II, p. 17. — Chevrol., Rev. Zool. 1844, p. 344. **Meroë.**
callios Fairm., Ann. Soc. ent. France, 1891, p. 271. (1891.) — Heyne-Taschenberg, exot. Käf., pl. 35, fig. 16. (1908.) **Kongo.**
carbonaria Auriv., Arkiv. Zool. I, p. 320. (1904.) **Afrika.**
chloroleuca Harold, Col.-Heft XVI, p. 188. (1876.) **Angola.**
chrysopras Voet, Cat. II, p. 10, pl. 7, fig. 22. — Westwood, Arcan. ent. II, p. 155, pl. 86, fig. 1. (1845.) — Heyne-Taschenberg, exot. Käf., pl. 35, fig. 14. (1908.) **Guinea.**
Robillardi Dupont, Dej. Cat. 3, ed. p. 369. **Senegal.**
confluens Harold, Col.-Heft XVI, p. 183. (1876.) **Angola.**
consularis Harold, Mitt. Münch. Ver., 1878, p. 110. (1878.) **Central-Afrika.**
cornutor Fabr., Syst. Ent., p. 177. — Olivier, Entomol. IV, 67, p. 61, pl. 17, fig. 132. — Klug, Ins. Madagasc., p. 205. **Afrika mer.**
maculata Oliv., Ent. IV, 67, p. 68, pl. 22, fig. 174 a ♂, b ♀; pl. 7, fig. 49 a, b ♀. — Casteln., Hist. nat. II, p. 474. **Madagascar.**
maculator Schönh., Syn. Ins. I, 3, p. 386. — Heyne-Taschenberg, exot. Käf., pl. 35, fig. 8. (1908.) „
coronota Jordan, Stettin. Ent. Zeit., 1896, p. 367. (1896.) **West-Afrika.**
crux nigra Hope, Trans. Zool. Soc. I, p. 104, pl. 15, fig. 2. — Westw., Arcan. ent. II, p. 148, pl. 85, fig. 4. (1845.) **Sierra Leona.**
Dubocagei Coquerel, Ann. France, 1861, p. 186, pl. 5, fig. 2. (1861.) **Angola.**
ducalis Klug, Erman. Reise, Atl. V, p. 44, pl. 16, fig. 4. (1835.) — Westw., Arcan. ent. II, p. 155, pl. 85, fig. 5. (1845.) **Gambia.**
aper Perch., Gen. Ins. IV, Nr. 5, pl. 16. (1836.) „
var. philosophica Thoms., Arch. ent. I, p. 126 et 326. (1857.) **Senegal.**
eremita Westw., Arcan. ent. II, p. 126, pl. 78, fig. 3. (1845.) — Dej., Cat. 3, ed., p. 369. „
euchroma Fairm., Ann. Soc. ent. Belgique, 1904, p. 255. (1904.) **Madagascar.**
Fairmairei Argod, Bull. Soc. ent. France, 1899, p. 208. (1899.) **Ost-Afrika.**
(ferox Harold) Harold, Col.-Heft XVI, p. 184. (1876.) **Angola.**
fulvosignata Quedenf., Berlin. ent. Zeit., 1882, p. 343, pl. 6, fig. 2. (1882.) **Riv. Quango.**
Gamae Coquerel, Ann. France, 1861, p. 188, pl. 5, fig. 4. (1861.) **Angola.**

(Schluß folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Ross Emil

Artikel/Article: [Die Gattung Sternotomis Westwood und ihre nächsten Verwandten. \(Cerambycidae.\) 252-253](#)