

Zwei Reisen nach Griechenland.

II. Parnassos- und Vjeluchgebirge 1933 (Lep.).

Von Bernhard Zukowsky, Hamburg.

(Schluß)

Grypocera

- Carch. alceae* Esp. P. V. *Hesp. orbifer* Hbn. Nicht selten. V.
Carch. altheae v. *baeticus* Rmb.
 Nicht selten. V.

Sphingidae

- Macr. stellatarum* L.

Zygaenidae

- Ino crassicornis* Stgr. V. *Zyg. achilleae* v. *hellena* Bgff.
Ino manni Led. Allenthalben. V. Recht häufig. V.
Zyg. punctum O. P. V. *Zyg. achilleae* ab. *quinquemaculata* V.
Zyg. oxsenheimeri Zell. Häufig. V.

Synthomidae

- D. hyalina* Frr. Nur zwei ♂♀ am Fuße des Parnaß.

Arctiidae

- Roes. togatulalis* Hbn. P. *A. villica* L. Häufig. P. V.
Cel. subchlamydula Stgr. P.

Lymantriidae

- O. terebynthi* Frr. Nicht selten, auch ♀♀ am Licht. P.

Cochliidiidae

- C. creticum* Rbl. Von dieser, bisher am Licht erbeutet. Die Art ist
 nur aus Kreta bekannten Art neu für das griechische Fest-
 wurden 31 Stück, leider nur ♂♂, land.

Aegeriidae

- Ch. minianiformis* Frr. P. *Ch. minianiformis* ab. *pepsiformis*
 Led.

Cossidae

- D. ulula* Bkh.

Drepaniidae

- C. glaucata* Sc. Die gefangenen der weniger stark gezeichneten
 Tiere leiten schon vielfach zu *v. aeruginosa* über. V.

Noctuidae

- Agr. exclamationis* L. P. *Sid. vitellina* Hbn. P.
M. leucophaea ab. *vestigialis* Esp. *Car. superstes* Tr. = (*blanda* Hbn.) P.
 Einige Exemplare. V. *Ath. gilva* Donz. V.
H. monoglypha Hufn. *Eul. adulatrix* Hbn. P. Nicht selten.
Harm. nana Rott. V. *Cop. oliva* Stgr. P. Nicht selten.
Cl. hyperici F. P. V. Häufig an bei- *Cop. olivina* H. S. V.
 den Orten. *Omph. anatolica* Led. P.

Am. aurita = (*dejeani* Hbn.) P.
O. algira L. P. V.
Ph. gamma L.
Chl. peltigera Schiff.
Tar. luctuosa Esp. V.
E. arcuinna Hbn. P.
Gon. mi Cl. V.
Z. insularis Rmb. P.
Eph. eutychea Tr. und ab. *dotata* H.S.
 Gemein, namentlich am Parnaß;

an einem Abend wurden über
 150 Tiere gezählt.
Cat. conversa Esp. Einige Exemplare
 in Lamia.
Cat. conversa v. *agamos* Hbn. Lamia.
A. cataphanes Hbn. V.
Hyp. proboscidalis L. V.
Hyp. lividalis Hbn. Ein Stück. V.
Rh. antiqualis Hbn. P. V.

Geometridae

Orth. cribraria Hbn. V.
Hem. chrysoprasaria Esp. =
 (*vernaria* Hbn.) P.
Chl. pulmentaria Guen. P.
Chl. viridata L. P. V.
Cleta filacearia H. S. Auf dem
 Vjeluchi um 1500 m gar nicht
 selten.
Pt. herbariata F. P.
Pt. sodaliaria H. S. P. Häufig.
Pt. ostrinaria Hbn. P.
Pt. degeneraria Hbn. P.
Pt. inornata Haw. P. Sehr häufig.
Ac. coenosaria Led. V.
Ac. luridata Z.
Ac. submutata Tr. P. V. Häufig
Ac. imitaria Hbn. P. V.
Ac. marginepunctata Goeze Gemein.
Pt. filicata Hbn. V. Häufig
Cos. pupillaria v. *badiaria* Tti. P. V.
Rh. tabidaria Z. P. V.
Rh. sacraria L. V.
An. plagiata L. ssp. P. V.
Op. luteolata L. ssp. V.
Hor. tersata Schiff. V.
Püng. capreolaria Schiff. V.
Cid. variata Schiff. ssp. V. Drei
 Stücke dieser eigentümlichen
 Form, die auffallend ähnlich der
variolata Stgr. von Marokko
 aussieht
Cid. riguata Hbn. V. Gemein.
Cid. ludificata Stgr. Nur ein Stück. V.

Cid. achromaria Latr. ssp. Eine
 sonderbare Form; sie steht zwi-
 schen *achromaria* und *nebulata*
 Tr., auch ist eine entfernte Ähn-
 lichkeit mit *approximata* Stgr.
 vorhanden Sehr häufig V.
Cid. obstipata F. P. Ein ♂♀
Cid. corollaria H. S. P. V. Recht
 häufig
Cid. permixtaria H. S. V.
Cid. bilineata ab. *testaceolata*
 Stgr. P.
Eup. cucullaria Hufn. P.
Eup. satyrata Hbn. ssp. Eine häu-
 tige Form, die meist ganz frisch
 im Juli erschien und eine gewisse
 Ähnlichkeit mit *graphata* v.
spröngertsi Dtz. aufweist. V.
Eup. oxycedrata Rmb. V.
Eup. pusillata Schiff. V.
G. pumilata Hbn. P. V.
B. umbraria Hbn. P. V.
B. umbraria v. *decostraria* Ob. V.
Gn. onustaria H. S. Ein Stück
Gn. glaucinaria Hbn. V. Nicht sel-
 ten. Zwei Stücke sind fraglich
 zur *intermedia* Wehrli zu ziehen
Gn. sartata Tr. Nicht selten
Gn. variegata Dup. V.
E. atomaria v. *orientaria* Stgr. V.
Perc. strigillaria ssp. V. Größer,
 durchschnittlich heiler als Mittel-
 europäer
Asp. ochrearia Rossi. V.

100 Micros in ca. 35 Arten werden später beschrieben.