Bestimmungshelfer zum Bestimmen ähnlich aussehender Großschmetterlinge der mitteldeutschen Fauna.

Von Gü n t e r W e n z e l, Magdeburg.

(Fortsetzung)

Cucullia artemisiae Hufn., *absinthii* L.

C. artemisiae Hufn. Grundfarbe der Vorderflügel graubraun. Querstreifen deutlich, der innere scharf gezackt. Zwischen beiden über dem Innenrande ein heller Wisch. Nieren- und Ringmakel hell, innen verdunkelt und schwarz umzogen.

C. absinthii L. Grundfarbe etwas heller bräunlich als bei der vorigen, besonders an der Wurzel, auf dem Halskragen und auf den Schulterdecken. An Stelle der Makeln deutliche schwarze Punkte. Die Querstreifen doppelt, der hintere Querstreifen nur über dem Innenrande deutlich erkennbar.

Abrostola triplasia L., *asclepiadis* Schiff. und *tripartita* Hufn.

A. triplasia L. In Zeichnung und Farbe der folgenden sehr ähnlich. Die Rippen vor dem Saum und vor der Wellenlinie nicht schwärzlich bestäubt. Wurzelfeld hellbraun.

A. asclepiadis L. Rippen zwischen Wellenlinie und Saum fein schwarz bestäubt. Wurzelfeld rosenfarbig.

A. tripartita Hufn. Grundfarbe der Vorderflügel mehr aschgrau. Die hellen Zeichnungen an der Wurzel und im Saumfelde mit grünlicher Tönung. Die Wellenlinie an der Spitze beiderseits schwarz begrenzt.

Catocala elocata Esp., *nupta* L., *sponsa* L., *promissa* Esp.

C. elocata Esp. Die schwarze Mittelbinde der Hinterflügel ist fast gleichmäßig breit, verläuft fast gerade nach unten und knickt dann in einem stumpfen Winkel ab.

C. nupta L. Die schwarze Mittelbinde der Hinterflügel in der Mitte verengt, bildet einen nach innen offenen Bogen und knickt fast rechtwinklig nach innen ab.

C. sponsa L. Die schwarze Mittelbinde w-förmig, stark gebrochen, in der Mitte des Hinterflügels fast einen rechten Winkel bildend.

C. promissa Esp. Die schwarze Mittelbinde nur wenig geschwungen und fast geradlinig verlaufend.

Toxocampa pastinum Tr., *viciae* Hb., *craccae* F.

T. pastinum Tr. Ringmakel durch schwarzen Punkt angedeutet. Nierenmakel schwarzbraun, hakenförmig nach außen gebogen, nach außen ein oder zwei schwarze Punkte. Nierenmakel wird durch die Rippen nicht geteilt.

T. viciae Hb. Ringmakel nicht vorhanden. Nierenmakel durch die hellen Rippen geteilt. Querlinien deutlicher, ebenso die helle Wellenlinie. Hinterflügelunterseite mit deutlicher dunkler Querlinie.

T. craccae F. Ringmakel als feiner brauner Punkt sichtbar. Nierenmakel braun, Querlinien und Wellenlinie undeutlich.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Wenzel Günter

Artikel/Article: [Bestimmungshelfer zum Bestimmen ähnlich aussehender Großschmetterlinge der mitteldeutschen Fauna. 48](#)