

Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica. Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen und Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt am Main (gegr. 1884).

Schriftleitung: Dr. Georg Pfaff, Frankfurt a. M. mit einem Redaktionsausschuß, unter Mitarbeit von Rektor G. Calliess, Guben u. a. Manuskripte an den Redaktionsausschuß der Entomologischen Zeitschrift: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung dort.


Eine neue Noctuide aus Iran.

Eustrotia Hb. (*Erastria* O.) *iranica* sp. nov.

Von H. Kotzsch, Dresden-Blasewitz.

(Mit 1 Abbildung.)

Die vorjährige Sammelreise nach Ost-Iran erbrachte die in dreifacher Größe abgebildete Eule, die auch in die Gattung *Eustrotia* gestellt, isoliert steht durch ihre ausgefallene Färbung und Zeichnung. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist hellgrau, die innere schwarze Querlinie ist gezackt, am Vorderrande verstärkt und ver-



In dreifacher Größe.

läuft schräg zum Innenrand. Die äußere Querlinie ist am Vorderrande stark verdickt, läuft in einem Bogen um die Nierenmakel herum, berührt diese am unteren Rande und verläuft von dort gerade zum Innenrand fast parallel zum Außenrande. Die Ringmakel ist sehr deutlich schwarzgrau, weiß eingefasst, die Nierenmakel oval, etwas lichter grau und scharf weiß umrandet. Die graue Grund-

farbe ist gegen die Flügelwurzel zu am hellsten, Fransen geteilt, innerer Teil heller mit einer feinen durchgehenden bräunlichen Linie, äußerer Teil dunkler. Hinterflügel einfarbig grau ohne Besonderheit, Fransen entsprechend den Vorderflügel. Unterseite der Vorderflügel lichtgrau mit schwachen Spuren einer Mittellinie, sonst ohne Zeichnung. Hinterflügelunterseite etwas heller grau. Stirne nackt, Kopf, Thorax und Hinterleib grau, letzterer glatt beschuppt. Die Geschlechter in der Zeichnung gleich, nur der Vorderflügel-schnitt der ♀♀ rundlicher.

Patria: Nordost-Iran, Kuhi Mirabi, Waldzone 1600—1900 m, Juli 1939 leg. Exp. Wernicke. Spannweite 18 mm, Abbildung in dreifacher Größe.

Ein kleiner Ausschnitt über *Zygaena ephialtes* L. (Lep.).

Von *Hugo Reiß*, Berlin.

(Fortsetzung von Seite 72.)

Nach dieser Ergänzung des Geltungsbereichs des Namens *peucedani* Esp. nach Westen, komme ich auf die *peucedani* Deutschlands zurück.

Ob die Benennung der var. *baltica* Holik von Osterode (Ostpreußen) voll berechtigt ist, ist fraglich. Ich habe leider zu wenig Material in der Sammlung. Diese Stücke sind nicht größer als Stücke z. B. der Umgebung Berlins. (Straußberg, Niederfinow) in meiner Sammlung. Alle meine Stücke von Osterode sind sechsfleckig und die rote Beschuppung der Unterseite der Vorderflügel ist gut ausgebildet. Auch die Stücke der Sammlung ZOBEL, Osterode, die ich sämtlich gesehen habe, haben auf mich bei Bearbeitung des Osteroder Zygänen nicht den Eindruck der Benennungswürdigkeit gemacht. Der hohe Prozentsatz der f. *athamanthoides* Reiß bei den Stücken des Herrn HOLIK von Osterode (5 ♂♂ unter 12 ♂♂, 8 ♀♀, die zur Beschreibung vorlagen, scheint sich auf Grund ausgesuchten Materials ergeben zu haben.

Die f. *ephialtoides* Reiß ist bei einzelnen Populationen der subsp. *peucedani* häufiger; so wurde sie im Jahre 1939 bei Wiese im Spree-wald von den Herren LOQUAY und NEUMANN in größerer Zahl gefangen, darunter auch f. *medusoides* Reiß, die ich auch in der Umgebung von Beuren (Schwäb. Alb) am 29. 7. 20 persönlich gefangen habe.

Die so formenreiche gut unterschiedene, überwiegend sechsfle-kige peucedanoide var. *bohemia* Reiß aus der Umgebung Prags zeigt an umbezeichneten Formen die f. *athamanthoides* Reiß, f. *ephialtoides* Reiß, f. *medusoides* Reiß und f. *coronilloides* Reiß.

c) Bei der überwiegend fünffleckigen stark verschiedenen subsp. *kiewensis* Reiß aus der Umgebung Kiews finden wir die f. *peuce-danooides* Reiß und selten f. *medusoides* Reiß.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Kotzsch Hans

Artikel/Article: [Eine neue Noctuide aus Iran. Eustrotia Hb. \(Erastria O.\) iranica sp. nov. 73-74](#)