13,846a
Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Guben, den 15. April 1911. No. 3. 5. Jahrgang.

Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift" erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von *1.50 M.* vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Zwei neue afrikanische Heterocera der Gattungen Phasicnecus und Thaumetopoea. — Eine neue afrikanische Psychide. — Etwas über Cucullia frandatrix. — Noch Einiges über Macrothylacia rubi. — Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge. (Fortsetzung.) — Zum Vorkommen von Colias edusa. — Kleine Mitteilungen. — Sitzungsberichte des Berliner Entomologischen Vereins.

Zwei neue afrikanische Heterocera der Gattungen Phasicnecus und Thaumetopoea.

— Von *Embrik Strand* (Berlin, Kgl. Zoolog. Museum). —

Phasicnecus dehanicus Strand n. sp.

Ein ♂ von Dehane, Süd-Kamerun.

Oben hell rötlichbraun, spärlich mit beigemischter graulicher Bestäubung, die Hinterflügel an der Wurzel und am Vorderrande ein wenig heller. Ueber beide Flügel zieht eine postmediane oder etwa submediane Querreihe silberweißlicher, schmal und undeutlich dunkler umrandeter Flecke, von denen die der Hinterflügel, 7 an der Zahl, klein, meistens undeutlich und unter sich etwa gleich groß sind, und zwar erstrecken sie sich vom Innenrande bis zum Felde 6, während die der Vorderflügel unter sich an Größe verschieden sind: am Innenrande ein etwa 3 mm langer und breiter, an der proximalen und distalen Seite gezackter Fleck, in den Feldern 2 und 3 je ein kleinerer, dreieckiger Fleck und ein etwa gleich großer, aber rundlicher Fleck im Felde 6, während in den Feldern 4, 5 und 7 nur die Andeutung je eines Fleckes vorhanden ist. Zwischen dem Innenrande und der Rippe 6 finden sich 5 undeutliche, schwärzliche, halbmondförmige Sublimbalflecke und läßt sich die Andeutung einer schwärzlichen, stark gekrümmten und gebrochenen, z. T. in Flecke aufgelösten antemedianen Querlinie erkennen und zwar, ebenso wie die Sublimbalflecke, auch an den Hinterflügeln. An beiden Flügeln trägt diese Linie auf dem Innenrande einen Fleck, der deutlicher als die anderen ist. Beide Flügel mit feiner brauner Saumlinie. Die Fransen wie die Flügel, die des Innenrandes der Hinterflügel blaß goldgelblich. Körperoberseite wie die der Flügel, Afterbürste goldgelblich schimmernd. Die ganze Unterseite hell rehgraulich, im Saumfelde und an den Fransen mehr bräunlich. Augen tiefschwarz; die Vorderbeine scheinen innen dunkler zu sein. Flügelspannung 34, Flügellänge 19, Körperlänge 13 mm.

Thaumetopoea abyssinica Strand n. sp.

♂ weicht von *Th. apologetica* Strand durch folgendes ab: Die weiße Schrägbinde der Vorderflügel ist am distalen Ende scharf zugespitzt und diese Spitze liegt hinter dem Vorderrande des Flügels; dieser Rand ist also in seiner ganzen Länge dunkel, während bei *apologetica* die Binde den Vorderrand selbst bedeckt und zwar in einer Länge von 5 mm, während die Breite der Binde im Wurzelfelde bloß 2 mm ist; letztere ist bei *apologetica* außerdem reiner weiß als bei den meisten Exemplaren von *abyssinica*. Hinterflügel grau, nur in der Wurzelhälfte weißlich, welche beiden Färbungen sich auch an der Unterseite erkennen lassen. An der Unterseite der Vorderflügel ist die helle Binde ähnlich wie bei *apologetica* angedeutet, aber noch undeutlicher und nicht oder kaum auf dem Vorderrande selbst endend; Saumlinie schwarz. Oberseite des Abdomen dunkler ockergelb. Größe geringer: Flügelspannung 24—25, Flügellänge 11.5, Körperlänge mit Afterbüschel 11 mm.

5 ♂♂ von Addis Abeba in Abyssinien, gezüchtet April 1908 (Kostlan).

Ist vielleicht nur eine Lokalform von *T. apologetica* Strand.

* * *

Die Typen befinden sich im Berliner Museum.

Eine neue afrikanische Psychide.

— Von *Embrik Strand* (Berlin, Kgl. Zoolog. Museum). —

Monda fragilissima Strand n. sp.

Ein ♂ aus der ehemaligen Staudingerschen Sammlung, etikettiert „Angola, Afr. mer." und bestimmt als „*Monda delicatissima* Wlk.", was ohne jeden Zweifel unrichtig ist (die echte *delicatissima*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Zwei neue afrikanlsche Heterocera der Gattungen Phasicnecus und Thaumetopoea. 17