

INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Organ
des Internationalen Entomologen-
Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Aannahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: Aberrationen von *Melitaea maturna* L. aus der Dörries'schen Sammlung in Altona-Bahrenfeld. — Eine neue süd-amerikanische Biene der Gattung *Corynura* Spin. — Mitteilungen über die Verbreitung einiger seltener Schmetterlings-Arten. — Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge. (Schluß.) — Briefkasten.

Aberrationen von *Melitaea maturna* L. aus der Dörries'schen Sammlung in Altona-Bahrenfeld.

— Von G. Warnecke, Altona. —

Mit 3 Abbildungen.

Die 3 Abbildungen aberrativer *maturna* verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Fr. Dörries in Altona-Bahrenfeld, meines verehrten Beraters in der Lepidopterologie, in dessen reicher Sammlung sich die Originale befinden. — Die Abb. 1 zeigt ein auf



Fig. 1.

der Oberseite fast ganz schwarzes Stück, das nur einige rote Flecke und gegen den Außenrand der Vorderflügel eine schwach angedeutete Binde von weißgrauen Flecken besitzt. Die in der Hauptsache einfarbig rote Unterseite ist auffällig auf den Hinterflügeln mit einem breiten weißen, schwarz umgrenzten und von den dunklen Adern durchzogenen Bande versehen.

Der Falter wurde in den achtziger Jahren von Herrn Dörries unter normalen Stücken gezogen, deren Raupen er aus Leipzig erhalten hatte.

Die beiden anderen Falter sind auf den Vorderflügeln ähnlich gezeichnet wie das erste Stück, nur mit breiten rotgelben Binden im Außenfeld, die besonders bei dem Stück Nr. 2 stark hervortreten. Eigentümlich sind auch die beiden roten Flecke im Mittelfeld der Vorderflügel, die an die Makeln der Naktuen erinnern.

Auf der Unterseite der Flügel weisen beide Stücke unter sich die gleiche Zeichnungsanlage auf.

Dies zeigt sich besonders auf den Hinterflügeln. Die Grundfarbe der Unterseite ist ein mattes Rot-



Fig. 2.

braun bzw. Gelbbraun; auffallend verschieden ist aber die Färbung der Binden und Flecke der Hinterflügel. Während sie bei dem Falter Nr. 2 schwarz sind, sind bei Nr. 3 die entsprechenden Binden und




Fig. 3.

Flecke gelblich und nur schwarz umrandert.

Beide Exemplare sind etwa 1897 von zwei Söhnen des Herrn Dörries in Transbaikalien gefangen worden.

Eine neue südamerikanische Biene der Gattung *Corynura* Spin.

Von Embrik Strand (Berlin, Kgl. Zoolog. Museum).

Corynura peruvicola Strand n. sp.

Ein ♀ von Peru, Dept. Cuzco (Garlepp).

Schwarz, grünlich-bronzefarben schimmernd, der grüne Schimmer ist auf dem Untergesicht, der bronzefarbene auf dem Metathorax und dem Hinterrand des ersten Segments am stärksten entwickelt, Man-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Aberrotlonen von *Melitaea maturna* L. aus der Dörries'schen Sammlung in Altona-Bahrenfeld. 35](#)