

besitzt 6 schwarze runde aber bedeutend kleinere Flecke als bei typischen Tieren. Der goldene Subcostalfleck ist oben und unten vorhanden. Der Falter erinnert sehr an *O. poseidon* Dbl. ab. *cronius* Fldr. und weist in seiner Vorderflügelzelle außerdem auf forma *transiens* Prz hin. 1 ♂ in coll. mea.

8. *O. hecuba* Roeb. ab. *inaureomaculata* Prz. (Fig. 8.)

Die vorliegenden Falter sind charakteristisch durch jegliches Fehlen des goldigen Subcostalflecks auf der Oberseite des Hinterflügels. Unterseits kann er dagegen angedeutet sein. Diese Form vereinigt zugleich die forma *nigra* Prz. in sich. 5 ♂♂ in coll. mea.

Zieht man die Stückzahl der hier beschriebenen Formen in Betracht, so liegt der Gedanke nahe, daß diese Aberrationen häufiger vorkommen müssen. Wie mir Herr Kibler aber versicherte, sind obige Tiere eine Auslese aus mindestens 8000 Exemplaren, sodaß diese Formen in obigem Fluggebiet zu außerordentlichen Raritäten zählen dürften.

Nürnberg, April 1912.

I. Nachtrag

zur

Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

H. Kiefer.

(Fortsetzung.)

- Larentia autumnalis* Ström. VII. nicht selten: Gußwerk, Weichselboden (Z.), Hieflau (Galv.)
- * — ab. *obsoletaria* Schille. Umgeb. v. Admont 22. V. 1 ♂ (K.)
- *rubrata* Frr. Spitzenbachgr. Ende V. eine Raupe auf Zwergerlen (G.), Hartelesgraben 15. VIII. 1 St. an Felsen (Z.)
- * — *silacea* Hb. Hieflau 12. VII. 1 St. (Z.)
- * — *berberata* Schiff. Landl 7. VIII. 1 St. (Z.) Haus V. (aus einer im VIII. gefang. Raupe gezogen) (Preiß.)
- * — *rubidata* F. Hartlesgraben 12. VII. 1 St. geflogen (Z.) Schladming (Kess.) [Obertraun im Sommer 1907 (Rzb.)]
- * — *sagittata* F. Gesäuse 29. VII. 1 ♀ (G.)
- * *Asthenia candidata* Schiff. Gams, Hieflau VII. nicht selt. (Z.)
- * *Tephroclystia pyreneata* Mab. Warscheneck (Hauder.)
- *pusillata* F. Scheiblegger-Hochalm 26. V. 1 ♀ (Str.) NB. Meine Stücke stammen alle aus Graz (Fehler im Verzeichnis!) K.
- * — *expallidata* Gn. Landl 11. VII. 1 St. (Z.)
- [*absinthiata* Cl. Obertraun a. L. 28. VIII. (Kitt., Rzb.)]
- * — *satyrata* Hb. Gamsstein (Steyerhütte) Ende VII. (Preiß.), Präbichl 22. VI., Polster 21. VI. (Galv.)
- * — *silenata* Standf. Reichenstein b. Eisenerz 12. VI. 1 Stück (neu für Steiermark) (H.)
- *scriptaria* H. S. Haus (Bodensee b. 1400 m) Ende VII. (Preiß.), [Großer Priel (Hauder)]
- * — *succenturiata* v. *subfulvata* Haw. Präbichl, im Hotel a. Licht (Galv.)
- *impurata* Hb. Admont ♂♀ in Kopula 27. VII. (K.)
- *plumbeolata* Hw. Wildalpen 7. VII. 1 St. (Z.), Admont 25. V. ♂♀ (K.)
- [*abbreviata* Stph. Obertraun VIII. 1906 (Rzb.)]
- [*eviguata* Hb. Obertraun 29. VIII., nicht selten (Rzb.)]
- [*sobrinata* Hb. Obertraun VIII. nicht selten (Rzb.)]

- Chloroclystis rectangularata* L. Admont an Bachrändern und unter Laub im VII. ♂♀ nicht selt. (Str.), Admont (Stiftsmauer) 1 ♀ 21. VI. (K.)
- *debiliata* Hb. Landl 8. VII. 1 Stück, Johnsbach 8. VIII. geflogene Stücke (Z.)
- * — *chloerata* Mab. Gesäuse VI. 1 ♂, Admont VII. 1 ♀ (K.)
- * *Phibalapteryx vitalbata* v. *conspicuata* Hirschke, Gesäuse 12. VII. 1 ♂ (Galv.)
- * — *tersata* Hb. Hieflau, Landl Mitte VII. einzeln (Z.), [Obertraun 16. VII. 1907 (Kitt.)]
- * — *aemulata* Hb. Spitzenbachgr. 1 ♂ Ende VI. (G.)
- Abraxas sylvata* Sc. Spitzenbach VI. (G.)
- *marginata* L. VII., Anfang VIII nicht selten: Landl, Hieflau (Z.), Gesäuse (Galv.), Altaussee (Stern.), Haus (Preiß.)
- * — ab. *nigrofasciata* Schöyen. Umgeb. v. Admont im Mai 1 ♂ (K.)
- Delinia pusaria* L. VII, Anfang VIII häufig: Landl, Gams, Hieflau (Z.), Hieflau (Galv.), Altaussee (Stern.), Haus bis 1200 m Ende VII. (Preiß.)
- *exanthemata* Sc. Landl 15. VII. 1 ♂ (Z.), Haus bis 1300 m Ende VII. (Preiß.)
- Numeria pulveraria* L. Spitzenbachgraben Ende V.: alpine Aberration: kleiner, satter, gesprenkelt u. mehr violett gefärbt als die Stammform (G.)
- *capreolaria* F. VII., VIII. Tamischbachturm bei Groß-Reifling 1 ♂, Johnsbach 1 ♂ (Z.), Sulzkaar ♂ (Galv.), Haus (Eichberg), Kammergeb. (Sonnwendkogel bei 1400—1500 m) (Preiß.)
- Ellopia prosapiaria* L. Kammler-Alm 14. VIII.: 1 ♂ (K.)
- ab. *prasinaria* Hb. Mitte VII. bis Mitte VIII.: Gams, Landl, Johnsbach ♂♀ (Z.), Hieflau sehr häufig a. L. (Galv.), Maudling, Kammergebirge (Sonnwendkogel 1500 m) (Preiß.)
- Metrocampa margaritata* L. Landl, Hieflau, Hartlesgraben 15. VII. bis 3. VIII. ♂♀ (Z.), Admont 17. VII. 1 ♀ (K.)
- Ennomis autumnaria* Wernb. Admont 1 ♀ exl., 2 IX. ♂♂ a. L. im September (K.)
- *quercinaria* Hufn. Admont 1 ♀ exl. (K.)
- * *Selema* g. a. *jularia* Hw. 1 ♀ Hall b. Admont (K.)
- *lunaria* Schiff. Umgeb. v. Admont 20. VI. 1 ♀ (K.)
- * *Gonodontis bidentata* Cl. Spitzenbachgr. Ende V. aus Gebüsch aufgescheucht (G.)
- Crocallis elinguaris* L. Schladming Anfang VIII. (Preiß.)
- * — ab. *trapezaria* B. Admont 1 ♂ exl. 17. VII. (K.) siehe Verzeichnis!
- Angerona prunaria* L. VII. bis Mitte VIII. Landl 1 ♂ Weichselboden u. Johnsbach je ein kleines stark dunkel quergestricheltes ♂ (Z.), Altaussee (Stern.)
- Opisthograptis luteolata* L. Haus (Seewigtal) Anfang VIII abgeflog. (Preiß.)
- * *Epione advenaria* Hb. Wildalpen 7. VII. 1 ♀ (Z.), Spitzenbach im V. zahlreich (G.)
- * *Hypoplectis adpersaria* Hb. 1 abgeflogenes ♀ Ende V. im Spitzenbach bis 1300 m. Die Raupe überwintert erwachsen und verpuppt sich dann ohne zu fressen; anfangs Mai ergibt sie den Falter (G.)
- Venilia macularia* L. Im Juli einzeln, stellenweise häufiger: Landl. Altenmarkt a. d. Enns (Z.), Voralpe bis 1400 m Ende VI. (Preiß.) Spitzenbach Ende V. gemein (G.) Leopoldsteinersee, Gesäuse (Galv.), Altaussee (Stern.) (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [I. Nachtrag zur Macrolepidopteren - Fauna des steirischen Ennstales.
84](#)