

# 1. Beilage zu No. 15. 6. Jahrgang.

- \* *Mitochrista miniata* Forst. Hieflau 13. VII. a. L. (Galv.)
- Endrosa irrorella* Cl. VII., VIII. nicht selten: Hochkaar Anfang IX. bei 1400 m (Preiß.), Voralpe geg. Altenmarkt (Z.), Hieflau (Galv., Z.), Scheiblegger Hochalm 1 ♀ (Str.), Kammler Alm 1 ♂ (K.), Schladming, Haus, Kammergeb.; Hühstein bis 2000 m (Preiß.)
- \* — v. *nickerli* Rbl. In höheren Lagen im Juli: Sulzkarhund (Galv.), Scheiblegger Hochalpe 2 ♂♂ (K.)
- Gnophria rubricollis* L. Spitzenbachgr. Ende V. aus Gebüsch aufgeschwecht (G.), Hieflau VII. (Z.), a. Licht (Galv.), Mariazell VII., VIII. selten (U.)
- Oeonitis quadra* L. VII., VIII. einzeln: Landl 1 ♀ (Z.), Hieflau 1 ♂ (Galv., H.), Altaussee (Stern.), Haus (Preiß.)
- Lithosia deplana* Esp. VII., VIII. häufig: Johnsbach, Landl, Hieflau, Gstatterboden, Radmer a. d. Stube (Z.), Hieflau a. L. gemein (Galv.), Gesäuse (Str., K.), Admont (K.), Altaussee (Stern.), Haus (Preiß.)
- *lurideola* Zck. VII. bis Mitte VIII. nicht selten bis häufig: Voralpe (Wentneralm) Preiß., Landl, Johnsbach (Z.), Haus (Preiß.), Altaussee (Stern.)
- *complana* L. Im Juli nicht selten: Hieflau (Z.); ebendort am L. (Galv.)
- NB. Meine in Admont erbeuteten Stücke sind ♂♂ (siehe Verzeichnis!) K.
- *lutarella* L. Krumauer-Torfmoor im VIII. nicht selten (Z., K.), Haus, Anfang VIII. (Preiß.)
- \* — *sororcula* Hufn. Kammleralm b. Hall 14. VIII. 2 ♂♂ (K.)
- \* — *cereola* Hb. 1 Stück Ende VII. am Wege von Vorder- nach Hinter-Wildalpen (G.)
- Zygaena purpuralis* Brün. Schloß Strechau b. Rottenmann 1 ♀ 7. VI. (K.), Haus, Anfang VIII. (Preiß.)
- \* — *scabiosae* Scheven. Am hinteren Erzberg b. Eisenerz im VII. einmal 3 St. gefang. (G.), Alm b. Eisenerz bei 1300 m 1 ♂ 2. VIII. (K.)
- *achilleae* Esp. Hieflau 27. VII. 1 St. (Z.)
- \* — *exulans* Hochenw. Zeiritzkampel bei 2100 m 1 ♂ 28. VII. (K.)
- *loniceræ* Scheven. VII., VIII. nicht selten: Krumpfen (H.), Landl, Hieflau (Z.), Gesäuse 1 ♀, Kammleralm ♂♀ in Anzahl (K.), Natterriegel b. Hall 3 ♂♀ (Str.), Haus (Preiß.)
- *filipendulae* L. VII., VIII. nicht selten: Hieflau (Z.), 1 ♂ Gstatterbodenbauer, Umgeb. v. Admont 2 ♀ exl. im Juni, Kammleralm 1 ♀ (K.)
- \* — v. *mannii* H. S. Kammleralm b. Hall 10. VIII. 1 ♀ (K.)
- *angelicae* O. Leopoldsteinersee, Landl, Hieflau VII., häufig (Z.)
- *transalpina* v. *astragali* Bkh. Gesäuse (b. Gstatterboden) 13. VIII. 1 ♂ (K.)
- \* — *ephialtes* ab. *athamanthae* Esp. Mariazell VII., VIII. nicht selten (U.)
- \* — *ephialtes* ab. *peucedani* Esp. Mariazell VII., VIII. nicht selten (U.)
- \* — *carmolica* ab. *berolinensis* Stgr. Hinter-Radmer, häufig (G.)
- \* *Cochlidion limacodes* Hufn. Im VI. im Gesäuse und in den tieferen Lagen im Gebirge (G.)
- \* *Pachytelia villosella* O. Aus einer im Spitzenbachgr. gefundenen Puppe schlüpfte der ♂ Falter Mitte VI. (G.)

- Scioptera schiffermülleri* Stgr. Kaiserau 1 ♂ auf Geröll fliegend 15. VI. (Str.)
- \* *Psyche vicinella* Schiff. Raupen b. d. Siebenseen in Wildalpen an Disteln; gingen jedoch im Winter ein (G.)
- \* *Rebelia nudella* O. Johnsbachgraben (Gesäuse) auf Blättern d. Haselstaude 1. VIII. (Str.)
- Epichnopteryx pulla* Esp. Voralpen-Gipfel 1700 m Ende VI. (Preiß.), Altaussee VII. (Stern.)
- \* *Psychidea bombycella* Schiff. Präbichl 12. VI. (H.)
- \* *Funea comitella* Brd. Gesäuse im VI. selten (G.)
- \* — *crassiorella* Brd. Falter Ende VI. im Gesäuse (G.)
- *casta* Pall. Präbichl 12. VI. (H.)
- Sesia [cephiformis]* O. Obertraun VII., VIII. auf blühenden Berberitzen und Wasserdost (Rzb.)
- [*tipuliformis* Cl. Obertraun VII., VIII. (Rzb.)]
- [*myopaeformis* Bkh. Obertraun im Sommer 1906 (Rzb.)]
- [*formicaeformis* Esp. Obertraun im Sommer 1906 (Rzb.)]
- \* — *empiformis* Esp. Leopoldsteiner-See a. Fuße d. Seemauer 25. VII. 1 St. (Z.) Im Juni im Gesäuse auf Euphorbia fliegend (G.)
- [*ichneumoniformis* F. Obertraun, im Sommer 1906 (Rzb.)]
- Cossus cossus* L. Umgeb. v. Admont: ein auffallend kleines ♂ exl. 25. VI., 1 ♀ exl. 7. VII. (K.)
- \* *Zeuzera pyrina* L. Admont im Stiftshofe 1 ♂ 6. VIII. leg. P. Bonifaz.
- Hepialus humuli* L. Sulzkar 1 ♂ 9. VIII. (Z.)
- *carna* Esp. VII., VIII. nicht selten: Eisenerzer Reichenstein ♂♀ (H.), Eisenerzer Höhe, Präbichl je 1 ♀; Hesshütte ♂♂ (Z.), Hartlesgraben, Sulzkar (Galv.), Warscheneck, vom Lannerfeld bis zur Speikwiese Ende VII. (Hander), Dachstein (Austriahütte 1600 m) Preiß.
- \* — *hecta* L. Gamsstein (Steyerhütte) Ende VII. (Preiß.), Hieflau (Galv.), Hartlesgraben bis 1350 m VI., VII. (G.), Admont (im Stiftshofe) b. Tage 1 ♀ 16. VII. (K.)
- \* — ab. *decorata* Krul. Eisenerz 28. VII. 1 ♂ (Z.)

## Berichtigung

zum I. Nachtrag zur Macro-Lepidopteren-Fauna des Steir. Ennstales.

Verfasser dieser Lokal-Fauna hat die darin aufgenommene *apollo*-Aberration „*bartholomaeus* Stich.“ an Herrn Professor Dr. Rebel zur Ueberprüfung eingesandt und erhielt die Mitteilung, daß Stücke, welche der vermeintlichen Aberration sehr nahe kommen, überall in unseren Voralpen anzutreffen sind, jedoch keinesfalls namenberechtigt sind.

Mithin ist der Name *bartholomaeus* Stich. im I. Nachtrage zu streichen, da der in Frage stehende Falter noch als *Stammform* zu betrachten ist.

## Kleine Mitteilungen.

### Häufiges Auftreten von *Limenitis populi* L.

In den Wäldern bei Schwarz-Kostelec ist in diesem Jahre *L. populi* in überraschend großer Anzahl erschienen. Am 23. Juni, einem Sonntage, habe ich auf einem schattigen Waldwege innerhalb einer Stunde über 50 Stück gefangen, darunter 5 Weibchen. Freilich waren nur einige brauchbar; den übrigen schenkte ich das Leben und die Freiheit.

Joh. Pokorny, Zizkov-Prag.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Pokorny Johann

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. Häufiges Auftreten von Limenitis populi L. 105](#)