

Zwei Weibchen vom selben Flugorte und Sammler möchte ich als die dazu gehörenden ♀ diagnostizieren. Die Flügelform nicht so zugespitzt, also näher *C. varipes*, aber immer mit schön geschwungenem Vorderende wie beim ♂. Vorderflügel kirschviolett, die beiden schwarzen Submarginalquerlinien mehr konkav, die dadurch abgetrennte äußere Flügelzone heller mit einem rosafarbenen Schimmer. Der Seitenrand ins Sienarot ziehend. An die beiden Submarginalquerlinien lehnt sich ein kirschbrauner Schatten an, der sich dem Hinterrande zu verjüngt. Die Subbasale hat die männliche Geste; bei einem der beiden Weiber ist sie nicht so markant. Hinterleibsende rötlich. Expansion: 1 ♀ 36 mm; von der Vorderflügelspitze zur Wurzel 20 mm; das andere ♀ 33 mm bzw. 18 mm.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch als **tonerzeugende Eule** eine indoaustralische *Carea* erwähnen. In der „Sammlung Staudinger“ steckt eine *Carea bivata* mit der Etikette: Perak (Malakka) ex coll. Hartert, „dies die tongebende Noctua“ Seite 78. Schade, daß das betreffende Manuskript, wohin Hartert verweist, nicht aufzufinden ist.

Apterona pusilla Spr.

Raupe.

Die Raupe ist gelbgrün, Kopf schwarz, Segment 1—3 schwarzbraun, in der Mitte oben längs gelb geteilt. Jedes Segment ist vorn gelb gerandet. An der Seite hat die Raupe lange helle Haare.

Weib.

Das Weib ist 6 mm lang, einförmig hell-weißgelb mit schwarzem Kopf; es hat 3 rudimentäre deutlich sichtbare Beinpaare, an den Seiten nach unten zu 2 Reihen brauner Punkte. Das ♀ verläßt mitunter den Sack, wenn keine Befruchtung eintritt, gewöhnlich schaut es aber 1—2 mm aus dem oberen Teil, doch mehr an der Seite, heraus. Der weibliche Sack ist ein wenig höher und dicker als der männliche, die weibliche Puppenhülle bleibt im Sack.

Dr. W. Trautmann.

Bombus hortorum L. var. starzmanni n. v.

Gelbe Binde auf Pronotum und Scutellum stark verdunkelt und verschmälert, Segment 1—3 ganz schwarz, Segment 4—6 gelb.

1 ♂ bekannt. Vaterland: Jura bei Hersbruck i. B. August 1912. Ich nannte diese Form nach der Sammlerin des Stückes G. Starzmann.

Dr. W. Trautmann.

II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

— H. Kiefer. —

(Fortsetzung.)

- Taeniocampa* * ab. *brunnea* Tutt. ♂♀ r. Ennsufer b. Admont an Kätzchen u. Köder, darunter 1 sehr dunkles ♀ (det. Rebel) E. III. bis M. IV., selten (K.)
- * *incerta* Hufn. ♂♀ Krumauer Moor, Aigner Moor und a. d. Enns an Kätzchen u. Köder häufig E. III. bis M. IV. (K.)
- Admont 2 ♂♂ a. L., eines davon trans. ad ab. *fuscata* Hw. (det. Höfner), 1 ♂ exl. 1. XII. (K.)

- Taeniocampa* * ab. *fuscata* Hw. 1 ♂ Stift Admont 2. IV. leg. Fr. Otto (det. Höfner)
- 2 ♂♂ Admont a. L. u. Ennsanlage a. Köder (K.) det. Höfner.
- 1 ♂ a. d. Enns b. Admont a. Kätzchen 18. IV. ist fast ab. *atra* Tutt (K.) det. Hoffmann.
- * ab. *rufo-grisea* Tutt. 1 ♂ Admont a. L. 7. IV. ähnlich der ab. *pallida* Lampa, jedoch hier Grundfarbe rötlichgrau, gewässert mit grauer Außenbinde — sonst zeichnungslos; wurde vom Herrn Prof. Dr. Rebel als zu dieser Form gehörend det. (K.)
- * ab. *pallida* Lampa 1 sehr kleines ♂, Aigner Moor a. Kätzchen 26. IV. (K.) typ. Stück (det. Hoffmann).
- * *gracilis* F. Admont a. L. und an d. Enns an Kätzchen ♂♀ E. III. bis M. IV., seltener als die beiden vorhergehend. Arten. (K.)
- Mesogona oxalina* Hb. Admont a. L. ♂♀ E. VIII. bis M. X. selten (K.)
- Hiptelia ochreago* Hb. E. Reichenstein (Grübl) M. VII. a. L. nicht selten. (H.)
- Calymnia pyralina* View. Steir. Ennstal (G.)
- Admont a. L. ♂♀ M. VII. bis M. VIII. selten (K.)
- *trapezina* L. 1 ♂ Admont a. L. E. VIII. (K.)
- 1 ♀ Ennsanlage a. Köder A. IX. (K.)
- * *Cosmia paleacea* Esp. 1 ♂ Umgeb. v. Admont a. L. 22. VIII. (K.)
- Plastenis subtusa* F. 1 ♂ Admont a. L. M. VIII. (K.)
- Orthosia lota* Cl. Admont ♂♀ a. L. X. (K.)
- * *circellaris* Hufn. Admont (Stiftsgarten) 1 ♀ a. L. A. IX., Admont 1 ♂ a. L. 25. X. (stark geflogen.) K. det. Höfner.
- *nitida* F. 1 ♂ Admont a. L. M. IX. (K.)
- 1 ♀ an einer Linde am 30. IX. in St. Lorenzen i. P. leg. P. Bonifaz. (det. Höfner).
- * ab. *obscurata* Spul. 1 ♂ Admont a. L. E. VIII. (K.)
- Xanthia citrargo* L. 1 ♂ exl. 15. VIII. Admont (K.)
- *lutea* Ström. ♂♀ Umgeb. v. Admont (Aigner u. Krumau) im Schilf geleuchtet. E. VIII. A. IX. nicht selten (K.)
- *fulvago* L. 3 ♀♀ in Aigen b. Adm. im Schilf geleuchtet E. VIII. A. IX.; 1 ♂ Admont a. L. 17. X. (K.)
- Orrhodia vaccinii* L. Admont u. Umgeb. a. Köder u. Kätzchen E. III. bis M. IV. gemein (♂♀), aber größtenteils defekt (K.)
- ab. *mixta* Stgr. 1 ♀ Ennsanlage a. Köder M. IX. (K.)
- ab. *glabroides* Fuchs. 1 ♂ Ennsanlage a. Köder M. IX. und 1 ♂ am 28. III. an Kätzchen (K.)
- ab. *spadicea* Hb. 1 ♀ Ennsanlage a. Köder M. IX. (K.)
- *ligula* Esp. 1 ♂ Ennsanlage a. Köder M. IX. (K.)
- * ab. *subspadicea* Stgr. 1 ♀ a. Köder, Ennsanlage E. III. z. geflogen. (K.)
- * *rubiginea* F. ♂♀ an Kätzchen an d. Enns b. Admont E. III. bis M. IV. zieml. selten (K.)
- Scopelosoma satellitia* L. Ennsanlage a. Köder und Weidenkätzchen E. III. n. häufig (K.)
- ab. *trabanta* Huene. Ennsanlage a. Köder u. Weidenkätzchen am r. Ennsufer E. III. bis M. IV. (K.)
- ab. *brunnea* Lampa. Ennsanlage a. Köder E. III. 1 ♂ (K.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Trautmann W.

Artikel/Article: [Apterona pusilla Spr. Raupe. 203](#)