



- 1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)  
Stein a. Mandl (Vorberge bei 1400 m) 1 ♀  
20. VII. (K.)  
E. Reichenstein (Grübl) auf Fichten und a.  
L. 3 Stück der Stammform (H.) [nicht selten  
(Dr. Kemp.)]  
Umgeb. v. Haus: Starnalm bei 1400 m,  
Gradenbachfall, Kaarberg bei 1800 m, am  
Eichberg E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)
- Larentia* \* ab. *nigrofasciata* Gmppbrg. Admont 1 ♂  
a. L. A. X. (K.)
- ab. *stragulata* Hb. 1 ♂ ob Weißenbach b.  
Liezen bei 900 m A. VII. (K.)  
det. Höfner. [In sehr schönen Exemplaren  
(Dr. Kemp.)]  
Auf der Starnalm b. Haus in 1300 m 6.  
VIII. (Preiß.)
- \* var. *obeliscata* Hb. Steir. Ennstal (G.)
- [— *cognata* Thnbg. Preber-Schutzhütte 5. VIII.  
bei 1900 m nicht selten (H.)]
- \* *siterata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten  
V., M. VIII., IX. (K.)  
1 ♀ Hoffeld an einem Zaun E. IX., 1 ♀  
Stiftsgarten (Admont) an einem Fenster  
innerhalb der Werkzeugkammer, frisch ge-  
schlüpft 24. X. (K.) Am r. Ennsufer a.  
Kätzchen 2 Stück M. IV. (K.)
- *miata* L. Steir. Ennstal: Spitzenbachgr. (G.)  
Admont 1 ♂ a. L. 23. IX. (K.) Mühlau geg.  
der Zirmitz 4. V. 1 ♀ an der Esslingbrücke  
(K.) det. Höfner.
- *truncata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten  
VI. bis E. IX., Krumaner Moor 22. VI. (K.)  
E. Reichenstein (Grübl) a. L. A. VIII. 1  
Stück (H.) Hochkohl b. Wildalpe VIII. 1858,  
Aussee (Rogenhofer) M. Dr. R.
- ab. *perfuscata* Hw. ♂♀ Admont a. L. unter  
d. Stammform n. selt., 1 ♂ Kalkofen a. L.  
E. VIII. (K.)  
Auf d. Eichberg b. Haus 4. VIII. (Preiß.)
- *immanata* Hw. Admont a. L. ♂♀ häufiger  
als *truncata* M. VII. bis M. IX. (K.)  
E. Reichenstein (Grübl) 3 St. a. L. A.  
VIII. (H.)
- \* ab. *marmorata* Hw. Admont a. L. ♂♀  
selten unter d. Stammform (K.)
- \* ab. *pythonissata* Mill. 1 ♂ Admont a. L.  
19. VIII. (K.)
- *taeniata* Stph. Umgeb. v. Haus: b. Bodensee  
bei 1300 m E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)
- *munitata* Hb. Steir. Ennstal (G.) E. Reichen-  
steingebiet a. L. E. VII. A. VIII. nicht  
selten (H.)
- *aptata* Hb. Admont a. L. 1 ♂ der Stamm-  
form M. VII. (K.)  
Umgeb. v. Haus: Gradenbachfall, beim Boden-  
see in 1300 m E. VII. bis 11. VIII. (Preiß.)  
E. Reichenstein a. L. und Krumpensee,  
einzeln E. VII. (H.)  
[Prebersee bei 1450 m A. VIII. nicht selt.  
(H.)]
- *suplata* Frr. Gesäuse (G.) Admont ♂♀ a.  
L. VIII. (K.)
- *olivata* Bkh. Admont VII. (Rogenhofer) M.  
Dr. R.  
Umgeb. v. Haus: am Höfelbach, beim Weißen-  
bach E. VII. bis M. VIII. (Preiß.)
- *viridaria* F. Aigner Moorwiesen ♂♀ A. bis  
M. VI. (K.)
- Steir. Ennstal (G.) Am Bodensee b. Haus  
bei 1200 m E. VII. (Preiß.)  
[sehr häufig (Dr. Kemp.)]
- Larentia turbata* Hb. Im Grübl M. VII. (H.) Kaar-  
berg b. Haus bei 1800 m E. VII. abgefll.  
(Preiß.)
- *kollariaria* H. S. Radmer (G.)
- *austriacaria* H. S. Heindlkar (Gesäuse) 1 ♀  
11. V. (K.) det. Höfner.
- *aqueata* Hb. Im Grübl E. VII. (H.) [häufig  
(Dr. Kemp.)]  
Admont u. Umgeb. a. L. ♂♀ nicht selten,  
27. VI., VIII. bis 19. IX.; einige Stücke,  
darunter (nicht abgeflogen!) ohne grün-  
liche Färbung, licht bräunlich, als Ueber-  
gänge zu v. *hercegovinensis* Rbl. (K.)
- *salicata* Hb. Admont und Umgeb. in 2 Ge-  
nerationen a. L. ♂♀ nicht selten 13. V. bis  
5. VI. und E. VII., VIII. (K.)  
Umgeb. v. Haus: Auf dem Hirn in 1900 m  
M. VIII., b. Gradenbachfall E. VII. (Preiß.)  
Im Grübl E. VII. (H.)
- *fluctuata* L. Admont a. L. ♂♀ n. selten E.  
V. bis A. VI., dann VII. bis M. X. (K.)  
St. Lorenzen i. P. 1 ♀ V. (leg. P. Bonifaz.)  
Kleinsölk a. Zäunen 5. VIII. 1890 (Str.)
- [— ab. *constovata* Hw. Groß. Priel 8. VII. (Hd.)]
- \* ab. *neapolisata* Mill. 1 ♀ St. Lorenzen i.  
P. V. (leg. P. Bonifaz.)
- *didymata* L. Admont a. L. ♂♀ VII., Spitzen-  
bach 22. VI. (K.)  
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)  
E. Reichenstein a. L. einzeln A. VIII. (H.)  
Trieben, Gaishorn E. VII. (H.)
- *cambrica* Curt. Gesäuse (G.) Admont a. L.  
1 ♂ 15. VII. (K.)  
Gaishorn E. VII. (H.)
- *parallelineata* Retz (= *vespertina* Bkh.)  
Admont ♂♀ a. L., Kalkofen E. VIII. A. IX.  
häufig (K.)  
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)
- *incursata* Hb. Gstatterboden (Gesäuse) 1 ♀  
18. V. (K.) det. Höfner. Sulzkar (G.) 1 Aberr.  
davon (det. Rebel) 12. VI. am Prebichl (Hd.)  
Kaarberg b. Haus in 1800 m 28. VII. (Preiß.)  
[am Rosskopf (Dr. Kemp.)]
- *montanata* Schiff. Admont 1 ♀ M. VI. a.  
L. (K.) St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg.  
P. Bonifaz.) Prebichl 21. VII. (H.) Umgeb.  
v. Haus: Petersberg, am Hüttensee in 1170  
m, b. Bodensee in 1300 m E. VII. A. VIII.  
(Preiß.)  
[am Rosskopf gemein (Dr. Kemp.)]
- \* ab. *costimaculata* Rbl. Warscheneck 9.  
VIII. (Hd.) (Fortsetzung folgt.)

## Briefkasten.

Anfrage des Herrn St. in T.: Gibt es lepidoptero-  
logische Spezial-Faunen-Literatur über Ferghana,  
besonders über die Umgebung von Namangan, Osch  
und über das Alai-Gebirge? Wenn ja, wo wäre  
solche zu beschaffen?

## Insektenleim.

Den Herren, die mir zu einem farblosen, in  
Wasser unlöslichen Insektenleim verhelfen wollen,  
danke ich bestens für ihre Mitteilungen. Leider sind  
mir zwei Versuche, aus letzteren Nutzen zu ziehen,  
fehlgeschlagen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. 213-214](#)