© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.) Stein a. Mandl (Vorberge bei 1400 m) 1 ♀ 20. VII. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) auf Fichten und a. L. 3 Stück der Stammform (H.) [nicht selten (Dr. Kemp.)]
Umgeb. v. Haus: Starnalm bei 1400 m, Gradenbachfall, Kaarberg bei 1800 m, am Eichberg E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)

Larentia * ab. *nigrofasciata* Gmppbrg. Admont 1 ♂ a. L. A. X. (K.)

— ab. *stragulata* Hb. 1 ♂ ob Weißenbach b. Liezen bei 900 m A. VII. (K.)
det. Höfner. [In sehr schönen Exemplaren (Dr. Kemp.)]
Auf der Starnalm b. Haus in 1300 m 6. VIII. (Preiß.)

— * var. *obeliscata* Hb. Steir. Ennstal (G.)

[— *cognata* Thnbrg. Preber-Schutzhütte 5. VIII. bei 1900 m nicht selten (H.)]

— * *siterata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten V., M. VIII., IX. (K.)
1 ♀ Hoffeld an einem Zaun E. IX., 1 ♀ Stiftsgarten (Admont) an einem Fenster innerhalb der Werkzeugkammer, frisch geschlüpft 24. X. (K.) Am r. Ennsufer a. Kätzchen 2 Stück M. IV. (K.)

— *miata* L. Steir. Ennstal: Spitzenbachgr. (G.) Admont 1 ♂ a. L. 23. IX. (K.) Mühlau geg. der Zirmitz 4. V. 1 ♀ an der Esslingbrücke (K.) det. Höfner.

— *truncata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten VI. bis E. IX., Krumauer Moor 22. VI. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) a. L. A. VIII. 1 Stück (H.) Hochkohr b. Wildalpe VIII. 1858, Aussee (Rogenhofer) M. Dr. R.

— ab. *perfuscata* Hw. ♂♀ Admont a. L. unter d. Stammform n. selt., 1 ♂ Kalkofen a. L. E. VIII. (K.)
Auf d. Eichberg b. Haus 4. VIII. (Preiß.)

— *immanata* Hw. Admont a. L. ♂♀ häufiger als *truncata* M. VII. bis M. IX. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) 3 St. a. L. A. VIII. (H.)

— * ab. *marmorata* Hw. Admont a. L. ♂♀ selten unter d. Stammform (K.)

— * ab. *pythonissata* Mill. 1 ♂ Admont a. L. 19. VIII. (K.)

— *taeniata* Stph. Umgeb. v. Haus: b. Bodensee bei 1300 m E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)

— *munitata* Hb. Steir. Ennstal (G.) E. Reichensteingebiet a. L. E. VII. A. VIII. nicht selten (H.)

— *aptata* Hb. Admont a. L. 1 ♂ der Stammform M. VII. (K.)
Umgeb. v. Haus: Gradenbachfall, beim Bodensee in 1300 m E. VII. bis 11. VIII. (Preiß.)
E. Reichenstein a. L. und Krumpensee, einzeln E. VII. (H.)
[Prebersee bei 1450 m A. VIII. nicht selt. (H.)]

— *suplata* Frr. Gesäuse (G.) Admont ♂♀ a. L. VIII. (K.)

— *olivata* Bkh. Admont VII. (Rogenhofer) M. Dr. R.
Umgeb. v. Haus: am Höfelbach, beim Weißenbach E. VII. bis M. VIII. (Preiß.)

— *viridaria* F. Aigner Moorwiesen ♂♀ A. bis M. VI. (K.)
Steir. Ennstal (G.) Am Bodensee b. Haus bei 1200 m E. VII. (Preiß.)
[sehr häufig (Dr. Kemp.)]

Larentia turbata Hb. Im Grübl M. VII. (H.) Kaarberg b. Haus bei 1800 m E. VII. abgefig. (Preiß.)

— *kollariaria* H. S. Radmer (G.)

— *austriacaria* H. S. Heindlkar (Gesäuse) 1 ♀ 11. V. (K.) det. Höfner.

— *aqueata* Hb. Im Grübl E. VII. (H.) [häufig (Dr. Kemp.)]
Admont u. Umgeb. a. L. ♂♀ nicht selten, 27. VI., VIII. bis 19. IX.; einige Stücke, darunter (nicht abgeflogen!) ohne grünliche Färbung, licht bräunlich, als Uebergänge zu v. *hercegovinensis* Rbl. (K.)

— *salicata* Hb. Admont und Umgeb. in 2 Generationen a. L. ♂♀ nicht selten 13. V. bis 5. VI. und E. VII., VIII. (K.)
Umgeb. v. Haus: Auf dem Hirn in 1900 m M. VIII., b. Gradenbachfall E. VII. (Preiß.)
Im Grübl E. VII. (H.)

— *fluctuata* L. Admont a. L. ♂♀ n. selten E. V. bis A. VI., dann VII. bis M. X. (K.)
St. Lorenzen i. P. 1 ♀ V. (leg. P. Bonifaz.)
Kleinsölk a. Zäunen 5. VIII. 1890 (Str.)

[— ab. *constovata* Hw. Groß. Priel 8. VII. (Hd.)]

— * ab. *neapolisata* Mill. 1 ♀ St. Lorenzen i. P. V. (leg. P. Bonifaz.)

— *didymata* L. Admont a. L. ♂♀ VII., Spitzenbach 22. VI. (K.)
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)
E. Reichenstein a. L. einzeln A. VIII. (H.)
Trieben, Gaishorn E. VII. (H.)

— *cambrica* Curt. Gesäuse (G.) Admont a. L. 1 ♂ 15. VII. (K.)
Gaishorn E. VII. (H.)

— *parallelolineata* Retz (= *vespertaria* Bkh.) Admont ♂♀ a. L., Kalkofen E. VIII. A. IX. häufig (K.)
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)

— *incursata* Hb. Gstatterboden (Gesäuse) 1 ♀ 18. V. (K.) det. Höfner. Sulzkar (G.) 1 Aberr. davon (det. Rebel) 12. VI. am Prebichl (Hd.) Kaarberg b. Haus in 1800 m 28. VII. (Preiß.)
[am Rosskopf (Dr. Kemp.)]

— *montanata* Schiff. Admont 1 ♀ M. VI. a. L. (K.) St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz). Prebichl 21. VII. (H.) Umgeb. v. Haus: Petersberg, am Hüttensee in 1170 m, b. Bodensee in 1300 m E. VII. A. VIII. (Preiß.)
[am Rosskopf gemein (Dr. Kemp.)]

— * ab. *costimaculata* Rbl. Warscheneck 9. VIII. (Hd.)

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten.

Anfrage des Herrn St. in T.: Gibt es lepidopterologische Spezial-Faunen-Literatur über Ferghana, besonders über die Umgebung von Namangan, Osch und über das Alai-Gebirge? Wenn ja, wo wäre solche zu beschaffen?

Insektenleim.

Den Herren, die mir zu einem farblosen, in Wasser unlöslichen Insektenleim verhelfen wollen, danke ich bestens für ihre Mitteilungen. Leider sind mir zwei Versuche, aus letzteren Nutzen zu ziehen, fehlgeschlagen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1. Beilage zu No. 32. 7. Jahrgang.

Eine Lösung von 17 Teilen Kanada-Balsam in 10 Teilen Xylol, die ich mir in der Apotheke herstellen ließ, ergab eine dünne Flüssigkeit ohne jede Spur von Klebwirkung. Der — angeblich reine — Kanadabalsam, den ich in der Apotheke sah, war auch so dünnflüssig, daß ich ihm keine große Klebkraft zutraue. Es scheint also von diesem Balsam verschiedene Sorten zu geben, und ich habe die zum Kleben untaugliche erwischt.

Darauf wollte ich mir die Mischung von Amylium aceticum, Alcohol absolutus und Eisessig herstellen lassen, um darin Celloidin zu lösen. Der Apotheker sagte aber, Amylium aceticum gebe es nicht im Handel, das könne höchstens eine Mischung irgend eines Amyl-Präparats mit Eisessig sein. Da nun die Lösung so wie so Eisessig enthalte, sei es einfacher, das reine Amyl-Präparat (aber welches und in wieviel Teilen?) und dementsprechend mehr Eisessig zu nehmen.

Ich würde mich freuen, über die betreffenden, andere Sammler wohl auch interessierenden Fragen noch etwas zu hören.

Lyck. *Reinberger.*

Tapinostola muculosa Hb.

An die Leser dieser Zeitschrift richte ich die dringende Bitte, mir jeden Fundort dieser Eule mittels direkter Karte mitzuteilen und anzugeben, seit wann dieser Falter beobachtet wird, wie häufig derselbe auftritt und welche Futterpflanze festgestellt wurde. Jede, auch die kleinste Angabe, ist mir von größter Wichtigkeit. Ich bedarf derselben zu einer wissenschaftlichen Untersuchung, die für unsere Landwirtschaft von größter Bedeutung ist.

Bad Kreuznach/Nahe, Hofgartenstraße 24.

F. Kilian.

Bitte.

Mit einer Zusammenstellung der Schmetterlingsfauna des böhmischen Erzgebirges und des Egertales von Karlsbad bis Kaaden beschäftigt, ergeht hiermit an alle Herren, die in diesem Gebiete gesammelt haben, die herzliche Bitte, mich bei dieser Arbeit durch leihweise Ueberlassung der Aufzeichnungen freundlichst unterstützen zu wollen. (Portospesen etc. etc. werden selbstverständlich vergütet!)

Med. Dr. Adolf Binder, Warta a. E., Böhmen.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Aus Sardinien

sind Käfer in Serien von 20 Stück für M. 2,— abzugeben. Ebendaher ein Pärchen von Dorcus musimon Gené gegen Meistgebot. Porto 30 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Goliath. giganteus

in grossen Ia sup. **Riesenstücken** sowie diverse sehr schöne interessante Aberrationen von ♀♀. Ferner M. torquata eingetroffen. Preise je nach Grösse und Schönheit. — Auswahlsendungen stehen auf Wunsch gerne zu Diensten.

W. Walther, Stuttgart, Schwabstr. 30.

Aus Togo! Neue Sendung!

Petrognatha gigas,

Riesenbockkäfer mit sehr langen Fühlern, Stück M. 2,50, Tiere von mittlerer Grösse 1,50 M.

Diastocora trifasciata,

schöner, ansehnlicher Bock mit rot und schwarz gestreiften Flügeldecken, Stück 75 Pf. Porto 30, resp. 50 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

Wir machen aus unseren Riesenlagern zu billigen Preisen

Auswahlsendungen und Centurien,

von exot. und pal. Käfern, Schmetterlingen und Insekten aller Art.

Genaueste Angabe der Fundorte, Bestimmung von Spezialisten.

Wir kaufen ganze Sammlungen und Originalausbeuten und tauschen auch Listen gratis. Kataloge 50 Pf.

„Kosmos" naturhist. Institut,

Berlin W 30, Speyererstr. 8.

Biologien.

100 Ia Biologien 100 Arten in 100 staubdichten Glaskästen montiert, etikettiert aus allen Insektenordnungen zusammengestellt, inkl. Porto und Verpackung nur M. **220**, ohne Glaskästen zu demselben Preise Einzeln **1 Biol. M. 2,50** bis M. 3,—. Porto und Verpackung kommt dann extra in Anrechnung. Auf Wunsch sende Artenverzeichnis über 200 Arten gegen Einsendung von 20 Pf.

F. Kucharzick, Präparator, Breslau (12), Drabiziusstr. 13 (Parterre).

Dixippus morosus.

Eier ca. 600 Stück sind gegen bar (100 Stück 70 Pf.) oder in Tausch gegen Zuchtmaterial auch bessere Falter ev. Exoten abzugeben am liebsten im ganzen. Ebenso Falter von C. fraxini, sponsa, D. pini, alles gespannt, ca. 100 Stück v. V. urticae, V. io in Tüten.

Gesellschaft der Naturfreunde 1911

Adolf Wolf,

Hirschberg, Schl., Sechsstätte 44.

Zur Winterzucht!

Larven von Dix. morosus

(Ind. Stabheuschrecke) halberwachsen, Futter: Efeu, Dtzd. 1,— Mk. Porto und Packung extra. Zuchtanweisung.

Ew. Wohlfarth, Zeitz, Mittelstr. 4.

Skorpione aus Togo!

Riesentiere, frische Sendung, gebe das Stück mit M. 0,75 ab. Porto und Packung 30 Pf., bei Paket 50 Pf. Voreinsendung oder Nachnahme.

G. Calließ, Guben, Sand 11.

---

b) Nachfrage.

Suche

forstschädliche Insekten u. deren Fraßstücke.

G. Kardasch, Felsöszernye, Post Nemsó, Trencsiner Kom., Ungarn.

Lepidopteren.

a) Angebot.

Prima Falter und Puppen

Sofort abzugeben: Pap. alexanor magna ♂♀ 5 M., D. livornica à 1,25 ♂ u. ♀, S. quercus 2,50 ♂ u. ♀, D. nerii 1,25 ♂ 1,50 ♀ etwas kleiner 0,75 ♂ 1,00 ♀, Ag. tau ab. melaina sup. groß ♂ n. ♀ 40,00, do. ab. weismanni ♂ u. ♀ sup. groß 50 M., C. or ab. albingensis 1913 sup. im Tausch gegen bessere Europäer.

Puppen: Pap. alexanor magna Dalmat. Riesen angesponnen und schmarotzerfrei 2 jährig im April schlüpfend à Stück 1,25 M. Porto besonders. Die Falter u. Puppen stammen von Herrn Rudolph, Gravosa. Referenz: Entomolog. Verein Hamburg—Altona. An Unbekannte nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

Herm. Bunge, Hamburg 22, Wohldorferstr. 1.

Japan-Falter

in Tüten mit Fundort und Datum, nur Paläarkten. Die Preise gelten nur bei Abnahme von 10 Stück der betr. Art. Soweit Vorrat reicht, sende ♂ und ♀.

Pap. demetrius 4,—, xuthulus 4,—, Luchdorfia japonica 8,—, Parn. citrinarius 4,50, Colias poliographus 1,50, Terias hecuba 1,—, mandarina 1,—, laeta 1,—, Pieris crucivora 1,50, g. v. yokohamae 1,50, Midea scolymus 1,50, Neope goschkevitschi 2,—, Sat. v. okumi 2,—, Ipthima argus 2,—, Lethe diana 3,50, sicelis 1,—, Mycalesis perdiccas 3,50, Coen. v. annulifer 2,—, Niphanda fusca 3,—, Neptis intermedia 1,50 M. Versende nur gegen sofortige Barzahlung, an Unbekannte nur gegen Voreinsendung oder Nachnahme.

W. Pfennigschmidt, Hannover, Friesenstr. 38 p.

Cucullia fraudatrix Tausch

Puppen dieser seltenen Art gebe ab gegen Puppen von P. machaon. Eine fraudatrix gegen 1 Dtzd. machaon. Unter drei Dtzd. machaon tausche nicht.

Willy Diemer, Posen, Buddestr. 14.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Kilian Franz

Artikel/Article: Insektenleim. 214-215