

- 1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)
Stein a. Mandl (Vorberge bei 1400 m) 1 ♀
20. VII. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) auf Fichten und a.
L. 3 Stück der Stammform (H.) [nicht selten
(Dr. Kemp.)]
Umgeb. v. Haus: Starnalm bei 1400 m,
Gradenbachfall, Kaarberg bei 1800 m, am
Eichberg E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)
- Larentia* * ab. *nigrofasciata* Gmppbrg. Admont 1 ♂
a. L. A. X. (K.)
- ab. *stragulata* Hb. 1 ♂ ob Weißenbach b.
Liesen bei 900 m A. VII. (K.)
det. Höfner. [In sehr schönen Exemplaren
(Dr. Kemp.)]
Auf der Starnalm b. Haus in 1300 m 6.
VIII. (Preiß.)
- * var. *obeliscata* Hb. Steir. Ennstal (G.)
- [— *cognata* Thnbg. Preber-Schutzhütte 5. VIII.
bei 1900 m nicht selten (H.)]
- * *siterata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten
V., M. VIII., IX. (K.)
1 ♀ Hoffeld an einem Zaun E. IX., 1 ♀
Stiftsgarten (Admont) an einem Fenster
innerhalb der Werkzeugkammer, frisch ge-
schlüpft 24. X. (K.) Am r. Ennsufer a.
Kätzchen 2 Stück M. IV. (K.)
- *miata* L. Steir. Ennstal: Spitzenbachgr. (G.)
Admont 1 ♂ a. L. 23. IX. (K.) Mühlau geg.
der Zirmitz 4. V. 1 ♀ an der Esslingbrücke
(K.) det. Höfner.
- *truncata* Hufn. Admont a. L. ♂♀ n. selten
VI. bis E. IX., Krumauer Moor 22. VI. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) a. L. A. VIII. 1
Stück (H.) Hochkohl b. Wildalpe VIII. 1858,
Aussee (Rogenhofer) M. Dr. R.
- ab. *perfuscata* Hw. ♂♀ Admont a. L. unter
d. Stammform n. selt., 1 ♂ Kalkofen a. L.
E. VIII. (K.)
Auf d. Eichberg b. Haus 4. VIII. (Preiß.)
- *immanata* Hw. Admont a. L. ♂♀ häufiger
als *truncata* M. VII. bis M. IX. (K.)
E. Reichenstein (Grübl) 3 St. a. L. A.
VIII. (H.)
- * ab. *marmorata* Hw. Admont a. L. ♂♀
selten unter d. Stammform (K.)
- * ab. *pythonissata* Mill. 1 ♂ Admont a. L.
19. VIII. (K.)
- *taeniata* Stph. Umgeb. v. Haus: b. Bodensee
bei 1300 m E. VII. bis A. VIII. (Preiß.)
- *munitata* Hb. Steir. Ennstal (G.) E. Reichen-
steingebiet a. L. E. VII. A. VIII. nicht
selten (H.)
- *aptata* Hb. Admont a. L. 1 ♂ der Stamm-
form M. VII. (K.)
Umgeb. v. Haus: Gradenbachfall, beim Boden-
see in 1300 m E. VII. bis 11. VIII. (Preiß.)
E. Reichenstein a. L. und Krumpensee,
einzeln E. VII. (H.)
[Prebersee bei 1450 m A. VIII. nicht selt.
(H.)]
- *suplata* Fr. Gesäuse (G.) Admont ♂♀ a.
L. VIII. (K.)
- *olivata* Bkh. Admont VII. (Rogenhofer) M.
Dr. R.
Umgeb. v. Haus: am Höfelbach, beim Weißen-
bach E. VII. bis M. VIII. (Preiß.)
- *viridaria* F. Aigner Moorwiesen ♂♀ A. bis
M. VI. (K.)
- Steir. Ennstal (G.) Am Bodensee b. Haus
bei 1200 m E. VII. (Preiß.)
[sehr häufig (Dr. Kemp.)]
- Larentia turbata* Hb. Im Grübl M. VII. (H.) Kaar-
berg b. Haus bei 1800 m E. VII. abgef. (K.)
(Preiß.)
- *kollariaria* H. S. Radmer (G.)
- *austriacaria* H. S. Heindlkar (Gesäuse) 1 ♀
11. V. (K.) det. Höfner.
- *aqueata* Hb. Im Grübl E. VII. (H.) [häufig
(Dr. Kemp.)]
Admont u. Umgeb. a. L. ♂♀ nicht selten,
27. VI., VIII. bis 19. IX.; einige Stücke,
darunter (nicht abgeflogen!) ohne grün-
liche Färbung, licht bräunlich, als Ueber-
gänge zu v. *hercegovinensis* Rbl. (K.)
- *salicata* Hb. Admont und Umgeb. in 2 Ge-
nerationen a. L. ♂♀ nicht selten 13. V. bis
5. VI. und E. VII., VIII. (K.)
Umgeb. v. Haus: Auf dem Hirn in 1900 m
M. VIII., b. Gradenbachfall E. VII. (Preiß.)
Im Grübl E. VII. (H.)
- *fluctuata* L. Admont a. L. ♂♀ n. selten E.
V. bis A. VI., dann VII. bis M. X. (K.)
St. Lorenzen i. P. 1 ♀ V. (leg. P. Bonifaz.)
Kleinsölk a. Zäunen 5. VIII. 1890 (Str.)
- [— ab. *constovata* Hw. Groß. Priel 8. VII. (Hd.)]
- * ab. *neapolisata* Mill. 1 ♀ St. Lorenzen i.
P. V. (leg. P. Bonifaz.)
- *didymata* L. Admont a. L. ♂♀ VII., Spitzen-
bach 22. VI. (K.)
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)
E. Reichenstein a. L. einzeln A. VIII. (H.)
Trieben, Gaishorn E. VII. (H.)
- *cambrica* Curt. Gesäuse (G.) Admont a. L.
1 ♂ 15. VII. (K.)
Gaishorn E. VII. (H.)
- *parallelineata* Retz (= *vespertina* Bkh.)
Admont ♂♀ a. L., Kalkofen E. VIII. A. IX.
häufig (K.)
St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg. P. Bonifaz.)
- *incursata* Hb. Gstatterboden (Gesäuse) 1 ♀
18. V. (K.) det. Höfner. Sulzkar (G.) 1 Aberr.
davon (det. Rebel) 12. VI. am Prebichl (Hd.)
Kaarberg b. Haus in 1800 m 28. VII. (Preiß.)
[am Roskopf (Dr. Kemp.)]
- *montanata* Schiff. Admont 1 ♀ M. VI. a.
L. (K.) St. Lorenzen i. P. ♂♀ VIII. (leg.
P. Bonifaz.) Prebichl 21. VII. (H.) Umgeb.
v. Haus: Petersberg, am Hüttensee in 1170
m, b. Bodensee in 1300 m E. VII. A. VIII.
(Preiß.)
[am Roskopf gemein (Dr. Kemp.)]
- * ab. *costimaculata* Rbl. Warscheneck 9.
VIII. (Hd.) (Fortsetzung folgt.)

Briefkasten.

Anfrage des Herrn St. in T.: Gibt es lepidoptero-
logische Spezial-Faunen-Literatur über Ferghana,
besonders über die Umgebung von Namangan, Osch
und über das Alai-Gebirge? Wenn ja, wo wäre
solche zu beschaffen?

Insektenleim.

Den Herren, die mir zu einem farblosen, in
Wasser unlöslichen Insektenleim verhelfen wollen,
danke ich bestens für ihre Mitteilungen. Leider sind
mir zwei Versuche, aus letzteren Nutzen zu ziehen,
fehlgeschlagen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Briefkasten 214](#)