

Diverse Berichte

IRMISCHIA.

Erscheint anfangs jedes Monats und wird den Mitgliedern des Vereins portofrei zugesandt.

Inserate für die gespaltene Petitzelle 15 Pf. Wissenschaftliche Beilagen nach Vereinbarung.

Korrespondenzblatt

des Botanischen Vereins für Thüringen
„Irmischia“.

Redigiert vom Vorsitzenden des Vereins
Prof. Dr. Leimbach.

N^o 6 u. 7.

Nichtmitglieder abonnieren direkt, oder im Wege des Buchhandels, bei der Redaktion.

Abonnementspreis (incl. Porto): 3 Mark pro Jahrgang. Einzelne Nummern 30 Pf.

IV. Jahrgang.

Sondershausen.

Juni u. Juli 1884.

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden und kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.

Ranunculaceae Juss.

- Clematis* L. Teufelszwirn, Waldrebe XIII. 7.
C. vitalba L. Im Kroll, im Fahnerschen Holze, Gebesee, Hornholz.
Thalictrum L. Wiesenraute XIII. 7.
Th. minus L. An sonnigen Hügeln, trockenen Aeckern: Taubenthal, an der Chaussee nach Gangloffsömmern, Gräfentonna, Tretenburg, Herbsleber Ried, Strausfurt, Lützensömmern, Greussen und Schilfa.
var. *montanum* Wallr. Im Taubenthale und auf Aeckern.
var. *flexuosum* Bernh. Auf der Tretenburg.
Th. flavum L. Auf dem Tennst. und Herbsleber Riede, Wiesen zwischen Schwerst. u. Gebesee.
Th. angustifolium Jacq. An obigen Stellen, doch seltener.
Hepatica Dill. Leberblume XIII. 7.
H. triloba Gil. Leberblümchen. In den umliegenden Hölzern, im Garten der Brauerei in Tennst., in den Parkanlagen in Schilfa und Strausfurt.
Pulsatilla Tourn. Küchenschelle XIII. 7.
P. vulgaris Mill. Bei Schlotheim an sonnigen Hügeln.
Anemone L. Windröschen XIII. 7.
A. silvestris L. Waldwindröschen. Im Fahnerschen u. Hornholze.
A. nemorosa L. Weisse Osterblume. In

- den umliegenden Hölzern und in Grasgärten häufig.
A. ranunculoides L. Gelbe Osterblume. An den vorigen Orten, doch sparsamer.
A. ranunculoidi — *memorosa* Kunze. Im Kroll und Hornholze.
Adonis L. Adonis XIII. 7.
A. aestivalis L. Teufelsauge. Unter der Saat häufig, namentlich auf Kalkboden.
A. flammula Jacq. Teufelsauge. Mit voriger, aber weniger häufig.
A. vernalis L. Frühlings-Adonis. An sonnigen, rasigen, steinigen Abhängen: am Steiger bei Tennst., Amtmannsberg, Tretenburg, Rabenhütte bei Lützens., Gangloffs., Wundersleben, Gr. Vargula, Grünigen etc.
Myosurus Dill. Mäuseschwanz XIII. 7.
M. minimus L. Auf Aeckern und Rasenplätzen bei Tennst.
Ceratocephalus Moench. Hornköpfchen XIII. 7.
C. falcatus Pers. Auf Aeckern im Gerichtsfelde, unter dem Taubenthale b. Tennst., bei Gangloffs. unter dem Drusenberge u. am Schwerst. Wege, Lützensömmern, Schilfa und namentlich in den angrenzenden Fluren von Greussen und Clingen auf Brachäckern u. Kleäckern in Massen, daselbst von mir im Jahre 1840 entdeckt. Auch in einigen Exemplaren bei Weissensee gefunden.
Batrachium E. Mey. Haarkraut XIII. 7.
B. aquatile E. Mey. An Quellen u. Bächen. var. *paucistamineum* Tausch. Im Gläserloche, in stehenden u. langsam fließenden Gewässern, in den Seegräben.
B. divaricatum Wimm. In stehenden u. langsam fließenden Gewässern.

salices
eller,
neue
Laub-
leitung
maria-
e zur
Thür-
rsions-
le bis
enzen:
verein

Kösen
nd an
Feiers-
wenig
einen
sind,

ldt.
ld bei

ach.
mchen
nders-
z ver-

ach.

ia“

agen

natur-

villon;
gebung

puläre

of. Dr.

- B. fluitans* Wimm. Im Schambach, in der Unstrut u. Gera.
- Ranunculus* Hall. Hahnenfuss XIII. 7.
- R. aconitifolius* L. Im Fahnerschen Holze.
- R. flammula* L. Feuchte Wiesen und Gräben gemein.
- R. auricomus* L. In Obstgärten, feuchten Wäldern, Gebüsch.
- R. acer* L. Auf Wiesen u. in Wäldern gem.
- R. lanuginosus* L. In den Wäldern der Umgegend, im Horn- und Krollholze.
- R. polyanthemos* L. Auf Rasenrainen u. Waldplätzen.
- R. nemorosus* L. Im Fahnerschen und Tonnaischen Holze.
- R. repens* L. Feuchte Gebüsche, Gärten, Gräben gemein.
- R. bulbosus* L. Wie vorige, gemein.
- R. sardous* Crntz. Hin und wieder auf Aeckern u. Wiesen.
- R. arvensis* L. Auf Aeckern häufig.
- R. sceleratus* L. In Gräben an der Unstrut, in Lachen bei Gross Vargula, Straussfurt u. Gebesee.
- Ficaria* DC. Scharbock XIII. 7.
- F. verna* Huds. Feigwurzel. Schattige Orte gemein.
- Caltha* L. Butterblume XIII. 7.
- C. palustris* L. Auf nassen Wiesen und an Quellen gemein.
- Trollius* L. Trollblume XIII. 7.
- T. europaeus* L. Auf nassen Stellen im Hornholze, Schlotheim u. Almenhausen.
- Helleborus* Adans. Nieswurz XIII. 7.
- H. viridis* L. In dem Garten der Brauerei und im Badegarten in Tennst. verwildert, in Gräsgärten in Kleinballhausen.
- Nigella* Tourn. Schwarzkümmel XIII. 7.
- N. arvensis* L. Auf Aeckern auf Kalk- u. Lehmboden.
- N. damascena* L. In Gärten als „Brant in Haaren“.
- N. sativa* L. Hin u. wieder mit voriger angebaut und verwildert.
- Aquilegia* Tourn. Akelei XIII. 5.
- A. vulgaris* L. In Wäldern der Umgegend u. in Gräsgärten.
- Delphinium* Tourn. Rittersporn XIII. 1.
- D. consolida* L. Auf Aeckern gemein.
- D. Ajacis* L. In Gärten gebaut u. öfters verwildert.
- Aconitum* Tourn. Sturmhut XIII. 3.
- A. lycoctonum* L. In den Hölzern der Umgegend.
- A. Stoerkianum* Rehb. } In Gärten gebaut.
- A. napellus* L. }
- A. variegatum* L. }
- Actaea* L. Christophskraut XIII. 1.
- A. spicata* L. In den Wäldern der Umgegend.
- Paeonia* Tourn. Pfingstrose XIII. 3.
- P. corallina* Retz } In Gärten gebaut.
- P. peregrina* Mill. }

Berberideae Vent.

- Berberis* L. Sauerdorn VI. 1.
- B. vulgaris* L. In Hecken und Zäunen verwildert.

Papaveraceae DC.

- Papaver* L. Mohn XIII. 1.
- P. argemone* L. Unter dem Getreide häufig.
- P. hybridum* L. Unter den Weinbergen bei Tennst., am Jüdenhügel bei Langensalza, vor dem Tonnaischen Holze, am Kirchberge bei Greussen.
- P. rhoeas* L. Auf Aeckern gemein.
- P. dubium* L. Auf Aeckern, doch sparsamer.
- P. somniferum* L. Wird häufig kultiviert.
- Glaucium* Tourn. Hornmohn XIII. 1.
- G. flavum* Crntz. Im Taubenthale, auf dem Kirchhofe, an dem Weinbergen, am Galgenhügel b. Tennst., ferner am und unter dem hohen Berge bei Gangloffs., b. Greussen, Naussiss., am Fusswege von Gangl. nach Schwerst., an der Chaussee von Schwerst. nach Straussfurt, auf der Tretenburg.
- G. corniculatum* Curt. Einzeln in der Hölle bei Bruchst., am hohen Berge bei Gangl., auf der Tretenburg, an der Chaussee zwischen Schwerstedt und Straussfurt, namentlich die Form *G. tricolor* Bernh.
- Chelidonium* Tourn. Schellkraut, Goldwurzel XIII. 1.
- Ch. majus* L. An Hecken und Zäunen gemein.
- Hypecoum* L.
- H. pendulum* L. Wurde bei Niedertopstedt und Greussen spärlich gefunden, unter dem Dreisenberge.

Nymphaeaceae DC.

- Nuphar* Sm. Nixblume XIII. 1.
- N. luteum* L. Im Parkteiche in Straussfurt.

Fumariaceae DC.

- Corydalis* DC. Hohlwurz XVII. 2.
- C. cava* Schweig. In Gräsgärten und Wäldern der Umgegend.
- C. intermedia* Men. Im Gebüsch im Himmelreich und im Hain bei Kleinballhausen.
- Fumaria* Tourn. Erdrauch XVII. 2.
- F. officinalis* L. Auf bebautem Lande häufig.
- F. Vaillantii* Loisl. Auf Aeckern, in Weinbergen bei Tennst. und der Umgegend zerstreut.
- F. tenuiflora* Fr. Auf und an der Stadtmauer und auf Aeckern hinter St. Andreas b. Tennstädt.
- (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s): Buddensieg Franz Volkmar

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis 25-26](#)