

Lmk. *Mentha silvestris* L. *Lamium maculatum* L. *Galeopsis latifolia* Hoffm., *speciosa* Mill., *pubescens* Bess. *Origanum vulgare* L. *Thymus serpyllum* L. *Stachys silvatica* L., *palustris* L. *Prunella vulgaris* L. *Lysimachia nummularia* L., *nemorum* L. *Polygonum lapathifolium* L., *hydropiper* L., *aviculare* L. — mit aufrechtem Stengel. — *Rumex conglomeratus* Murr. *Daphne mezereum* L. *Asarum europaeum* L. *Humulus lupulus* L. *Juncus articulatus* L. *Scirpus setaceus* L. *Polypodium phegopteris* L. *Asplenium trichomanes* L.
Meiningen, d. 8. Nov. 1884.

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden u. kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.

(Fortsetzung.)

- Aster species dubia*. In den Teichgräben bei Tennstädt.
A. *salicifolius* Schott. Auf dem Friedhofe in Gangloffs angepflanzt u. verwildert. Tennstädter Friedhof und in Gärten angepflanzt.
Bellis L. Gänseblume XIX. 2.
B. *perennis* L. Allgemein verbreitet.
Erigeron L. Dürrwurz XIX. 2.
C. *canadensis* L. Auf unbebautem Boden und Gartenland.
E. *acer* L. Auf Triften nicht selten.
Solidago L. Goldrute XIX. 2.
S. *virga aurea* L. In den umliegenden Wäldern.
S. *canadensis* L. In Gärten als Zierpflanze gebaut.
Inula L. Alant XIX. 2.
I. *helenium* L. I. Ringleben, Cölleda u. Cannawurf angebaut.
I. *germanica* L. In den alten Weinbergen b. Nängelstädt, Amtmannsberg b. Tennst., an der Chaussee von Schwerstedt nach Strausfurt, Dreiseberg bei Gangloffsömmern.
I. *salicina* L. Auf Wiesen bei Tennstädt, Herbsleber Riet, in den Kiebitzen, Gr. Vargula. An Gräben bei Gangloffs., Strausfurt, Eislache.
I. *hirta* L. An den Abhängen der Unstrutberge zwischen Nängelstädt u. Gr. Vargula.
I. *conyza* DC. Im Chausseegraben zwischen Schwerstedt u. Staussfurt gefunden.
I. *britannica* L. Auf feuchten torfigen Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula, Ottenhausen, Gangloffs., hier in der Eislache unter dem Amtmannsberg.
Pulicaria Gärtner. Flohkraut XIX. 2.
P. *vulgaris* Gärtner. An Angern, Gräben, Wiesen. Auf dem Herbsleber Riete.
P. *dysenterica* Gärtner. Wie vorige. Teich-

graben, a. Bruchteiche u. Gläserloche b. Tennst., Gr. u. Kleinballhausen, Schwerstedt u. a. O.

- Madia* Mol. *Madie* XIX. 2.
M. *sativa* Mol. Als Oelfrucht gebaut.
Bidens L. Zweizahn. XIX. 1.
B. *tripartitus* L. An Gräben, Sümpfen, Ufern.
B. *cernuus* L. Wie vorige, doch seltener.
Helianthus L. Sonnenrose XIX. 3.
H. *annuus* L. In Gärten als Zierpflanze u. in Feldern als Oelfrucht gebaut.
H. *tuberosus* L. Erdapfel, Tompinambar. Angebaut u. verwildert, am Sandsteinbruch in Kleinballhausen.
Rudbeckia L. Rudbeckie XIX. 2.
R. *laciniata* L. In Gärten kultiv. und verwildert.
Filago Tourn. Schimmelkraut XIX. 4.
F. *germanica* L. Acker, trockene Wiesen.
F. *arvensis* L. Aecker, trockene Hügel.
F. *minima* L. Wie vorige.
Gnaphalium Tourn. Ruhrkraut XIX. 2.
G. *silvaticum* L. In lichten Wäldern auf Schlägen.
G. *uliginosum* L. Feuchte Aecker und Pfützen gemein.
G. *dioicum* L. Auf sonnigen Triften, an Wäldern.
G. *margaritaceum* L. In Gärten kultiviert.
Helichrysum Gaert. Immerschoen. XIX. 2.
H. *arenarium* DC. Am Steingraben bei Clingen.
Artemisia L. Beifuss XIX. 2.
A. *absinthium* L. Wermuth. In Gärten u. Feldern im Grossen gebaut.
A. *abrotanum* L. Wie vorige.
A. *pontica* L. An der Hatschke b. Tennstädt, in neuerer Zeit nicht mehr beobachtet.
A. *campestris* L. An trockenen Hügeln b. Tennst., Gangloffs, Greussen, Lützens. b) *sericea* DC. Tennst. am Kalkhügel, Rabenhütte b. Lützensömmern.
A. *vulgaris* L. An Zäunen, unbebauten Orten.
A. *dracunculus* L. In Gärten angepflanzt u. in Ringleben im Grossen kultiviert.
A. *Tournefortiana* Rehb. In Gärten gezogen.
Achillea L. Garbe. XIX. 2.
A. *ptarmica* L. Auf Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula u. Herbsleben.
A. *millefolium* L. Schafgarbe. Wiesen u. Wege. b) *lanata* Koch. Tretenburg, Galgenhügel b. Clingen, Dreiseberg b. Gangloffs., Läusebiel b. Schwerst. d) *setacea* WK. Im Hornholze.
A. *nobilis* L. Auf der hiesigen Stadtmauer, auf der Turmmauer der Neumühle, vor dem Hornholze, Kirchheilingen, Westgreussen.
Anthemis L. Hundskamille XIX. 2.

- A. tinetoria* L. Trockene, sonnige Hügel, Wegeränder, Mauern.
A. arvensis L. Unter dem Getreide häufig.
A. cotula L. Flussufer, Aecker, in Dörfern.
A. nobilis L. Römische Kamille. Angebaut.
A. Marschallii. An Ackerrändern an der Chaussee b. Kleinvargula in wenigen Exemplaren gefunden.
Matricaria L. Kamille XIX. 2.
M. chamomilla L. Auf Aeckern bei Tennst. selten, häufig bei Nausiss, Herrenschwende, Weissensee u. Ebeleben.
M. inodora L. Unter der Saat gemein.
Tanacetum Tourn. Rainfarn XIX. 2.
T. vulgare L. An Flussufern u. Wiesenrändern.
T. corymbosum Schultz bip. In den umliegenden Hölzern.
T. parthenium Schultz bip. Mutterkraut. In Gärten kultiviert, sonst an Wegen, Schutt u. in Dörfern verwildert.
Chrysanthemum L. Wucherblume. XIX. 2.
Chr. coronarium L. In Gärten kultiviert.
Leucanthemum Tourn. Kammerblume. XIX. 2.
L. vulgare Lmk. Auf Wiesen und in Wäldern.
Doronicum L. Gemswurz. XIX. 2.
D. pardalianches L. } In Gärten kultiviert
D. austriacum L. }
Senecio L. Kreuzkraut. XIX. 2.
S. spathulifolius DC. In den umliegenden Wäldern.
S. vulgaris L. Auf Aeckern, Wegen, Schutt gemein.
S. viscosus L. Im Horn- u. Blankenburger Holze b. Ringleben u. Walschleben.
S. silvaticus L. Im Fahner'schen Holze.
S. erucifolius L. Im Gebüsch b. Tennst. u. in den umliegenden Hölzern, bei Herbsl., unter dem Amtmannsberge, bei Gangloff- und Lützensömmern.
S. paluster DC. Auf sumpfigen Wiesen b. Mittelhausen.
S. Jacobaea L. Auf Rasenrainen.
S. nemorensis L. In den umliegenden Hölzern.
Calendula L. Ringelb. u. Totenblume. XIX. 2.
C. officinalis L. In Gärten kultiviert und b. Cannawurf u. Kindelbrück im Grossen gebaut.
Cirsium Tourn. Distel XIX. 1.
C. lanceolatum Scop. Auf Triften, Wegen gemein.
C. eriophorum Scop. An Wegen und Flussufern in der ganzen Umgebung, doch einzeln. Amtmannsberg, Tretenburg, Kiebitzen, Herbsleben, Naegelst., Schwerstedt, Greussen, Gebesee, Gr. Vargula, Unstrutufer.
C. palustre Scop. Auf Wiesen und Ufern in der ganzen Umgegend.
C. acaule All. Trockene Hügel, Triften u. Wege.
 b) *caulescens* Pers. Wie vorige b. Tennstätt, Vargula etc.
C. bulbosum DC. Auf feuchten Wiesen b. Tennst. Unter dem Amtmannsberg, Kiebitzen, Mittelwiesen b. Tennstätt, Herbsleber Riet. Im Unstrut- und Gera-Thale.
C. oleraceum Scop. Feuchte Wiesen, Gräben, Gebüsch.
C. arvense Scop. Auf Aeckern u. wüsten Plätzen.
C. palustri-bulbosum Naeg. Auf den Wiesen der Unstrut zwischen Gebesee u. Walschleben.
C. palustri-oleraceum Naeg. Auf Torfwiesen b. Tennst. u. im Unstrutthale zwischen Herbsleben u. Gross-Vargula, auch auf den Wiesen der Gera bei Ringleben etc.
C. cano-oleraceum Naeg. Auf den Wiesen zwischen Walschleben u. Rieth-nordhausen.
C. bulboso-acaule Naeg. Auf Torfwiesen b. Tennst. Riet u. auf dem See bei Weissensee.
C. bulboso-oleraceum Naeg. Auf Wiesen b. Tennst., Gr. Vargula, Naegelst. u. Ringleben.
C. oleraceo-bulbosum Naeg. Torfwiesen b. Tennstätt, Ottenhausen, See bei Weissensee.
C. oleraceo-acaule Hampe. Wie vorige. Walschleben, Ottenhausen, Bruchwiesen b. Tennst.
Silybum Vaill. Mariendistel. XIX. 1.
S. marianum Gärtn. In Gärten kultiviert, in Ringleben u. Gr. Ballhausen im Grossen gebaut u. in der Umgegend verwildert.
Carduus L. Distel. XIX. 1.
C. acanthoides L. An Wegen, Aeckern nicht selten.
C. crispus L. Wiesen, Wälder, Gebüsch, Ufer.
C. nutans L. Triften, Wege, Raine.
Onopordon Vaill. Eselsdistel XIX. 1.
O. acanthium L. Wege, gemein.
Lappa Tourn. Klette XIX. 1.
L. officinalis All. Wege, Wälder.
L. minor DC. Wüste Plätze, Wege, Schutt.
L. tomentosa Lmk. Wie vorige, doch seltener.
Carlina Tourn. Eberwurz XIX. 1.
C. acaulis L. An den Unstrutbergen b. Naegelst. u. Gr. Vargula, Bruchstedt, Blankenburg, Dallstedter Trift.

C. vulgaris L. Steinbrüche b. Tennst.,
Bruchstedt, Hornholz etc.
Serratula L. Scharte. XIX. 1.
S. tinctoria L. Auf Wiesen, im Gebüsch
u. in Wäldern.
Carthamus Tourn. Saffor. XIX. 1.
C. tinctorius L. Bei Erfurt gebaut.
Cnicus Vaill. Benedikte XIX. 1.
C. benedictus L. In Ringleben im Grossen
gebaut.
Centaurea L. Flockenblume XIX. 3.
C. jacea L. Auf trockenen Wiesen und
Rasen.
b) *decipiens* Thuill. Warte bei Schwer-
stedt.
c) *pratensis* Thuill. Wie vorige.
C. phrygia L. Im Fahner'schen u. Ton-
naischen Holze.
C. cyanus L. Unter dem Getreide häufig.
C. scabiosa L. Weinberge, Hügel, Raine.
C. maculosa Lmk. Auf den Stadtmauern
in Tennst., Weissensee, Greussen, Kin-
delbrück, Langensalza, Dreiseberg b.
Gangloffs., Naegelstedt.
C. solstitialis L. Hin u. wieder auf Lu-
zerne- u. Linsenäckern b. Tennstädt,
Haussoemmern u. Greussen, Goldklinge,
bunte Mantel.
Lapsana Tourn. Milche XIX. 1.
L. communis L. Sehr häufiges Unkraut.
Arnoseris Gaert. Lammkraut. XIX. 1.
A. pusilla Lk. Auf sandigen Aeckern
über den Sandsteinbrüchen b. Tennst.
Cichorium Tourn. Wegewarte. XIX. 1.
C. intybus L. An allen Wegen.
Thrinia Rth. Zinnensaat XIX. 1.
Th. hirta Rth. Auf salzhaltigen Wiesen
unter der Tretenburg und See bei
Weissensee.
Leontodon L. Loewenzahn. XIX. 1.
L. autumnalis L. Wiesen, Raine gemein.
L. hastilis L. Wie vorige.
Picris L. Bitterkraut. XIX. 1.
P. hieracioides L. Wiesen, Wegränder
gemein.
Helminthia Juss. Wurmkraut. XIX. 1.
H. echinoides Gaert. Auf Luzernäckern
b. Tennst., Herbsleben, Mittels. u. Gr.
Vargula selten.
Tragopogon L. Bocksbart (Haferwurz).
T. porrifolius L. Als Gemüse gebaut.
T. major Jacq. An sonnigen Anhöhen,
Weinbergen.
T. pratensis L. Häufig.
b) *minor* Fries.
c) *orientalis* L. Diese weniger häufig
in der Umgegend an Wegen, Chaussee-
gräben. Steinbrüchen, steilen Aeckern,
Amtmannsberg, Tretenburg.
Scorzonera L. Schwarzwurz. XIX. 1.
Sc. humilis L. Auf den Wiesen an der
Gera zwischen Mittelhausen u. Gebesee.
Sc. hispanica L. Auf der Tretenburg
b. Tennst. Am Steiger, Amtmanns-

berge, Greussen, Gangloffs., Naegelst.
Sc. glastifolia Willd. Am Judenhügel b.
Langensalza.
Sc. asphodeloides Wallr. Auf der Tre-
tenburg.
Sc. purpurea L. Auf Kalkbergen, Drei-
seberg bei Gangloffs., Hengstberg bei
Greussen.
Podospermum DC. Stielsame. XIX. 1.
P. laciniatum DC. Raine, Aecker und
Wegeränder, Weinberge, ziemlich
häufig. In den Weinbergen an dem
Sauborn.
Hypochaeris L. Ferkelkraut. XIX. 1.
H. glabra L. Tennst., Gr. Urleben,
Weissensee.
H. radicata L. Wiesen, Triften, Rasen
gemein.
Achyrophorus Scop. Hachelkopf.
XIX. 1.
A. maculatus Scop. Auf Rasenrainen im
Gerichtsfelde b. Tennst., Tretenburg,
Silberhügel b. Gangloffs., Naegelstedt,
Läusebiel.
Taraxacum Juss. Bumbaum, Loewen-
zahn.
T. officinale Web. Allgemein verbreitet.
var. *T. palustre* DC. Auf sumpfigen
Wiesen.
Leontodon erectus Hoppe.
L. salinus Poll. Wiesen unter der
Tretenburg u. auf dem See bei Weis-
sensee.
Chondrilla Tourn. Krümling. XIX. 1.
Ch. juncea L. Hin u. wieder b. Tennst.
an den Gebirgen hinter der Klipp-
mühle, im Chausseeegraben nach Langen-
salza, Kirchheilingen, Greussen, über
dem Taubenthale, a. Eselswege, zwischen
Gross- u. Kleinvargula.
Lactuca L. Lattich. XIX. 1.
L. sativa L. Salat kultiviert.
L. virosa L. Am Hauptgraben auf dem
See b. Weissensee.
L. scariola L. An Gräben, wüsten Plätzen
u. Wegen um Fennstädt u. a. O. nicht
selten.
L. saligna L. Chausseeegräben von Schwer-
stedt bis zur Grossballh. Grenze auf
Letteboden. Sandsteinbruch u. Lehm-
grube b. Kleinballh., Chausseeegraben
unter dem Amtmannsberge, Schilfa an
den Steinbrüchen nach dem hohen
Berge zu, Bahnhof zu Strausfurt, auf
Klee u. steilen Aeckern zwischen dem
Läusebiel u. Gr. Ballhausen, immer auf
Thon-, Kalk- u. Letteboden in Masse.
Kleeäcker im Kirchthale auf Harnisch
Plan, in den Hohlen des alten Haus-
sömmerschen Weges u. in den Chaussee-
gräben daselbst. Auf steinigem Aeckern,
Steinbrüchen, Chausseeegräben, b. Tennst.
in der Goldklinge u. am Amtmanns-
berg b. Grossballhausen u. Schwer-

- stedt, Ringleben, Gangloffs. u. an a. Orten.
L. muralis Less. Im Horn- u. Blankenburger Holze.
L. perennis L. Soll bei Greussen vorkommen. Habe von dort noch keine Pflanze gesehen.
Mulgedium Cass. Milchlattich. XIX. 1.
M. alpinum Cass. Am Graben des Lindgarten im Himmelreich b. Tennst. verwildert.
Sonchus L. Sandistel. XIX. 1.
S. oleraceus L. Auf bebautem Boden häufig.

(Forts. folgt.)

Bibliothek.

- 1091) Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwiss. Gesellschaft Isis in Dresden. Dresden, 1885. [Tausch.]
 1092) Procès-Verbaux des séances de la Société Royale Malacologique de Belgique. Tome XII, Août-Décembre 1884. Bruxelles. 1884 [Tausch.]
 1093) Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 1882—83. St. Gallen, 1884. [Tausch.]
 1094) Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. Tom. VII, Entr. 3. Buenos Aires 1884. [Tausch.]
 1095) P. Magnus, *Marrubium Aschersonii* (vulgare-alysson), ein neuer Bastard. S. A. 1884.
 1096) dto., über eine durch *Polyporus Schweinzi* Fr. getötete *Weymouthkiefer* im Berliner Botanischen Garten. S. A. 1884.
 1097) dto., über die Ausbildung der inneren Petala bei zweizähligen Orchideenblüten. S. A. 1884.
 1098) dto., über eine besondere geographische Varietät der *Najas graminea* Del. u. deren Auftreten in England. S. A. 1883.
 1099) dto., Botanische Mitteilungen:
 a) Missbildung von *Dianthus caryophyllus*. b) Monströse Blüten einer *Begonie*. c) Anomale Vegetationsercheinungen. d) Mykologische Mitteilungen. S. A. Berlin, 1885. [Nr. 1095—1099 Gesch.: Prof. Dr. Magnus-Berlin, K. M. d. J.]
 1100) Procès-Verbaux des séances de la Société Royale Malacologique de Belgique. Tome XIII. Année 1884. Bruxelles. 1884. [Tausch.]
 1101) *Acta Horti Petropolitani*. Tom.

- VIII. Fasc. 1—3. Petersburg, 1883—84. [Tausch.]
 1102) A. Engler, *Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte u. Pflanzengeographie*. Bd. VI, Heft 3. Leipzig, 1885.
 1103) Botanischer Verein in Magdeburg. Sitzungsberichte vom August bis Dezember 1884. [Tausch.]
 1104) *Leopoldina*. Amtl. Organ d. Kais. Leopold. Karol. Akademie der Naturforscher. 1885, Nr. 1—4. Halle, 1885. [Tausch.]
 1105) *Acta Horti Petropolitani*. Tom. IX. Fasc. 1. Petersb. 1884. [Tausch.]
 1106) Mitteilungen des K. K. Steiermärkischen Gartenbau-Vereines in Graz. Jahrg. 1884. Nr. 6—12. Graz, 1884. [Tausch.]
 1107) Isis. Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Jahrg. VII. 1882.
 1108) Lehmann, Dr. Rich. Über systematische Förderung wissenschaftlicher Landeskunde von Deutschland. S. A. Berlin, 1882 [Tausch.]
 1109) Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin. Nr. 131—145. Berlin, 1883. [Tausch.]
 (Forts. folgt.)

Zur Notiz!

Indem ich die Irmischianer auch dies Jahr zu recht fleissigen phänologischen Beobachtungen auffordere teile ich zugleich namens des Vorstandes mit, dass neue Formulare zur Einzeichnung derselben hergestellt worden sind und vom Vorsitzenden des Vereins portofrei an die Mitglieder versandt werden, welche ihren darauf bezüglichen Wunsch durch Postkarte zu erkennen geben.

Dr. H. Töpfer.

Litterarisches.

Deutsche Botanische Monatsschrift,
 herausgegeben von Prof. Dr. Leimbach
 in Sondershausen.

III. Jahrg. (1885) Nr. 3: Holuby, die Prunellen der Flora des Trentschiner Komitates i. Ungarn. Wörlein, Bemerkungen über neue oder kritische Pflanzen der Münchener Flora (Forts.) Töpfer, Gastein und seine Flora (Forts.) Entleutner, Flora von Meran in Tirol (Forts.) Dichtl, Nachträge zur Flora von Nieder-Österreich (Forts.) Röhl, Thüringer Laubmoose und ihre geographische Verbreitung (Forts.) Zeitungsschau. Korrespondenzen: Huter. Anzeigen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1885](#)

Autor(en)/Author(s): Buddensieg Franz Volkmar

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis. \(Fortsetzung.\) 21-24](#)