

Erster Nachtrag zu den Schlupfwespen von K. T. Schütze, Rachlau und Dr. Roman, Stockholm.

Von Hermann Starke, Bautzen.

Herr Oberlehrer K. T. Schütze † veröffentlichte in Isis Budissina, Band 12 (1928/1930), die in der Oberlausitz beobachteten Schlupfwespen und deren Wirte. Ein Ergebnis, das er in seiner langen entomologischen Tätigkeit ausschließlich aus seinen und zum Teil aus meinen Zuchten von Lepidopteren, Dipteren und Hymenopteren erhalten hat.

Dazu möchte ich als Ergänzung die von mir später aus Zuchten erzielten und durch systematisches Sammeln mit dem Netz, an Fenstern und Glasveranden erbeuteten, aber von Schütze nicht angeführten Schlupfwespenarten veröffentlichen.

Auch diese Arbeit kann nicht als Abschluß der Oberlausitzer Ichneumoniden-Fauna aufgefaßt werden, denn dazu ist erstens die Zeit zu kurz, in der gesammelt wurde, zum andern konnten von mir allein nicht alle entfernten Gebiete regelmäßig besammelt werden, und drittens möchte ich die Veröffentlichung wegen vorgerückten Alters nicht weiter hinausschieben.

Im Zittauer und Kamenzer Landkreis ist nur gelegentlich gesammelt worden. Gründlicher ist das Gebiet um Bautzen und Löbau in je rund 20 Kilometer im Durchmesser durchforscht. In diesem Gebiet sind alle möglichen Biotope vorhanden, Berg-, Hügel-, Heide- und Teichlandschaft in reicher Abwechslung.

Es ist auch selbstverständlich, daß es nie gelingen wird, die Schmarotzer, in diesem Fall die Ichneumoniden und Braconiden, eines Gebietes restlos durch Zuchten anderer Insektenordnungen zu erfassen und damit zugleich die Wirte und ihre Mieter zueinander festzustellen.

Ein Teil der Schmarotzer wird nur durch direktes Fangen mit dem Netz und der Methode, günstig gelegene Glasveranden abzusuchen, zu erbeuten sein, denn die Biologie vieler Arten wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Wenn man einen wahrscheinlichen Bestand eines bearbeiteten Gebietes erhalten will, muß man schon zu vorgenannten Methoden als Ergänzung zu den Zuchtergebnissen greifen.

An dieser Stelle ist es mir eine angenehme Pflicht, den Herren Chr. Cohrs, Chemnitz, und K. Hedwig, Breslau, für ihre immer bereitwilligste Übernahme der Bestimmung und Überprüfung der meisten Arten zu danken. Ohne ihre Mitarbeit wäre es mir nicht möglich gewesen, diesen Nachtrag zu liefern.

Eine große Anzahl Arten, besonders Braconiden, konnten, weil noch unbestimmt, hier nicht Aufnahme finden, die in einer späteren Arbeit folgen mögen.

Ferner danke ich noch den Herren Dr. Jordan (J) und H. Freude (Fr.), Bautzen, G. Feurich (F.), Göda, Glathe (G.), Niedercunnersdorf Schmidt (S.), Löbau, Schmidt (Sch.), Gersdorf, Kube (K.), Friedersdorf, und Wadewitz (W.), Groß-Schweidnitz, für Überlassung ihrer gezüchteten Arten.

Bei der nun folgenden Aufstellung führe ich die durch Zucht erhaltenen Arten vor ihren Wirten an. Die mit einem Stern (*) bezeichneten Arten sind schon in Schützes Verzeichnis aufgeführt, es handelt sich bei der Wiederholung um dort nicht angeführte Wirtstiere, der Wichtigkeit halber ist dies nötig. Ebenso folge ich bei der Aufstellung der Familien und Gattungen dem Verzeichnis von K. T. Schütze und Dr. Roman, s. d.

Wo die Orte Bautzen, Kamenz, Löbau und Zittau angeführt sind, handelt es sich um Kreis-Städte. Es ist damit meist der weitere Umkreis als Fundort inbegriffen, wie Löbau: Löbauer Berg; Zittau: mit Gebirge; Rachlau bedeutet: Czorneboh-Gebirgszug.

Ichneumonidae.

1. Unterfamilie *Ichneumoninae*.

Gattung: *Aethecerus* Wes.

A. dispar Thm. Bautzen, 7.—9.

Gattung: *Amblyteles* Wes.

A. vadatorius Ill. Bautzen, Rachlau, Göda, 6.—10.

A. occisorius F. 4—9. Bautzen, Guttau, Lömischau.

A. armatorius Pz. 8. 9. (1933 traf ich die Art häufig auf der Schneekoppe.) Kottmar und Neugersdorf (Röbler).

A. inspektor Wes. 5—10. mit var. *nigriventris* Berth. Bautzen und Kottmar.

A. subsericans Gra. mit var. *elongata* Bri. 5—8. verbreitet und aus *Hadena unanimitis* Tr. erzogen.

A. nitens Chr. 5—7. Bautzen, Wuischke, Lömischau und Neugersdorf ex Noctuen-Larve erhalten.

A. sputator F. 6—8. Rachlau, Bautzen.

A. oratorius F. 6—8. Löbau (G.), Quoos und Neugersdorf.

A. punctus Gra. 7—9. Quoos.

A. fossorius M. mit var. *amputorius* Pz. 5—8. Binnewitz (Fr.) Bautzen, Gröditz, Blösa.

A. camelinus Wes. 7. 8. und aus *Vanessa polychloros* L. erzogen.

A. negatorius F. 5—8. Verbreitet.

A. uniguttatus Grv. mit var. *interjectus* Tischb. Hoske (J.), Bautzen, Weifa, Radibor, 5.—9.,

A. longimanus Wes. 6. Bautzen, Neugersdorf ex Noctuen-Larve (Röbler).

A. castigator F. 6. Neschwitz.

A. indocilis Wes. 8. Bautzen.

- A. trifasciatus** Gra. Löbau, Niedercunnersdorf (G.) und aus unbekannter Zucht.
A. amatorius Müll. 8. Sdier.
A. culpatorius L. 6—8. Verbreitet.
A. repentinus Gra. 6. Bautzen.
A. melanocastanus Gra. 6. 7. Bautzen, Neschwitz.
A. egregius Gra. 6. 7. Verbreitet.
A. nigrifrons Hlm. 7. 8. Commerau, aus *Nonagria typhae* Thb.*
A. unilineatus Gra. 7. 8. und aus *Nonagria sparganii* Esp. erzogen
A. devylderii Hlm. 8. Bautzen.

Gattung: **Alomya** Pz.

- A. debellator** F. 5. 6. Bautzen, Löbau.

Gattung: **Apaeleticus** Wes.

- A. bellicosus** Wes. 9. Quoos.

Gattung: **Baeosomus** Gra.

- B. mitigiosus** Gra. 7. 8. Bautzen, Sora.

Gattung: **Catadelphus** Wes.

- B. arcogator** F. ex *Pergesa elpenor* L. (G.).

Gattung: **Chasmodes** Wes.

- C. motatorius** Gra. ex *Nonagria sparganii* Esp. 5—8. Bautzen, Blösa, Teichnitz.

Gattung: **Colpognatus** Wes.

- C. armatus** Ths. 6—8. Verbreitet.
C. celerator Gra. 7. Caßlau, Lömischau.
C. jucundus Wes. 5. Bautzen.

Gattung: **Diadromus** Wes.

- D. ustulatus** Hlm. 9. 10. Bautzen, Rachlau.
D. subtilicornis Gra. ex *Plutella maculipennis* Crt.

Gattung: **Dicaelotus** Wes.

- D. morosus** Wes. 5—7. Bautzen, Teichnitz.
D. pumilus Gra. 7—9. Gersdorf (Sch.), Bautzen, Caßlau, Rachlau.

Gattung: **Exephanes** Wes.

- E. occupator** Gra. mit var. **contaminator** Gra. 9. Rachlau.
E. hilaris Gra. 5. Bautzen.
E. unigutatus Krie. 7. Lausche.
E. nigrifemur Tischb. 5. Bautzen.

Gattung: **Hoplismenus** Gra.

- H. armatorius** Pz. Bautzen, Niedergurig, überwintend unter Rinde.
H. violentus Gra. 7. Neudorf.

Gattung: *Ichneumon* L.

- I. quaesitorius* L. 6. Löbau.
I. extensorius L. 7. 8. Rachlau, und aus *Nonagria typhae* L.
I. molitoris Hlm. 7. 8. Bautzen, Rachlau.
I. sarcitorius L. Verbreitet und nicht selten. 7. 8.
I. suteralis Hlm. 4—7. Rachlau, Bautzen.
I. gracilentus Wes. 5—8. Bautzen, Radibor und aus *Porthesia similis* Fue. erzogen.
I. confusorius Gra. Verbreitet und aus *Nonagria typhae*, *sparganii* und *cannae* gezüchtet.
I. Walkeri Wes. 5. Bautzen, Niedergurig.
I. terminatorius Gra. Verbreitet und nicht selten.
I. primatorius För. 7. Rachlau.
I. rubens Fouse. 7. 8. Löbau, Stromberg.
I. culpator Schrk. mit var. *fumigator* Gra. und var. *adrentator* Tschck. 7. 8. Bautzen, Blösa, Cosul.
I. bellipes Wes. var. *medialis* Wes. 8. Rachlau, Cosul.
I. sputator F. 7—10. Verbreitet.
I. gracilicornis Gra. mit var. *stenocerus* Thm. und var. *nigricauda* Berth. 7—9. ex *Melitaea athalia* Rtt. und im Gebiet verbreitet.
I. castaniventris Gra. 6. 7. Überall, nicht selten mit Aberation.
I. tuberculipes Wes. 9. Lömischau.
I. macrocerophorus D. T. 9. Rachlau (= *macrocerus* Thm.).
I. stenocerus Thm. 8. Bautzen.
I. tempestivus Hlm. 7. 8. Verbreitet.
I. bucculentus Wes. 8. Bautzen.
I. insidiosus Wes. 7. 8. Blösa, Rachlau.
I. xanthorius För. 8. Cosul.
I. submarginatus Gra. 5. 6. Bautzen, Löbau.
I. albicollis Wes. 5. Wuischke.
I. suspiciosus Wes. Quoos aus *Nonagria spec.*
I. lepidus Gra. und var. *fallax* Gra. 6. Bautzen.
I. bilunulatus Gra. mit var. *punctus* Berth. 5—7. Weifa, Niedergurig, Neudorf.
I. albilarvatus Gra. mit var. *obscurior* Berth. 5. 6. Bautzen, Löbau.
I. nigritarius Gra. 5—9. Verbreitet und nicht selten.
I. leucocerus Gra. Neschwitz, unter Rinde überwintend (J), und aus *Acronicta leporina* und *aceris* Puppen.
I. impressor Ztt. 7. Rachlau, und aus *Saperda populnea* erzogen.
I. fuscipes Gra. 5—9. Neschwitz, Lömischau.
I. fereus Gra. 8. Rachlau.
I. alpicola L. 6. Bautzen, Löbau, Neudorf.
I. solutus Hlm. Neusalza-Spremburg (K.).
I. Wacklini Hlm. Halbendorf (J).
I. falsificus Wes. 6. Löbau.
I. militarius Thnb. = *pictorius* Gra. 6. Löbau.
I. urticarum Hlm. 7. Neudorf.
I. periscelis Wes. Sdier. 9.

- I. derasus* Wes. mit var. **percusor** Tischb. 5.—8. Neschwitz, Lausche (Fr.), Neudorf.
I. albinus Gra. 6—8. Bautzen, Sora (Fr.).
I. Wesmali Thm. 9. Bautzen.
I. deliratorius Wes. 5. Bautzen.
I. praesticator Wes. 6. Rotstein.
I. Mölleri Hlm. ex *Mamestra serena* Puppe.
I. bilineatus Gra. 6. Göda (F.).
I. scutellator Wes. 4. Valtenberg.
I. saturatorius L. 5—10. Bautzen, Quoos.
I. sugillatorius L. 6. Löbau, Rotstein.
I. comitator L. ex *Acronicta aceris* Puppe.
I. haematomenus Hlm. 5. Göda.
I. bimaculatorius Pz. 9. Lömischau.
I. nudicoxis Thm. 9. Quoos.
I. crassifemur Thm. 6. Bautzen.
I. palliditarsis Thm. 6. Neschwitz, Guttau.
I. tergenus Gra. 7. Bautzen, Neudorf.
I. bimaculatus Schrk. 6. Neschwitz.
I. eburnifrons Wes. Bautzen, Löbau.
I. liostylus Thm. 7. 8. Bautzen, Blösa.
I. latrator F. 6—8. Verbreitet und nicht selten.
I. angustatus Wes. 5—7. Bautzen, Neudorf, Lömischau.
I. defraudator Wes. 6. Neschwitz, Caßlau.
I. incomtus Hlm. 9. Lömischau.
I. anulator F. 5—8. Bautzen, Radibor, Löbau.
I. grandicornis Thm. Bautzen, Rachlau, Cosel, Weifa.
I. memorator Wes. 7. 8. Verbreitet und nicht selten.
I. basiclyptus Kri. 6—8. Bautzen, Rotstein.
I. lacteator Gra. Bautzen, 9.
I. pseudocryptus Wes. Löbau, 6.
I. ochropis Gra. 7—9. Rachlau, Neschwitz.
I. corruscator L. 6. Neschwitz.
I. citrinops Wes. 7. Gleina.
I. semiruf. var. **nigroscutatus** Berth. Bautzen, 7.
I. sripterius Thnb. 8. 9. Bautzen.
I. incubitor L. mit var. **punctus** Berth. Bautzen, Löbau, 6—9.
I. melanopygus Wes. Göda (F.), Bautzen, Sora, 5. 6.
I. luctatorius L. Bautzen, 6.
I. deceptor Gra. 5—8. Bautzen, Blösa, Neudorf.
I. fabricator F. im Gebiet mit var. 1, 2 und 3. Verbreitet und nicht selten.
I. albicinctus Gra. Bautzen, 5—8.
I. delator Wes. Bautzen, Löbau, 5.
I. simulans Tischb. Sora.
I. quadrianellatus Thm. 9. Lömischau, Lubachau.
I. subquadratus Thm. 7. Rachlau, Sora.
I. proletarius Wes. 9. Bautzen.
I. pusillus Schmdk. 6. Sora.
I. multipictus Gra. 7. Caßlau.

- I. lucutor** Thnb. Rotstein, 6.
I. fusorius L. 7—10. Bautzen, Lömischau, Pielitz.
I. disparis Pod. ex *Lymandria monacha* L. Puppen.
I. truncatulus Thm. 5. 6. Niedergurig.
I. consimilis Wes. 6. Bautzen.
I. immisericors Tischb. 9. Lömischau.
I. batis Hlm. Weißkolm, 7.
I. nobilis Wes. 8. Göda.
I. dissimilis Gra. 6. 7. Rachlau, Weißkolm.
I. nivatus Gra. Göda, 8.
I. cordiger Krichb. Bautzen, 7.
I. versicolorus Hlm. Bautzen, 7.
I. quaesitorius L. 6. 7. Bautzen, Rotstein.

Gattung: **Ischnus** Gra.

- I. truncator** F. 10. 12. Bautzen.
I. nigricollis Wes. Cosul.

Gattung: **Mevesia** Hlm.

- M. alternans** Wes. Bautzen, 9.

Gattung: **Phaeogenes** Wes.

- P. imiger** Wes. ex *Olethreutes penthinana* Gn. Göda (F.).
P. tegularis Thm. 6—8. Verbreitet.
P. fuscicornis Wes. Verbreitet und nicht selten.
P. mysticus Wes. 4. An den Fenstern des Aussichtsturmes auf dem Valtenberg häufig.
P. marginella Thm. Bautzen, 5.
P. nanus Wes. Rachlau, Bautzen, 9.
P. stimulator Gra. Verbreitet und aus *Tortrix viridana* erzogen.
P. planipectus Hlm. Blösa, Quoos, Guttau, Neudorf, 7. 8.
P. rusticatus Wes. Bautzen, nicht selten an einer Veranda, 24. 4. 37.
P. fulvitaris Wes. 7. Bautzen.
P. muricifer Hlm. Bautzen, 6.
P. scutellaris Wes. Rachlau, unter *Acer*-Rinde, 4. 4. 33.
P. nigridens Wes. = **curator** Thn. 7. 8. Bautzen, Neudorf.
P. spiniger Gra. 7. Bautzen, Göda.

Gattung: **Platylabus** Wes.

- P. opaculus** Thn. 5—9. Verbreitet.
P. decipiens Wes. Bautzen, Neudorf, 7—9.
P. exhortator F. 9. 10. Niedergurig.
P. irripennsis Gra. 7. Bautzen, Löbau.
P. pedatorius F. Verbreitet und nicht selten, 5—9.
P. eurygaster Hlm. 9. Löbau, Hochkirch.
P. lativentris Thm. Bautzen, Sora, 5.
P. tenuicornis Gra. Bautzen, Sora, Rotstein, 6.
P. gigas Kri. 5. 6. Bautzen, Radibor, Quoos.

- P. dimidiatus** Gra. Neudorf, Niedergurig, 8.
P. pumilio Hlm. Neudorf, Rachlau, 8.
P. saxonicus Hedwig. Neue Art, 1 ♀, Bautzen, 14. 7. 38, Länge 10 mm,
 Flügelspannung 10 mm. Type in Sammlung Hedwig, Breslau.

Gattung: **Probolus** Wes.

- P. alticola** Gra. Bautzen, 9.

Gattung: **Thyraeella** Hlm.

- T. collaris** Gra. ex *Acrolepia assectella*, Rachlau, 10.

Gattung: **Trogus** Pz.

- T. lutorius** F. ex *Smerinthus ocellata* L. Niederoderwitz (Kramer).
T. flavatorius Pz. ex *Lymandria monacha* L.

2. Unterfamilie **Cryptinae**.

Gattung: **Acanthocryptus** Thm.

- A. 4-spinus** Gra. 9. Bautzen, Neudorf.
A. nigriceps Thm. 6—8. Bautzen, Rotstein, Rachlau, Sora, Löbau sind
 vermerkte Fundorte dieser verbreiteten Art.

Gattung: **Acroricnus** Rtzb.

- A. macrobatus** Gra. 9. Sdier, Lömischau, Guttau.

Gattung: **Atractodes** Gra.

- A. compressus** Thm. 5—9. Bautzen, Neschwitz, Neudorf, Lausche.
A. exilis Crt. Bautzen, 9.
A. albovinctus Hal. Litten, Rotstein, 9.
A. parallelus Thm. Bautzen, 9.

Gattung: **Brachycryptus** Thm.

- B. ornatus** Kri. Sora, 6.

Gattung: **Brachycentrus** Tschb.

- B. albator** Thm. Nur im Flachland beobachtet, Quoos, Neschwitz.

Gattung: **Cratocryptus** Thm.

- C. anatorius** Pz. 7—9. Bautzen, Neudorf, Löbau.
C. asociator Thnb. Bautzen, Litten, Rotstein, 8. 9.
C. leucopsis Gra. Caßlau, Neschwitz, 7. 8.
C. sternocerus Thm. Neschwitz, Sora, Löbau, 6.

Gattung: **Cryptus** F.

- C. viduatrius** Pz. 5—8. Häufig im ganzen Gebiet, Fundorte sind: Bautzen,
 Sora, Valtenberg, Löbau, Rotstein, Lausche, Kamenz.
C. spiralis Fou. 5—7. Bautzen, Göda, Neschwitz.
C. fulvipes Myr. Bautzen, 6. 7.
C. albatorius Tschk. Bautzen, Löbau, Kottmar, Bernstadt, 5. 6.

- C. subquadratus* Tschk. Bautzen, Löbau, Zittau, 8. 9.
C. infumatus Thm. Löbau, 6.
C. graciosus Tschk. Bautzen, Lömischau, 7.
C. dianae Gra. mit var. *gracilicornis* Gra. Bautzen, Sora, 6.

Gattung: **Denopheles** För.

- D. caliginosus* Gra. ex *Sesia cepiformis* O.

Gattung: **Exolytus** Hlm.

- E. laevigatus* Gra. Im ganzen Gebiet nicht selten, fast häufig, 5—8.
E. peticularis Thm. Bautzen, Neudorf, Caßlau, 7. 8.
E. divisus Thm. Caßlau, 7.

Gattung: **Gambrus** För.

- G. pauper* Tschk. 6.—10. Nicht selten.
G. director Thm. Bautzen, 6. 7.
G. inferus Thm. Bautzen, Göda, Caßlau, nicht selten, 5.—7.

Gattung: **Goniocryptus** Thm.

- G. plepjeus* Tschk. 5.—7. Bautzen, Litten.
G. abnormis Tschk. Neida, 7.
G. inimicus Tschk. Bautzen, 8.
G. legator Thm. 6.—8. Bautzen, Neschwitz, Neudorf.
G. pictus Thm. Rotstein, 6.

Gattung: **Habrocryptus** Thm.

- H. asseratorius* F. Bautzen, 6.

Gattung: **Hemicryptus** Kri.

- H. tener* Kri. Überwinternd unter Ahornrinde 3.

Gattung: **Hemiteles** Gra.

- H. areator* Pz. 10. Bautzen, ex *Lophyrus pini* et *Coleophora* sp.
H. pulchella Gra. Bautzen, Neschwitz, Lömischau, 10. ex *Coleoph. trigemina* Fuchs. et *Geometra* sp.*
H. bicolorinus Gra. ex Spinneneiern. Bautzen, Göda (F.), Neschwitz, 5. 6.
H. pedestris F. Bautzen, 7.
H. plumbeus Thm. Bautzen, 7.
H. chrysopae Bri. ex Dipteren sp.
H. areolaris Thm. ex *Elachista luticomella* Z.
H. pulchellus Gra. Nicht selten. Bautzen 10. und ex *Tineola* erzogen.
H. subimpressus Bri. ex *Taleporia tubulosa* Rtzb.
H. dubius Gra. Bautzen, 3.
H. scabriculus Thm. ex *Coleophora hemerobiella* Sc.
H. fulvipes Gra. ex *Microgaster* sp.
H. aestivalis Gra. 6.—9. Verbreitet.
H. limbatus Gra. mit var. *ruficollis* Gra. Bautzen, Neudorf und ex *Coleophora hemerobiella* Sc.
H. rubiginosus Gra. ex *Argyresthia certella* Z.

- H. infumatus* Thm. Bautzen, 8.
H. melanogaster Thm. ex *Cosmopteryx scribaiella* Z.
H. marginatus Bri. Bautzen, 10.
H. monocles Thm. Rachlau, 6.
H. pulator Gra. ex *Tineola biselliella* H. et Spinneneiern.
H. fasciicinctus D. T. ex Spinneneiern.
H. nigriventris Thm. ex *Gelechia tragicella* Heyd.
H. bruneus Merl. Bautzen, an Glasveranda, 10.
H. castaneus Tschk. mit var. *atricornis* Str. Neudorf, Neschwitz, 9.
H. minutus Bri. ex *Microgaster* sp.*
H. bipunctatus Thm. 6. Bautzen (Fr.).
H. palpator Gra. 6. Göda ex *Tineola biselliella* Hum.
H. elongatus Rtzb. ex *Taleporia tabulosa* Rtzb.
H. cingulator Gra. 6. 7. Löbau, Göda, Kottmar. Und aus *Tinea granella*.
H. gracilis Thm. 6.—11. Nicht selten.
H. tristator Gra. 6. 7. Bautzen, Göda (F.).
H. liostylus Thm. Bautzen, 5.—9. Nicht selten.
H. flavigaster Schr. Bautzen, 9.
H. Schaffneri Schmdk. ex *Aristotelia ericinella* Dup.
H. sortipes Gra. ex *Bucculatrix citariella* Z.
H. plectiformis Schmdk. Bautzen, 7., und unter Ahornrinde überwintend, 4.,
 Rachlau.
H. Esenbeki Gra. 8. Niedergurig.
H. socialis Rtzb. ex *Lithocolletis cramerella* F.
H. costalis Gra. Göda (F.).
H. decipiens Gra. Bautzen, Löbau.
H. varicoxis Tschb. Bautzen, 5.
H. laevigatus Rtzb. 7.—9. Bautzen, Sora.
H. hemipterus Gra. 5.—7. Bautzen, Hochkirch, Sdier.
H. biannulatus Gra. 6. Bautzen, Weißenberg.
H. discutabilis Schmdk. Zittau, 7.
H. inimicus Gra. mit var. *gallicola* Bri. 5.—7. Bautzen, Neudorf, Radibor,
 Sora.

Gattung: **Hoplokryptus** Thm.

- H. dubius* Tschb. ex Käferlarven spc.
H. cofector Gra. Sora, Pielitz.
H. fagitivus Gra. Rachlau, 7.

Gattung: **Hygrocryptus** Thm.

- H. drewseni* Thm. Kauppa, 6. ex *Chilo phragmitellus* Gr.

Gattung: **Leptocryptus** Thm.

- L. claviger* Tschb. 6.—9. Reichenbach, Göda (F.).
L. rubens Kri. Bautzen, Löbau, 5.—8.
L. albomarginatus Kri. 4.—8. Neudorf, Neschwitz Caßlau et ex Spinneneiern gezogen.
L. brevis Thm. ex *Microgaster* spc.
L. tenuipes Gra. = *ruficaustus* Brid. Verbreitet, 5.—10.

L. aereus Gra. ex Bracon spc.

L. strigosus Thm. Bautzen, Löbau, Göda, Kottmar, 5.—9.

Gattung: **Mesostenus** Gra.

M. ligator Gra. ex Käferlarve.

M. gladiator Scop. Bautzen, Sora, Niedercunnersdorf (G.), 5.—7., Göda (F.), Neschwitz (Fr.).

M. grammicus Gra. Bautzen, Sora 6. 7. et ex *Carpocapsa pomonella* et *Zonosoma alternata* Fll.

M. transfugus Gra. Bautzen, Neudorf, Löbau, Rotstein, Kottmar, 5.—7., et ex *Ephesthia kuehniella* Z. erzogen.

Gattung: **Microcryptus** Thm.

M. basconius Gra. mit var. *pteronosum* Htg. und var. *curtulus* Kri. Bautzen, Quoos, Neudorf et ex *Lophyrus pini* L. erzogen.

M. improbus Gra. 5.—8. Blösa, Caßlau, Neudorf, Rotstein, Kottmar.

M. icrocinctus Gra. Verbreitet und überall nicht selten, 6.—8.

M. arridens Gra. 8. Gersdorf (Sch.).

M. sperator Grv. 5.—9. Überall verbreitet.

M. aries Thm. Bautzen, Löbau, Kamenz, Herrnhut, 5.—10.

M. tricinctus Grv. 5.—9. Rachlau, Blösa, Sora, Löbau.

M. cretatus Grv. Bautzen, 7.

M. arrogans Grv. Bautzen, 7.

M. abdominator Grv. 5.—8. Im Gebirge und in der Ebene nicht selten.

M. bifrons Grv. Bautzen, 9.

M. desertor Grv. Bautzen, Löbau, 5. 6.

M. alutaceus Thm. Bautzen, Caßlau, 5.

M. albulatorius Grv. Göda, 7.

M. brachypterus Grv. mit var. *micropterus* Grv. 5.—7. Bautzen, Löbau, Rachlau, Kottmar, 5.—7.

M. graminicola Grv. Rotstein, 6.

M. pominiens Schmd. Bautzen, 7.

M. sericans Grv. Bautzen, 6.

M. discecleus Grv. var. *curtulus* Kri. Caßlau, 6 (Fr.).

Gattung: **Nematopodius** Grv.

N. formosus Grv. Göda, 7.

Gattung: **Pezomachus** Grv.

P. fasciatus F. Verbreitet ex Spinneneiern, mehr in der Ebene, 3.—10.

P. vagans Ol. Bautzen, Niedergurig, Lömischau, Löbau, 4.—10.

P. omes För. Bautzen, Löbau, Kottmar et ex *Lophyrus pini* L.

P. aphippiger För. Rachlau, 7.

P. mandibularis Thm. Neudorf, 5.

P. Försteri Bri. Bautzen, Commerau, Göda (F.), 8. 9., et ex *Coleophora ochrypennella* Z. et *C. idaeella* Hfm. erzogen.

P. transfuga För. Bautzen, Rachlau, 9. 10. (= *bicolor* var. 3 Grv.).

P. agilis Grv. Verbreitet und nicht selten, 5. 6. 8.

- P. geocharis** För. Blösa 10. et ex *Lophyrus pini* L.
P. trux För. Nicht selten et ex Spinneneiern, 5.—8.
P. vorax För. Lömischau, 10.
P. melanocephalus Schrk. Verbreitet und aus Spinneneiern erzogen.
P. frandulentis För. Neschwitz, Lömischau, 9. 10.
P. lepidus För. ex Spinneneiern.
P. acarorum L. ex *Elachista poae* Stt.
P. hortensis Grv. Lömischau, 10.
P. unicolor För. Bautzen, Löbau, 10.
P. festinans Grv. Lömischau, Löbau, 10., Baruth, 9., Göda (F.).
P. instabilis För. ex Spinneneiern, *Acrobasis consociella* H. St. et *Evetria buoliana* L.
P. betulans För. Blösa et ex Spinneneiern, 10.
P. carnifex För. Bautzen, 9., Löbau, 10.
P. aquisgranensis För. ex *Agroeca brunea*-Eiern.
P. perigrinator För. Lömischau, 10.
P. dimidus För. Bautzen, Göda, Löbau, 7.—10.
P. microcephalus För. ex *Elachista gleichenella* F.
P. antax För. Bautzen, Löbau, Rotstein, 7.—10.
P. impotens För. Bautzen, 10.
P. distinctus För. Bautzen, Rachlau, Bernstadt, 10.
P. fallax För. Bautzen, Kamenz, 6. 9.
P. canaliculatus För. Bautzen, 6.

Gattung: **Phygadeuon** Grv.

- P. cephalotes** Grv. Bautzen, Löbau, 6. 7. et ex *Cacoecia xylosteana* L.
P. punctiventris Thm. Bautzen, Kottmar, 6. 7.
P. liogaster Thm. ex *Acrobasis consociella* Hb. et *Cacoecia xylosteana* L.
P. bitinctus Grv. Bautzen, Neschwitz, 5.
P. bidens Thm. Bautzen, Hochkirch, 10.
P. dimidiatus Thm. Bautzen, Rotstein, 5. 6.
P. troglodytes Grv. Bautzen, 8.
P. mixtus Bri. Kamenz, Quoos, 7. 10.
P. scabosus Thm. ex *Ancylis upupana* Tr.
P. anurus Thm. Bautzen, Rotstein, 8.
P. canaliculatus Thm. Bautzen, Blösa, 9.—11.
P. vexator Thnb. = *variabilis* Grv. Verbreitet Bautzen, Löbau, Kamenz, Zittau, 5.—8.
P. longigena Thm. Bautzen, Löbau, 5. 6.
P. semipolitus Taschb. Im Gebiet verbreitet, 6.—8.
P. perfusor Grv. Bautzen, 4.
P. laeviventris Thm. Bautzen, Löbau, 7.
P. subtilis Grv. = *flavicans* Thm. Überall verbreitet, 5.—8.
P. vagans Grv. 5.—8. Bautzen, Löbau, Kamenz und um Zittau verbreitet.
P. cubiceps Thm. Niedergurig, 8.
P. rusticellae Brid. Zahlreich aus Vogelnestern, die mit *Tinea lapella* Hb. bewohnt sind, erzogen.
P. speculator Grv. Bautzen, 5.—9., an einer Glasveranda immer einzeln, 5. 9.
P. nanus Grv. Bautzen, 5.

- P. curvispina* Thm. ex *Coriscium cuculipennellum* Hb.
P. leucostigmus Grv. Rachlau, Blösa, 4.
P. fumator Grv. Im Gebiet verbreitet und nicht selten, 5.—8.
P. pegomiae Hab. 9. An einer Glasveranda nicht selten in Bautzen.
P. rugipectus Thm. Mit voriger an gleicher Stelle nicht selten.
P. inflatus Thm. Sora, 6.
P. tenuicosta Thm. Bautzen, Radibor, 5.
P. nigerrimus Hdg. Sora, 6.

Gattung: **Plectocryptus** Thm.

- P. arrogans* Grv. In Ebene und Bergland nicht selten. Fundorte sind:
 Bautzen, Lömischau, Sora, Neschwitz, Kamenz, Klostermarienstern,
 Lausche.
P. scansor Thm. Löbau, 6.
P. digitatus Grv. Rachlau, Löbau, 6.
P. perspiculator Grv. Verbreitet und nicht selten im Gebiet.

Gattung: **Pycnocryptus** Thm.

- P. director* Thm. Verbreitet im Flach- und Bergland, 5—7.

Gattung: **Spilocryptus** Thm.

- S. abbreviator* Grv. Neudorf, Stroschütz, Bernstadt, 5. 8. 9.
S. micrator Grv. Lömischau und aus *Lophyrus pini* erzogen.
S. grosus Grv. Cosul, Blösa, 7.
S. nigrator F. Bautzen, 5.—9.
S. solitarius Tschk. und var. *zyganorum* Thm. Bautzen, Neudorf, 5.

Gattung: **Stilpnus** Grv.

- S. gagates* Grv. Bautzen, Neudorf, 6.—9.
S. pavoniae Grv. Bautzen, 7.
S. pladus Grv. Bautzen, Löbau, 9.

Gattung: **Stylocryptus** Thm.

- S. profligator* Grv. Überall verbreitet und nicht selten, die var. *pygmaea*
 Hab. und var. *ruficoxis* Hab. einzeln darunter.
S. parviventris Grv. Wie vorige verbreitet.
S. erythrogaster Grv. mit var. *nigricoxis* Hlm. und var. *clipeator* Hab.
 Überall nicht selten und ex *Adela Ochsenheimerella* Tr. erzogen.
S. brevis Grv. Bautzen, Löbau, Sora, Neudorf, Kottmar, Lausche, 5.—8.
S. rusicus Hab. Verbreitet, Fundorte sind: Bautzen, Löbau, Weifa, Sora,
 Schmeckwitz, Kamenz, 6.—9.

Gattung: **Thaumatotypus** För.

- T. zonatus* För. Neschwitz ex Spinneneiern.

Gattung: **Zaplethocornis**.

- Z. procurator* Grv. Verbreitet und nicht selten, 5. 6.

3. Unterfamilie *Pimplinae*.

Gattung: *Acoenitus* Grv.

A. arator Rossi. Auf Dolden nicht selten, Bautzen, Blösa, Rachlau, Weifa (J.).

Gattung: *Arenetra* Hlm.

A. pilosella Grv. Lömischau, Löbau, 9.

Gattung: *Calliclistis* För.

C. hectica Grv. Löbau, 9.

Gattung: *Clystopyga* Grv.

C. incitator F. Rachlau unter Ahornrinde und ex *Pamene fimbriana* Thn. et *regiana* Z.

Gattung: *Conoblasta* För.

C. monocerus Grv. Quoos, Löbau, Reichenbach, 9.

C. caudata Thm. Bautzen, Kamenz, 8.

Gattung: *Collyria* Schröd.

C. puncticeps Thm. Überall im Gebiet ziemlich häufig, 5.—7.

Gattung: *Cryptopimpta* Taschb.

C. errabunda Grv. Bautzen, Rachlau, Rotstein, 5.—8.

Gattung: *Coleocentrus* Grv.

C. excitator Pd. Rotstein, Kottmar, 6.—8. Einzeln.

Gattung: *Echthrus* Grv.

E. reluctator L. Rachlau, Löbau, 6.

Gattung: *Ephialtes* Grv.

E. inanis Grv. 7. Caßlau und ex *Grapholitha gallicana* Gn. erzogen.

E. geniculatus Kri. ex *Carpocapsa pomonella* L.

E. extensor Tschk. Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten, 6.—9.

E. sanguinicollis Braun. Aus morschen Eichenästen geschlüpft.

E. mesocentrus Grv. 6.—10. Bautzen, Blösa, Sora, Lömischau, Holscha (Fr.).

E. manifestator F. 6.—10. Bautzen, Blösa, Löbau, Kottmar.

E. tuberculatus Fou. 6. 7. Löbau, Neudorf und Binnewitz (Fr.).

E. antefurcalis Thm. ex *Sesia cephiiformis* O.

E. gnathaulix Thm. 7. Kamenz, Gersdorf (Sch.).

E. carbonarius Chri. Bautzen, Rotstein, 6.

E. tenuiventris Hlm. Löbau, 6., et ex *Saperda populnea* erzogen.

Gattung: *Glypta* Grv.

G. haesiator Grv. ex *Olethreutes penthinana* Gn.*

G. resiniae Hlm. Verbreitet et ex *Evetria resinella* L., *Grapholitha grunertiana* Rtz. et *Graph. funebrana* Tr. erzogen.

G. flavolineata Grv. Gestreift Bautzen, Neudorf, Löbau, 7. 8., et ex *Cacoecia piceana* L. erzogen, von (Fr.) bei Hermsdorf, 8., gestreift.

- G. crassitarsis** Thm. ex *Ancylis Mitterbachiana* Schiff, et *Carpocapsa splendana* Hb.
G. nigricornis Thm. Bautzen, Blösa, Herrnhut, 6—8.
G. longicauda Hlm. Bautzen, Blösa, Sora, Göda, 6.—8.
G. filicornis Thm. ex *Evetria turionana* Hb.
G. vulnerator Grv. Neudorf, Kottmar, 5. 6.
G. rufipes Bri. Bautzen, Löbau, Blösa, auf Dolden einzeln, 8.

Gattung: **Lampronota** Hal.

- L. caligata** Grv. Neida, 7.
L. accusator F. (= *marginator* Schi.) Bautzen, Göda, 7.

Gattung: **Lissonota** Grv.

- L. melania** Hlm. ex *Grapholitha leguminana* Z.*
L. variabilis Hlm. Bautzen, Lömischau, Caßlau, 7.—9., et ex *Hyphantidium terebrellum* Zk. erzogen.
L. artemisiae Tschk. Bautzen, 4, 5.
L. gracilentata Hlm. Bautzen, 9.
L. transversa Brid. Gefangen: Bautzen, Rachlau, Rotstein, 7., et ex *Steganopticha Razteburgiana* Rtzb. gezüchtet.
L. angusta Tasch. Rachlau, 9., et ex *Tinea parasitella* Hb.
L. tenerrima Thm. Bautzen, Cosul, Lömischau, 7.—10.
L. deversor Grv. Bautzen, Guttau, Weißenberg et ex *Borkhausenia unitella* Hb. geschlüpft.
L. sulphurifera Gvr. mit var. *ruficoxis* Schr. Im Gebiet überall nicht selten, 5.—8.
L. commixta Hlm. Ebenso verbreitet wie vorige.
L. segmentator F. ex *Epiblema tedella* Cl. in Anzahl.
L. incruca Thm. Verbreitet und nicht selten, 6.—9.
L. dubia Hlm. Bautzen, aus morschen Eichenästen.
L. basalis Bri. mit Form *humerella* Hab. Verbreitet, et ex *Argyresthia illuminatella* Z., *A. certella* Z., *Hyphan. terebrellum* Zk. et *Zonosoma alternata* Fll. erzogen.
L. distincta Brid. Bautzen, Blösa et ex *Pamene gallicolana* Z.
L. clypealis Thm. ex *Tineola biselliella* Hum.
L. folii Thm. ex *Cinips quercus* Gallen.
L. paralella Grv. 6.—8. Verbreitet und nicht selten, ferner aus *Calophasia lunula* Hfn. (Fr.).
L. uncinata Hlm. Bautzen, 6. 7.
L. lineata Grv. Lömischau, 7.
L. cylindrator Vill. Im Gebiet verbreitet und nicht selten. 6.—9.
L. fundator Thm. var. *nigricosa* Pfk. Bautzen, 7.
L. incerta Hab. ex *Amphisbatis incongruella* Z. Lömischau, 8.
L. clypeator Grv. Verbreitet und nicht selten. 6.—8.
L. bellator Grv. Wie vorige mit var. ohne Scheitelpunkte und var. mit schwarzen Hinterschenkeln.
L. palpalis Thm. 7.—9. Bautzen, Löbau, Stromberg.
L. insignata Grv. 7.—9. Verbreitet und nicht selten im ganzen Gebiet.
L. saxonica Schm. ex *Dioryctria abietella* F.

Gattung: **Meniscus** Schiö.

M. impressifrons Thm. 7. Sora.

M. impressor Grv. 7.—9. Rachlau, Löbau, Bernstadt.

M. catenator Grv. 5.—8. Bautzen, Löbau, Rotstein, Rachlau.

M. bilineatus Grv. mit var. **impressor** Ztt. Bautzen, Lömischau und aus *Sesia formicaeformis* Esp. erzogen.

M. piceator Thm. Rachlau, 6.

Gattung: **Odontomerus** Grv.

O. pinetorum Grv. 7. 8. Neudorf, Lömischau.

Gattung: **Phaenolobus** För.

P. fulvicornis Grv. Bautzen, Kottmar, 6. 7.

Gattung: **Phytodietus** Grv.

P. coryphaeus Grv. Bautzen, Rachlau, 5.

P. segmentator Grv. 5. 6. 7. Stromberg, Rotstein et ex *Ancylis upupana* Tr., *Grapholitha zebeana* Rtzb., *Ancyl. Mitterbachiana* Schiff. et *Acalla ferrugana* Tr. erzogen.

Gattung: **Pimpla** F.

P. instigator F. 5.—10. Verbreitet und nicht selten und ex *Lymantria monacha* L. von H. Kramer erzogen.

P. rufata Grv. 5.—10., mit var. **pectoralis** Ulb. et var. 1 Grv. Überall nicht selten, von H. Kramer ex Nonnenpuppen und von mir ex *Tortrix viridana* L. erhalten.

P. brassicae Pod. 5.—10. Im Gebiet überall nicht selten.

P. stercorator F. Von H. Kramer ex *Lymantria monacha*-Puppen. Von mir ex *Nonacria sparganii* Esp. und zahlreich aus *Euproctis chrysorrhoea* erzogen, letzter Wirt scheint ein bevorzugter zu sein.

P. varicornis F. Blösa, Sora, 8., v. H. Kramer, Niederoderwitz, aus *Lymantria*-Puppen, Oybin.

P. ornatus Grv. Rachlau, Löbau, 6. 7.*

P. examiner F., 5.—10. Mit var. 1, 2 und 3 Grv. Verbreitet und nicht selten, ebenso var. **rufoenulus** Hlm., von H. Kramer aus Nonnenpuppen von mir aus *Abraxas grosulariata* L. erhalten.

P. maculator F. Häufig und aus *Tortrix viridana* L. erzogen.

P. concors Kri. Löbau, 8.

P. spuria Grv. 6.—8. Bautzen, und aus in Pilzen lebenden Larven.

P. ventricosa Tschk. ex *Carpocapsa splendana* et *Lipara lucens* Mg.

P. affinis Hab. Bautzen, Rachlau, Rotstein, 5.—7.

P. Holmgreni Schrk. Bautzen, Caßlau, 7.

P. Bermuthi Hlm. Bautzen, Neudorf, Sdier, Blösa, 6.—9.

P. variabilis Hlm. Bautzen, Rotstein, 7.

P. lativentris Ulb. Göda, Rachlau, 7. 8.

P. turionellae L. mit var. 1 Grv. Verbreitet und nicht selten.

P. arundinator F. 6.—10. Verbreitet und aus *Depressaria heracleana* De Ger., *Grapholitha discretana* Wck. et *Dioryctria mutata* Fuchs. erzogen.

- P. arundi* var. *similis* Bri. Ebenso verbreitet und aus *Grapholita discretana* Wck., *Tephritis* Spc. et *Carpotricha pupillata* Fll. erzogen.
- P. brunea* Bri. ex *Grapholitha cosmophorana* Tr.
- P. vesicaria* Rtzb., 9., Rachlau und aus Blattwespen spc.
- P. alternans* Grv. ex *Coleophora flavipennella* H. S. Bautzen, Rachlau, 6.—9.
- P. terebrana* Rtzb. ex *Argyresthia laevigatella* H. S.
- P. nigriscaposa* Thm. ex *Simaethis pariana* Cl. Sonst verbreitet, 6.—8.
- P. oculatoria* F. 6.—10. Bautzen, Blösa, Neudorf und aus Spinneneiern.
- P. pomorum* Rtzb. ex *Simaethis pariana* Cl., *Lithocolletis viminetorum* Stt. et *Heydenia profugella* Stt.
- P. triangularis* Verh. 5.—7. Bautzen, Radibor, Rotstein, erzogen aus *Evetria buoliana* Siff., *Conchylis posterana* Z. et *Aristotelia brizella* Tr.
- P. brevicornis* Grv. mit var. 1 Hlm, 3 et 4 Bri. Verbreitet, 4.—10., und aus *Aristotelia brizella* Tr., *Aanacampsis biformella* Schütze, *Evetria turionana* Hb., *Lita maculea* Hw., *Conchylis posterana* Z. et *Trypeta cylindria* R. D. erzogen.
- P. sagags* Htg. ex *Grapholitha cosmophorana* Tr., *Tinea lapella* Hb. et *Blasotagna putripennella* Z., von (F.) ex *Tinea granella* erzogen.
- P. calobata* Grv. 4.—10. Im Gebiet verbreitet und nicht selten. Gezüchtet ex *Lithocolletis stettinensis* Nic. *Eulia politana* Hw. *Pamene gallicolana* Z. *Coleophora ahenella* Hein. *Epiblema subocellana* Don. et *Rhinusa tetrum* L.
- P. capulivera* Kri. ex Spinneneiern.
- P. viduata* Grv. ex *Aristotelia brizella* Tr. erhalten.
- P. angens* Grv. 4.—10. Verbreitet et ex *Grapholitha cosmophorana* Tr. et *Tinea lapella* Hb. Gestreift um Bautzen, Löbau, Kamenz (Sch.).
- P. inquisitor* Scp. 5.—10. Überall verbreitet und aus *Olethreutes siderana* Tr. et *Grapholitha pallifrontana* Z. gezüchtet.
- P. detrita* Hlm. ex *Lipara tomentosa* Macq. und gestreift um Bautzen, Löbau, Bernstadt, Zittau, 5. 7. 10. Forma *nigricoxa* Ulb. ex *Dioryctria mutarella* Fuchs.
- P. nucum* Rtzb. Bautzen, 6., et ex *Carpocapsa splendana* Hb. erhalten.
- P. morleyi* Schm. ex *Conchylis posterana* Z.
- P. padellae* Torka. = *examinator* F. var. 1 Grv. *Acrobasia consociella* Hb. Gefangen um Bautzen und Löbau, 7. 8.
- P. curticauda* Kri. 5.—8. Rachlau, Neschwitz.
- P. 4-dentata* Grv. 6.—10. Bautzen, Göda, Neudorf, Königswartha.
- P. flavicoxis* Thm. 6.—9. Bautzen, Neida, Klix, Lömischau.

Gattung: **Perithous** Hlm.

- P. mediator* F. 6.—9. Verbreitet und aus *Trypoxilon figulus* L. erzogen.
- P. albicinctus* Grv. 8. Löbau.

Gattung: **Polysphincta** Grv.

- P. multicolor* Grv. 7.—9. Bautzen, Löbau, Quoos, Königswartha.
- P. gracilis* Hlm. Bautzen, 7. 9.

Gattung: **Rhyssa** Grv.

- R. persuasoria* L. 6.—10. Vorwiegend in Bergwäldern verbreitet.

Gattung: **Schizopyga** Grv.

S. podagrica Grv. 7. Caßlau.

Gattung: **Stilbops** För.

St. vetula Grv. 5.—7. Bautzen, Göda, Neschwitz.

Gattung: **Taschenbergia** Schm.

T. modesta Grv. Bautzen, 4. und aus unbekannter Lepidopteren-Larve.

Gattung: **Theronia** Hlm.

T. atalantae Pod. ex Lymantria monacha L. (Kramer) Niederoderwitz.

Gattung: **Tropistes** Grv.

T. rufipes Kri. var. *nigriventris* Kri. Bautzen, 6.

Gattung: **Xylonomus** Grv.

X. brachylabris Kri. Löbau, 6.

Gattung: **Xorides** Latr.

X. praecatorius F. Löbau, 6., und aus Käferlarven spc. Rachlau.

4. Unterfamilie **Ophioninae**.

Gattung: **Angitia** Hlm.

A. tenuipes Thm. ex *Mompha fulvescens* Hw. et *Anacampsis biformella* Sch.

A. gibbula Bri. 9. 10. Rachlau, Löbau und aus Dipteren-Larven.*

A. fenestralis Hlm. Verbreitet 5.—9. et ex *Heliodines roesella* L., *Epermenia illigerella* Hb. et *Epiblema immundana* FR. erzogen.

A. rufipes Grv. ex *Lita vicinella* Dgl., *Cacoecia rosana* L. et *Nephoterix hostilis* Sthp. gezüchtet.

A. tibialis Grv. ex *Epiblema demarniana* F., *Argyresthia abdominalis* Z. et *Dizigomyza bimaculata* Mg.

A. vestigialis Rtzb. Bautzen, 10.

A. armillata Grv. Verbreitet 5.—9. et ex *Glyphipterix Forsterella* F. *Coleophora palliatella* Zk. et *Yponomeuta malinellus* Z.

A. truncata Hlm. Aus morschen Eichenästen, 6.

A. ruficornis Bri. Göda, 7.

A. trochanterata Thm. 5.—10. Verbreitet, Bautzen, Bernstadt, Löbau, Lömischau, Neudorf, Neschwitz.

A. interrupta Hlm. Löbau, 8.

A. chrysocticta Grv. 5.—7. Bautzen, Neudorf und aus *Lipara Lucens* L., *Plutella maculipennis* Ct. et *Lita viscerella* Dgl.

A. subbuccata Thm. ex *Glyphipterix Forsterella* F. *Elachista cerusella* Hb. und aus in morschem Eichenholz lebenden Larven.

A. cerophaga Grv. ex *Coleophora artemisicolella* Brd. und ebenfalls aus morschem Eichenholz.

A. varians Bri. ex *Ancylis siculana* Hb., *Epichnopterix pulla* Esp. et *Epiblema tedella* Cl.

A. majalis Grv. Lömischau, 8.

A. confracta Bri. 6.—8. Bautzen, Rachlau, Rotstein.

- A. areolaris** Hlm. ex *Euclidia glyphica* L., gestreift, Bautzen, Quoos.
A. annulierus Thm. Bautzen, 6.
A. insectator Schrk. Bautzen, an einer Glasveranda, 8.
A. pulchella Hlm. Bautzen, 9., am selben Ort.
A. gracilis Grv. Wie vorige.

Gattung: **Absyrtus** Hlmg.

- A. luteus** Hlm. Im Gebiet verbreitet und nicht selten, 4.—9.

Gattung: **Adelocnathus** Hlm.

- A. pallipes** Grv. Bautzen, Löbau, 9.

Gattung: **Agrypon** För.

- A. flaveolatum** Grv. ex *Pamene fimbriana* Hw., *Carpocapsa pomonella* L.,
Acrobasia consociella Hb. et *Epiblema tetraquetra* Hw.
A. varietorum Wes. 4.—7. Bautzen, Löbau (F.), Göda et ex *Tortrix viridana* L. et *Calimorpha dominula* L.
A. brevicollis Wes. Löbau, 6.
A. septentrionale Hlm. Bautzen, Löbau, 5. et ex *Cacoecia rosana* L.

Gattung: **Aneuclis** För.

- A. peticolaris** Sz. Bautzen, 10.

Gattung: **Anilastus** För.

- A. tricinctus** Hlm. 6.—8. Bautzen, Königswartha.
A. clausus Bri. Bautzen, 7.
A. ruficinctus Grv. Bautzen und aus *Geometra* spc.
A. dulosus Grv. Lömischau, 9.
A. coxalis Bri. 5. Bautzen, Rachlau et aus *Agrostis strigula* Thn. erzogen.
A. vulgaris Tschk. 6.—9. Bautzen, Sora, Weifa.

Gattung: **Anomalon** Jur.

- A. cerinops** Grv. 7.—10. Bautzen Caßlau, Neschwitz, Kleinsaubernitz.

Gattung: **Aphanistes** För.

- A. ruficornis** Grv. 7.—9. Rachlau, Lömischau, Baruth, Großschweidnitz und
aus *Hiloicus pinastri* L. (Wadewitz).

Gattung: **Astiphromma** För.

- A. pictum** Bri. Bautzen, Rachlau, 6.
A. mandibulare Thm. Bautzen, Rotstein, Kottmar, 5. 6.
A. striatum Bri. ex *Gelechia tragicella* Hyd.
A. simplex Thm. Bautzen, 9.
A. hamulus Thm. Rotstein, 7.
A. strenuum Hlm. Bautzen, 5.

Gattung: **Banchus** F.

- B. falcatorius** F. Strahwalde, 7. (Fr.).

Gattung: **Barylipa** För.

- B. insidiator** För. ex *Anarta myrtilli* L.

Gattung: **Biolyisia** Schm.

B. marginella Thm. 4. Bautzen, Niedergurig.

Gattung: **Blaptocampus** Thm.

B. canaliculatum Hlm. Rachlau, 7. 10.

Gattung: **Campoplex** Grv.

- C. falcator** F. Bautzen, Neusalza-Spremberg (K).
C. splendens Thm. 5. 6. Bautzen, Blösa, Hochkirch.
C. bucculentus Hlm. Rachlau, Großhennersdorf, 5.—7., Strahwalde (Fr.).
C. pugillator För. 5. 6. Bautzen, Löbau.
C. atjunctus För. 5.—8. Verbreitet und nicht selten.
C. nitidulator Hlm. 8. Bautzen.
C. transversostriatus Schm. Bautzen, 6.
C. aversus För. Bautzen, 7.
C. angustatus Thm. 7.—9. Im Gebiet verbreitet.
C. subaequalis För. Wie vorige verbreitet.
C. genalis Thm. Gleina, 7.
C. anxius För. Litten, 6.

Gattung: **Canidia** Hlm.

- C. trochantella** Thm. ex *Coleophora hemerobiella* Sep.
C. quinqueangularis Bri. Bautzen, 6. aus morschem Eichenholz.
C. exigua Grv. Bautzen, 5.

Gattung: **Casinaria** Hlm.

- C. ischnogaster** Hlm. 6.—8. Im Gebiet verbreitet.
C. orbitalis Grv. 7.—9. Bautzen, Lömischau, Löbau, Rotstein, Kottmar.
C. varians Tschk. 6.—9. Fundorte wie bei voriger Art.
C. protensa Grv. Lausche, 7.
C. scabra Thm. 6. Bautzen.
C. tenuiventris Grv. 6. Blösa.
C. moxita Grv. ex *Hibernia defoliaria* Cl.

Gattung: **Cratophion** Thm.

- C. angustipennis** Hlm. 7.—9. Bautzen, Neida, Caßlau.
C. gravipes Grv. 5.—7. Verbreitet, im Herbst die Männchen häufig auf den Dolden von *Heracleum sphondilium*.

Gattung: **Cremastus** Grv.

- C. infirmus** Grv. 7. Rachlau.
C. peritus Sz. 6.—8. Bautzen, Commerau, Königswartha.
C. lucidus Szpl. 6. Rotstein.
C. interruptor Grv. ex *Steganopticha Ratzeburgiana* Rtzb.
C. signatus Hlm. 8. Neudorf.

Gattung: **Cymodusa** Hlm.

- C. cruentata** Grv. 5. Bautzen.
C. leucocera Hlm. Die Männchen überall häufig, die Weibchen selten. 9. 10.
C. antenator Hlm. 8. Neudorf.

Gattung: **Diadegma** För.

D. crassicornis Grv. 6.—8. Bautzen, Rachlau, Löbau, Rotstein.

Gattung: **Dialipsis** För.

D. crassipes Thm. 6. Bautzen.

Gattung: **Diocetes** För.

D. melanius Thm. ex *Acrolepia pygmaeana* Hw. et *Elachista cerusella* Hb.

D. Elishai Bri. ex *Tischeria complanella* Hb.

D. apostata Grv. 6.—9. Neschwitz, Sora, Niedergurig.

Gattung: **Echthronomus** För.

E. ochrostoma Hlm. Bautzen, 7.

Gattung: **Ericospilus** Stph.

E. repentinus Hlm. mit var. **tournicri** Vol. ex *Sesia cepiformis* O.

E. merdarius Grv. 9. Rachlau.

Gattung: **Entelechia** För.

E. suspiciosa För. 9. Bautzen, an Glasveranda.

Gattung: **Entypoma** För.

E. robustum För. Bautzen, 9., mit voriger Art.

Gattung: **Elimneria** Schm.

E. xanthostoma Grv. Bautzen, Löbau, 6.

E. fuscicarpus Thm. 7. Göda, Kubschütz.

E. rufifemur Thm. 5. Bautzen, Rachlau.

E. juniferina Hlm. 6. Rotstein.

Gattung: **Eriborus** För.

E. braccatus Com. 7. Niedergurig.

Gattung: **Erigorgus** För.

E. leucopus Szep. 9. Neschwitz, Luga.

Gattung: **Exetastes** Grv.

E. formicator F. ex *Cucullia lactucae* Esp. und verbreitet auf Dolden, 6.—8.

E. cinctipes Rtz. 6. Bautzen, Sora.

E. laevigator Vill. mit voriger.

E. guttatorius Grv. 7. 8. Blösa, Cosul (Fr.), Strahwalde.

E. robustus Grv. Cosul, Pielitz, 7.

E. flavitarsus Grv. 6. Commerau.

E. illusor Grv. 6.—8. Verbreitet einzeln.

Gattung: **Gnathochorisis** För.

G. flavipes För. 5.—6. Bautzen, Blösa, Löbau.

Gattung: **Helictes** Hal.

H. mediator Schiö. 9. 10. Bautzen, Lömischau.

H. erythrostroma Grv. Bautzen, 9.

H. autumnalis För. 10. Neudorf.

Gattung: **Holocremna** Thm.

H. argentata Grv. ex *Orgya gonostigma* F.

H. hyalinatus Hlm. 9. Bautzen.

Gattung: **Heteropelma** Wsm.

H. calicator Wsm. 7.—9. Bautzen, Cosul, Rotstein.

Gattung: **Isurgus** För.

I. monticula Thm. 5. Bautzen.

Gattung: **Labrorychus** För.

L. clandestinus Grv. ex *Eupithecia veratraria* H. S., gestreift bei Neudorf, 5.

Gattung: **Leptopygus** Thm.

L. harpurus Schk. 6.—9. Verbreitet und nicht selten.

Gattung: **Megastylus** Schiö.

M. cruentator Schiö. 8. 9. 10. Bautzen, Rachlau, Lömischau.

Gattung: **Meloboris** Thm.

M. ischnocera Thm. 8. Bautzen.

Gattung: **Mesochorus** Grv.

M. velox Hlm. 6. Bautzen.

M. vittator Ztt. 6. Göda (F.).

M. anomalus Hlm. ex *Dicranura vinula* L.

M. pallidus Bri. ex *Epermenia chaerophyllella* Götze, *Simaethis paariana* Cl., *Porthesa similis* Fue. et *Swammerdamia heroldella* Tr., sonst verbreitet, 7.—10.

M. confusius Hlm. 7. Bautzen, Gröditz.

M. vulgurans Curt. 7.—9. Bautzen, Gaußig, Spritzwitz.

M. vitticollis Hlm. mit var. 1 Bri. ex *Epiblema demarniana* F., gestreift bei Bautzen, Löbau, Rotstein, Bernstadt, 5. 6.

M. nigriceps Thm. 5. Bautzen.

M. temporalis Thm. Neschwitz, Caßlau, 10.

M. brevipeticolatus Rtz. Bautzen, 8.

M. pectoralis Rtz. 9. Bautzen.

Gattung: **Nemeritis** Hlm.

N. macrocenta Grv. ex *Acrobasis consociella* Hb.

N. raphidiae Kri. 7. 8. Bautzen, Neudorf.

N. canescens Grv. ex *Ephestia kuehniella* Z. In Vorratsräumen selten.

N. candata Thm. 5.—10. Bautzen, Löbau, Rotstein.

Gattung: **Ophion** F.

O. distans Thm. 5.—9. Verbreitet und häufig im ganzen Gebiet, und aus *Carpocapsa pomonella* L. erzogen.

O. scutellaris Thm. Vom 3. Im Gebiet selten.

O. ventricosus Grv. Verbreitet, 5. 6.

O. longigena Thm. 6. Bautzen, von (Gl.) Niedercunnersdorf, aus Raupen spc.

- O. obscurus* F. 4.—7. Im Gebiet verbreitet.
O. minutus Kri. 5—7. Bautzen, Löbau, Niedergurig (Fr.).
O. luteus L. 4. 5. Bautzen, Gersdorf, Schmidt. 8.

Gattung: **Opheltes** Hlm.

- O. glaucopterus* L. Rachlau, 7.

Gattung: **Olesicampa** För.

- O. acuta* Grv. ex Tenthrediniden-Larve.

Gattung: **Omorgus** Thm.

- O. mutabilis* Hlm. ex Grapholitha Zebeana Rtz. et Pamene regiana Z., gestreift bei Bautzen und Rachlau, 6.
O. ruficoxa Thm. Bautzen, 9.
O. difformis Gm. ex Gelechia tragicella Hyd., Pamene fimbiana Hw., bei Neudorf, 6., gestreift.
O. ovatus Bri. 6.—8. Verbreitet, var. **atramentarius** Schm. ex *Depressaria costosa* Hw. erzogen.
O. multicinctus Grv. 5.—7. Bautzen, Rachlau, Niedergurig.
O. picticus Thm. ex *Tortrix conwayana* F. et *Tor. Bergmanniana* L.
O. scaposus Thm. 5. Bautzen.
O. Rothi Hlm. 7. 8. Cunewalde, Gröditz.
O. ferinus Hlm. Bautzen, 6.
O. borealis Ztt. 5. Göda,

Gattung: **Orthopelma** Taschb.

- O. luteolator* Grv. ex *Rhodites rosae* L. Nicht selten.

Gattung: **Parabatus** Thm.

- P. latungula* Thm. Im Gebiet verbreitet und nicht selten.
P. cristatus Thm. 5. 6. Bautzen, Kottmar.
P. virgatus Fou. Rachlau, 7.
P. nigricarpus Thm. Rachlau, 5.

Gattung: **Paracremastus** Szpl.

- P. genealis* Sz. 5. Bautzen.

Gattung: **Paniscus** Grv.

- P. testaceus* Grv. 8. Bautzen.
P. opaculus Thm. Überall nicht selten, 6.—9.
P. cephalotes Hlm. 5.—9. Bautzen, Löbau, Gersdorf (Sch.).
P. ocellaris Thm. 6. Bautzen, Schleifberg.

Gattung: **Phaedroctonus** För.

- P. cremastoides* Hlm. 6. Bautzen.
P. transugus Grv. ex *Mesia argentimaculella* Stt., *Coleoph. nigricella* Sph. et *Epiblema tedella* Cl.

Gattung: **Plectiscus** Grv.

- P. crassicornis* För. 10. Bautzen.
P. communis För. 9. 10. Bautzen, Lömischau.
P. collaris Grv. 9. Rachlau, Schleifberg.

Gattung: **Proclitus** För.

- P. macrorus** För. 9. Bautzen.
P. grandis För. 6.—9. Bautzen, Rachlau, Rotstein.
P. autumnalis För. Bautzen, an Glasveranda, 9. 10.
P. mesoxanthus För. Rachlau, Quoos, Lömischau, Halbendorf, 8.—10.

Gattung: **Pristomerus** Grv.

- P. vulnerator** Pz. Verbreitet und nicht selten. Weitere Wirte sind außer den von Schütze vermerkten: *Grapholitha funebrana* Tr., *Cladius pectinicornis* Geoffr. et *Carpocpsa pomonella* L.*

Gattung: **Pseudocre mastus** Szpl.

- P. radialis** Sc. 6. Bautzen.

Gattung: **Prolictes** För.

- P. inquisetus** För. 6. Bautzen.

Gattung: **Pyracmon** Hlm.

- P. xoridiformis** Hlm. 7. Caßlau.

Gattung: **Sagaritis** Hlm.

- S. anulata** Grv, ex *Coloph. solitariella* Z.
S. zonata Grv, ex *Eupithe. sobrinata* Hb. et *Cacoecia rosana* L., sonst verbreitet, 6.—9.
S. marginella Thm, 8. Bautzen.
S. latrator Grv. Im Gebiet verbreitet, 5.—8., et ex *Grapholitha cosmophorana* Tr., erhalten.
S. femoralis Grv. 8. Bautzen.
S. erythropus Thm. 7. Caßlau et ex *Pyrausta nubilalis* Hb. erzogen.
S. Holmgreni Tschk. 8. Bautzen.
S. crassicornis Tschk. 5.—7. Bautzen, Göda, Rachlau, Löbau.

Gattung: **Schizoloma** Nes.

- S. capitatum** Des. ex *Mamestra nebulosa* Hfn.
S. amictum F. ex *Dendrolimus pini* L.

Gattung: **Spudastica** För.

- S. Kriechbaumeri** Brd. 5. Bautzen.

Gattung: **Stictopisthus** Thm.

- S. formosus** Bri. 9. et ex *Lithocolletis Lantanella* Schrk.

Gattung: **Thersilochus** Hlm.

- T. truncorum** Hlm. ex *Urophora quadrifasciata* Mg. und Pilzbewohnern.
T. parviceps Sc. Lömischau, 5.
T. gibbus Hlm. 5. Bautzen.
T. jucator F. 5. Bautzen.
T. triangularis Grv. 6. Sora.
T. candatus Hlm. ex *Lema erichsoni* Stt.

Gattung: **Trichomma** Wsm.

T. enecator Ross. ex *Dioryctria abietella* F. et *Platypara poeciloptera* Schk.

T. fulvidens Wes. 5. 6. Lomske, Niedergurig (Fr.).

Gattung: **Xenoschesis** För.

X. fulvipes Grv. 5.—8. Bautzen, Rachlau, Neudorf, Löbau.

5. Unterfamilie **Triphoninae**.

Gattung: **Acrotomus** Hlm.

A. sexcinctus Grv. 5. Bautzen, Klix.

A. laticeps Grv. 5. Bautzen.

Gattung: **Alexeter** För.

A. sectator Thm. 9. Quoos, Neschwitz.

A. niger Grv. 6. Bautzen.

A. fallax Hlm. 6.—9. Bautzen, Löbau, Lömischau.

A. incospicuus Schmidt. 6. Rotstein.

A. ropinator Grv. 9. Bautzen.

Gattung: **Anisoctenion** For.

A. alacer Grv. 9. Lömischau.

Gattung: **Barytarbes** För.

B. adproquinquator Grv. 6. 7. Bautzen, Caßlau, Mönau.

Gattung: **Bassus** F.

B. laetatorius F. mit var. 1 und 2. Verbreitet und nicht selten.

B. tricinctus Grv. Überall wie vorige und ex Dipteren spc.

Gattung: **Catoglyptus** Hlm.

C. forticeps Grv. 4.—7. Bautzen, Sora, Löbau, Schönau.

Gattung: **Colpotrochia** Hlm.

C. elegantula Schrk. 8. Neudorf.

Gattung: **Cosmoconus**.

C. elongator F. 6.—9. Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten.

Gattung: **Cteniscus** Hal.

C. umbellatorium Weid. 8. 9. Bautzen, Löbau, Herrnhut.

C. xanthoxanthus Grv. 5. Göda.

Gattung: **Diabora** För.

D. literatorius Grv. 7. Göda.

Gattung: **Dyspetes** För.

D. praerogator L. Nicht selten. Fundorte sind: Bautzen, Blösa, Sora, Neudorf, Rotstein, Löbau.

D. fundator Thm. var. *nigricoxis* Pfk. 6. Sora, Uhyst a. T.

Gattung: **Eclytus** Hlm.

E. ornatus Hlm. 6. Bautzen.

Gattung: **Eromenus** Hlm.

E. calcator Müll. 7. Löbau.

E. frenator Grv. 6. Bautzen, Rachlau.

E. zonarius Grv. 6.—9. Quoos, Sora, Göda, Blösa, Großpostwitz.

Gattung: **Euryproctus** Hlm.

E. mundus Grv. 5. Bautzen, Radibor.

Gattung: **Exenterus** Hlm.

E. marginatorius F. ex *Lophyrus pini* L.

E. adpersus Hart. ex *Lophyrus Pini* L.

E. cingulatoria Hlm. 8. Rachlau.

Gattung: **Exochus** Grv.

E. albicinctus Hlm. 7. Bautzen.

E. fasciatus Strob. 7. Göda.

E. pictus Hlm. 9. Neschwitz.

E. consimilis Hlm. 9. Rachlau.

E. erythronotus Grv. ex *Acalla Ferrugana* Tr.

E. incidens Thm. 6.—9. Bautzen, Blösa, Kamenz.

E. gravipes Grv. 6. Bautzen, Commerau, Hermsdorf.

E. flavomarginatus Hlm. Strahwalde (Fr.).

E. turgidus Hlm. ex *Dioryctria abietella* F.

Gattung: **Exyston** Hlm.

E. triangulatorius Hlm. 6.—8. Neudorf, Neschwitz, Kamenz.

E. carinatus Hlm. 8. 9. Blösa, Göda, Neudorf, Lömischau.

E. cinctulus Grv. 7. 8. Bautzen, Blösa, Weißenberg.

Gattung: **Hadrodactylus** För.

H. typhae Grv. mit var. **femoratus** Hlm. Verbreitet, aber einzeln.

H. fugax Grv. 5.—7. Bautzen, Litten, Purschwitz mehrfach gestreift.

H. varicoxa Thm. 9. Bautzen.

H. confusus Hlm. 6. Bautzen, Löbau.

Gattung: **Homocidus**.

H. pectoratorius Grv. ex Blattwespenlarven, gefangen bei Göda, 7.

H. longipes Hlm. 6. Bautzen.

H. eximus Hlm. 7. Bautzen und aus Blattwespen spc.

H. dimidiatus Schrk. 7. Rachlau.

H. tarsatorius Pz. 5.—7. Überall nicht selten.

H. obscuripes Hlm. 7. Kauppa.

H. nigratarsis Grv. 6.—8. Bautzen, Sora.

H. pictus Grv. 9. Bautzen.

H. elegans Grv. 8. 9. Bautzen, Quoos, Löbau, Zittau.

Gattung: **Idotrichus** Schmk.

I. sericeus Bri. 5. Bautzen.

Gattung: **Ipoctonus** För.

I. atomator Müll. 9. Litten.

Gattung: **Lagarotis** För.

L. debitor Thm. 8. 9. Rachlau, Lömischau, Löbau.

L. semicalicatus Grv. 9. Rachlau.

Gattung: **Lamachus** För.

L. marginatus Bri. ex Lophyrus pini L.

Gattung: **Lathrolestes** För.

L. bipunctatus Bri. ex Elachista Poae Stt.

L. marginatus Thm. 9. Bautzen.

L. citrofrontalis Schmk. 6. Bautzen.

Gattung: **Mesoleius** Hlm.

M. aulicus Grv. 6. Löbau.

M. tibialis Hlm. 5.—7. Löbau, Göda, Sora.

M. aemulus Hlm. 5. 6. Bautzen, Kauppa.

M. Holmgreni Schmk. 6. Bautzen, Blösa.

M. segmentator Hlm. ex Dioryctria abietella F., gefangen Quoos, Rachlau, Rotstein. 7.—10.

M. melanoleucus Grv. 9. Quoos.

M. multicolor Grv. 5. Radibor.

M. nigridens Thm. 5. Bautzen.

M. armillatorius Grv. 6. Rachlau, Blösa.

M. trochanteratus Thm. 7. Rachlau, Löbau.

M. napaeus Hlm. 7. Göda.

M. incidens Thm. 6. Sora.

M. flavoguttatus Grv. 8. 9. Rachlau.

M. formosus Grv. 8. Bautzen.

Gattung: **Mesoleptus** Grv.

M. cingulatus Grv. ex Ancyliis mitterbachiana Schff. et Lophyrus.

M. amoenus Hlm. ex Carpocapsa splendana Hb., Epiblema nigricana H. S. et Acalla ferrugana Tr.

M. stali Hlm. ex Ancyliis upupana Tr.

M. bipunctatus Grv. 6. Bautzen.

M. similis Bri. 6. Löbau.

Gattung: **Metacoelus** Hlm.

M. mansuetor Grv. ex Aristotelia ericinella Dup. et Coleophora nigricella Stph.

Gattung: **Metopius** Pz.

M. dentatus F. ex Geometra sp.

Gattung: **Microplectron** För.

M. quinquecinctus Grv. 6. Bautzen, Rotstein.

M. jucundus Hlm. 7. Rachlau.

Gattung: **Monoblastus** Hlm.

- M. neustriæ** Schmk. 6. Bautzen.
M. chrysopus Grv. 6.—9. Löbau, Lömischau.
M. extirpatorius Grv., 8. Neida.

Gattung: **Neleges** För.

- N. proclitor** Grv. 6. Rachlau.

Gattung: **Orthocentrus** Grv.

- O. fulvipes** Grv. 9,10. Bautzen.
O. radialis Thm. ex *Tinea lapella* Hb. et Dipteren, Larve.
O. peticularis Thm. 9. Bautzen.
O. sannio Hlm. 8. Sora.
O. stigmaticus Hlm. 9. Bautzen.

Gattung: **Otlophorus** För.

- O. pictus** Pfk. 6. Bautzen.

Gattung: **Otoblastus** För.

- O. luteomarginatus** Grv. 6. Blösa.

Gattung: **Pantorhaestes**.

- P. xanthostomus** Grv. var. 1. Bautzen, 5.

Gattung: **Perilissus** För.

- P. pictilis** Hlm. Rachlau.
P. filicornis Grv. Mit var. **seminiger** Grv. Verbreitet.
P. rufoniger Grv. 5.—8. Überall häufig.
P. cinctus Hlm. 5.—7. Verbreitet und nicht selten.
P. pallidus Grv. ex *Cacoecia rosana*.
P. coxalis Thm. 6. Bautzen.
P. subcinctus Hlm. 6.7. Bautzen, Sora.
P. luteolator Grv. 8. Bautzen.
P. orbitalis Grv. 6. Bautzen.
P. Holmgreni Habm. 9. Lömischau.

Gattung: **Polycinetis** För.

- P. resplendens** Hlm. 6. Bautzen.

Gattung: **Polyblastus** Hlm.

- P. validicornis** Bri. 7. Lömischau.
P. pastoralis Grv. mit var. **rivalis** Hlm. 6.—10. Bautzen, Lömischau, Neschwitz, Niedergurig.
P. strobilator Thm. mit var. **nigrifemur** Ulb. 7.9. Verbreitet.
P. longiceps Strb. 7. Bautzen.
P. proquinquus Grv. 6. Rotstein, Neschwitz.
P. arcuatus Hlm. mit var. **marginatus** Hlm. 5. Rachlau, Sora.
P. vestringii Hlm. 6.7. Sora, Rotstein.
P. melanurus Thm. 6. Sora.
P. sphaerocephalus Grv. 7. Neudorf.

P. Wahlbergi Hlm. 7. Göda.
P. melanostigmus Hlm. 6. Bautzen.

Gattung: **Prosmorus** För.

P. rufinus Grv. 7.—8. Rachlau.

Gattung: **Prionopoda** Hlm.

P. stictica F. 7. Rachlau, Göda.

P. xanthospana Grv. 7. Bautzen.

Gattung: **Promethes** För.

P. pulchellus Hlm. 6. Neschwitz.

P. festivus F. 6. Gleina und aus *Dizygomyza bimaculata* Mg.

P. suticator Grv. 6.—9. Verbreitet.

P. scutellaris Bri. Bautzen, Neschwitz, 6.—8.

P. laticarpus Thm. 7.—9. Bautzen, Lömischau.

Gattung: **Prosmorus** För.

P. rufinus Grv. 7. Rachlau.

Gattung: **Protarchus** För.

P. melanurus Thm. 7. Rachlau.

Gattung: **Scopesus** För.

S. rubrotinctus Schm. 8. Blösa.

Gattung: **Stiphrosomus** För.

S. ambulator Thm. 5.—7. Bautzen, Rachlau.

S. antilope Grv. 5.—7. Bautzen, Löbau.

Gattung: **Stenomacrus** Thm.

S. ochropis Hlm. 6. Bautzen.

S. merula Grv. ex *Cynips quercus* sp.

Gattung: **Sychnoleter** För.

S. geniculosus Grv. 7. Reichenbach.

Gattung: **Synomelix** För.

S. albipes Grv. 6. Bautzen.

S. Kriechbaumeri Schm. 8. Sora.

Gattung: **Synotides** För.

S. notatus Grv. 6. 7. Bautzen, Caßlau.

Gattung: **Triclistus** För.

T. podagricus Grv. 5.—9. Bautzen, Sora, Dahren (F.).

Gattung: **Trematopygus** Hlm.

T. scabriculus Grv. 6. Rachlau.

T. erythropalpus Grv. 5. Bautzen.

T. licator Thnb. 5. Bautzen, Göda.

T. lethierryi Thm. 5. Bautzen.

Gattung: **Tricampus** För.

T. anarius Grv. 5. 6. Bautzen.

Gattung: **Tryphon** Grv.

T. bruneiventris Grv. 7.—9. Bautzen, Rachlau, und aus *Tortrix viridana*.

T. rutilator L. 5.—7. Im Gebiet verbreitet und nicht selten.

T. erythrogaster Thm. Ebenso nicht selten.

T. pleuralis Thm. Wie vorige.

T. signator Grv. Fast noch zahlreicher wie vorige.

T. incestus Hlm. Ebenfalls im ganzen Gebiet nicht selten.

T. trochanteratus Hlm. Auch diese Art ist überall, 5.—7.

T. consobrinus Hlm. Überall häufig, 5.—7.

T. vulgaris Hlm. Mit voriger.

T. nigripes Hlm. Überall einzeln.

Familie: **Braconidae**.

Gattung: **Acoelius** Hal.

A. subfasciatus Hal.* ex *Nepticula sericopeza* Z. et *N. pyricola*.

A. sp. ex *Nepticula salicis*, *N. Klimeschi*, *N. luteella*, *N. alnetella* et *N. turionella*.

Gattung: **Acampsis** Wes.

A. altornipes Nes. Löbau.

Gattung: **Agathis** Ltr.

A. nigra Nes. ex *Aristotelia Brizella* Tr.

A. tibialis Nes. ex *Aristotelia brizella* Tr. et *Semasia hypericana* Hb.

Gattung: **Aleiodes**.

A. palliator Thn. ex *Leucania palens* L. et *Lita Viscariae* Schütze.

A. circumscriptus Nes.* ex *Lita viscaria*.

A. bicolor Spi. 6.—9. Göda, Neschwitz.

A. testaceus Spi. ex *Cerura bifida* Hb.

A. geniculatus Ns. ex *Cladius pectinicornis* Geoff.

Gattung: **Alysia** Ltr.

A. manducator Pz. 6. 7. Bautzen, Kauppa.

Gattung: **Apanteles** För.

A. ultor Reinh. ex *Pieris brassicae* L., *Evetria resinella* L. et *Lithocolletis cerasicolella* H. S.

A. congesta Ns. ex *Cymatophora* or F., *Mamestra trifolii* Rott. et *Conchylis udana* Gn.

A. triangulator Wes. ex *Simaethis pariana* Cl. et *Bedelia summulentella* Z.

A. tenebrosus Ws. ex *Acrolepia pygmeana* Hw. et *Pyrameis atalanta* L.

A. albipennis Ns. ex *Conchylis posterana* Z. *Carphotricha pupillata* Fll. et *Blastodacna putripennella* Z.

- A. punctiger** Ws. ex *Elachista poae* Stt., *El. quadrella* Hb. et *Lithocolletis junoniella* Z.
A. retricus Reich. ex *Lithocolletis salictella* Z.
A. palipes Reinh. ex *Chilo phragmitellus* Hb.
A. ruficrus Ns. ex *Tinea granella* L. et *Acromyza* spc.
A. fraternus Reich. ex *Elachista bifasciella* Tr.
A. formosus Ws. ex *Coleophora fuscadinella* Z.
A. nanus Reich. ex *Eupithe. denotata* Hb.
A. acuminatus Reich. ex *Simaethis pariana* Cl.
A. spurius Ws. ex *Dicranura vinula* L. et *Pyrameis atalanta* L.
A. solitarius Rtz. ex *Noctuen* spc.

Gattung: **Aphidius** Ns.

- A. infirmus** Ns. ex *Elachista luticomella* Z.
A. absynthii Mrsh. ex *Beifußblattlaus*.

Gattung: **Ascogaster** Ws.

- A. 4-dentatus** Thm. ex *Acrobasis soldalella* Z., *Carpocpsa splendana* Hb., *Grapholitha grunertiana* Rtz. et *Graph. nigricana* Sph.
A. instabilis Ws. 6. 7. Kauppa, Commerau, Caßlau.
A. annularis Ns. ex *Sesia asiliformis* Rott.
A. varipes Ws. 7. Bautzen.

Gattung: **Bracon** F.

- B. discideus** Ws. ex *Phythomyza lateralis* Fll.
B. minutor F. ex *Urophora 4-fasciata* Mg., *Carphotricha pupillata* Fll. et *Conchylis posterana* Z.
B. peroculatus Ws. ex *Cnephasia virgaureae* Stt.
B. guttiger Ws. ex *Conchylis posterana* Z.
B. cautatus Rtz. ex *Cynips* spc.
B. immutator Ns. *Phythomyza flavicornis* Fll.
B. crasuncula Thm. ex *Grapholitha aurana* F.
B. obscurator Ns. ex *Cacoecia* spc.
B. atrator Ns. ex *Coleophora gallipennella* Hb.
B. abricus Schm. Bautzen, 9.
B. Spearschneideri Schm. Bautzen, 10.
B. longicaudis Rtz. ex *Mompha subbistrigella* Hw.
B. terrebrella Ns. ex *Miarus campanulae* L. (F.).
B. nicratus Ws. ex *Tripetra cylindrica* RD.
B. arcuatus Thm. ex *Conchy. posterana* Z.
B. gallicus Thm. ex *Conchy. posterana* Z.
B. stabilis Ws. ex *Carphotricha pupillata* Fll. Gefangen 4.
B. pallipes Szpl. Göda, 7.
B. grandiceps Thm. ex *Agromyza flavifrons* Mg.
B. triangularis Ns. ex *Conchylis posterana* Z.

Gattung: **Chelonus** Pz.

- C. inanitus** L. 6.—9. Verbreitet.
C. humilis Thm. 6. 7. Bautzen, Löbau.

- C. rugigena* Thm. 6. Löbau, Baruth.
C. maculator Dahl. Löbau, 8.
C. decorator Mrsh. ex *Epiblema foenella* L.
C. esilis Mrsh. ex *Cosmopteryx scribaeiella* Z.

Gattung: **Coeloides** Ws.

- C. stigmaticus* Hall. ex *Lipara lucens* Mg.

Gattung: **Cratospila** För.

- C. circe* Hal. 6. Bautzen.

Gattung: **Eubadizon** Ns.

- E. extensor* L. ex *Argyresthia illuminatella* Z.

Gattung: **Försteria**.

- F. spc.* ex *Pissodes notatus* Fb.

Gattung: **Helcon** Ns.

- H. tarator* Ns. 7. Großschweidnitz (Wadewitz).

Gattung: **Leiophron** Ns.

- L. saxo* Ruthe. 9. Bautzen.

Gattung: **Macrocentrus** Crt.

- M. marginator* Ns. 7. Bautzen, Niedergurig, und aus *Sesia conopiformis* Esp. et *Cnephasia wahlbomiana* L.
M. thoracicus Ns. ex *Epiblema tedella* Cl., *Grapholitha zebeana* Rtzb., *Xystophora lutulentella* Z. et *Acrobasis consociella* Hb.
M. flavipes Rtzb. ex *Grapholitha zebeana* Rtzb.

Gattung: **Meteorus** Hal.

- M. scutellator* Ns. ex *Agrotis segetum* L. var. **unicolor** Ws. 7. Gersdorf (Schmidt).
M. fasciatus Rtzb. ex *Cacoecia xylosteanana* L.
M. ictericus Ns. ex *Cacoecia rosana* L. et *Agrotis strigula* Thnb.
M. dubius Ruthe ex *Colephora ledi* Stt. et *Grapholita strobilella*.
M. deceptor Ws. ex *Cnephasia wahlbomiana*, sonst verbreitet, 5. 6.
M. unicolor Rth. ex *Pamene fimbriana* Hw.
M. rugator Rtzb. 6. Bautzen, Kauppa.
M. consors Rth. ex *Gelechia rhombella* Schff. et *Blastotagna putripennella* Z.
M. jaculator Hlm. ex *Tinea granella*, *T. cloacella* et *Lita viscariae* Schütze.
M. thuringiae Schm. ex *Mompha rhamniella* H. S.
M. albitarsis Crt. 5. 6. Bautzen.
M. chrysophthalmus Ns. ex *Acrobasis consociella* Hb.
M. pallipes Ws. ex *Tinea granella*, sonst verbreitet.
M. longicauda Rtzb. ex *Tinea granella*.
M. pulchricornis Rth. ex *Agrotis strigula*.

Gattung: **Microdus** Ns.

- M. cingulipes** Ns. ex *Homeosoma limbella* Z.
- M. calcitrator** F. ex *Limnobia* sp.
- M. dimidiator** Ns. 7. *Gleina*.
- M. mediator** Ns. ex *Pamene regiana*.
- M. rufipes** Ns. ex *Grapholitha pallifrontana* Z.

Gattung: **Microgaster** Ltr.

- M. deprimator** Sp. ex *Epiblema immundana* F. R.
- M. globatus** L. ex *Acrolepia asectella* Z. et *Pegomyia* sp.
- M. procerus** Rth. Bautzen, 7.
- M. tibialis** Ns. ex *Nephopterix hostilis* Sph., *Graph. aurana* F. et *Olethreutes arbutella* L.
- M. dorsalis** Ns. ex *Tinea granella*, *Carpotricha pupillata* Fll. et *Trypeta cylindrica* R. D.
- M. conexus** Ns. ex *Tinea granella* et *T. cloacella*.
- M. perspicuus** Ns. ex *Tinea cloacella*.
- M. sticticus** Rth. ex *Oxyna parietina* L.
- M. obscurus** Ns. 7. Göda (F.).
- M. fuliginosus** Ws. ex *Agromyza cunctans* Mg.
- M. impurus** Ns. ex *Argyrethia laevigatella* H. S., *Elachista bifasciella* Tr. *Elach. poae* Sttt. et *Olethreutes profundana* F.
- M. reconditus** Ws. ex *Tinea cloacella* et *Trypeta cylindrica* R. D.
- M. postiacus** Ns. mit var. ex *Xanthia citrago* L., *Acromyza cunctans* Mg. et *Olethreutes Schrebiana* L.
- M. subcompletus** Ns. Bautzen, 5.—10.
- M. ruficoxsis** Rth. ex *Tinea cloacella*.

Gattung: **Microplitis** För.

- M. mediana** Rth. ex *Hadena unanimitis* Tr.
- M. vidua** Rth. ex *Dianthoecia capsincola* Hb.
- M. sordipes** Ns. Bautzen, 5. 6.
- M. parvulus** Rth. 5. Bautzen.
- M. tristis** Ns. ex *Dianthoecia capsincola* Hb.

Gattung: **Microtypus** Rtz. b.

- M. Wesmali** Rtz. b. ex *Acrobasis consociella* H. B.

Gattung: **Orgilus** Hal.

- O. obscurator** Ns. ex *Acrobasis consociella* Hb. et *Evetria buoliana*.

Gattung: **Orthostigma** Rtz. b.

- O. pumila** Ns. ex *Tischeria complanella* Hb. et *Phytomyza affinis* Fll.

Gattung: **Phanomeris** För.

- P. glabricollis** Thm. Bautzen, 6.

Gattung: **Phaenocarpa** För.

- P. rufipes** Ns. ex* *Plutella maculipennis* Crt.

Gattung: **Phanerotoma** Ws.

P. rufa Mrsh. Bautzen, 6.

P. planifrons Ns. Bautzen, 6.

P. dentata Ws. ex *Acrobasis consociella* Hb. et *Grapholitha funebrana*.

Gattung: **Pelecystoma** Ws.

P. tricolor Ws. 7. Bautzen.

Gattung: **Polydegmon** För.

P. spc. ex *Trypeta cylindrica* Fll., *Oxyph. parietina* L. et *Mordellistena parvula* Gyll.

Gattung: **Perilitus** Ns.

P. toracinatus Ns. ex *Acalla variegana* Schff.

Gattung: **Polemon** Gir.

P. liparae Gir. ex *Lipara lucens* Mg.

Gattung: **Rogas** Ns.

R. dimidiatus Spin. Verbreitet, 5.—7.

R. dimid. var. **macula-mesonoti-rufis** ex *Lipara lucens* Mg.

R. marginator Ns. 7. Bautzen.

R. modestus Reinh. ex *Ancylis tineana* Hb.

Gattung **Spathius** Ns.

S. exerator L. ex *Tineola biselliella* Hm., *Tinea fuscadinella* Hw., *Acrobasis consociella* Hb. et Spinneneiern.

S. claratus Pz. Bautzen, Kamenz (Sch.) et ex *Epiblema nigricana*.

S. rubidus Ol. mit var. **surpturatus** Hallen. ex *Tinea pellationella* L.

Gattung: **Toxares** Hal.

T. deltiger Hlm. ex *Lithocolleis padella* Glitz.

Gattung: **Trachyusa** Rth.

T. aurora Hlm. ex *Chilo phragmitellus* Hb.

Gattung: **Zele** Crt.

Z. testaceator Crt. Überall nicht selten und aus *Hadena unanimitis* Tr. erzogen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Isis Budissina](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Starke Hermann

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zu den Schlupfwespen von K. T. Schütze, Rachlau und Dr. Roman, Stockholm. 63-95](#)