

Beitrag

zur

Lepidopteren-Fauna von Weyr in Oberösterreich

(an der Eisenbahnlinie Amstetten—Klein-Reifling).

Von

Anton Metzger in Wien.

Die Zeit meines Aufenthaltes in Weyr fiel durch 12 Jahre meistens in den Monat Juli oder Anfangs August; nur im Jahre 1888 sammelte ich einige Tage im Juni, Juli, August und in der ersten Hälfte September.

Mein Sammelgebiet war der, in der nächsten Nähe von Weyr gelegene Kreuzberg, der Weg in die Lindau, der am linken Ennsufer gelegene Hammerschmiedgraben mit dem Wege auf den Almkogel, die Strasse von Weyr nach Reichramming, die Strasse von Weyr nach Hollenstein und der Fussweg über die Loiben nach Klein-Reifling etc. etc.

Parnassius apollo (Schm. nicht häufig).

Aporia crataegi.

Pieris brassicae.

Autocharis cardamines.

Leucophasia sinapis.

Colias hyale (Schm. einzeln).

Rhodocera rhamni.

Polyommatus virgaureae, ¹¹³*hippotoe* L., ¹¹³*dorilis* Hufn.

¹⁴⁰*Lycaena aegon*, ¹⁷³*icarus* Rott, ¹³⁵*hylas* Esper, ¹⁷⁶*meleager* Esper, ¹²⁴*minima* Fuesli, ¹⁷²*semiargus* Rott, ¹⁷²*alcon*, ¹⁷²*arion*.

Apatura iris.

Limenitis populi (Schm. einzeln am Kreuzberge).

Vanessa prorsa, *c. album*, *polychloros*, *urticae*, *io*, *antiopa*, *atalanta*, *cardui*.

Melitaea cinxia, *dictynna* (Schm. häufig), *athalia* (Schm. häufig), und *ab corythalia*, Hb. (Schm. einzeln).

Argynnis euphrosine, *dia*, *lathonia*, *aglaja*, *v. eris*, *adippe*, *paphia* (Schm. sehr zahlreich), *u. v. valesina* (1 Stück Schm.).

Erebia oeme v. *spodia* Stgr. (der Schm. flog nicht häufig vom 10. bis 20. Juni 1888), *pronoe*, *aethiops* Esp., *ligea*, *euryale*. *Satyrus*, im Verlaufe von 12 Jahren fand ich nicht ein Stück dieses sehr artenreichen Genus.

Pararge maera, *megaera* (Schm. häufig am Kreuzberge).

Epinephele janira.

Coenonympha iphis, *arcania*.

Syrichtus alveus Hb.

Nisoniades tages.

Hesperia sylvanus, *comma*.

Carterocephalus palaemon Pall.

Acherontia atropos, selten.

Sphinx convolvuli, *ligustri*, *pinastri*.

Deilephila euphorbiae, *elpenor*.

Smerinthus ocellata.

Macroglossa stellatarum.

Ino statices.

Zygaena pilosellae Esper, *achilleae*, *meliloti*, *loniceriae*, *filipendulae* u. ab. *cytisi* Hübner, sehr einzeln (ephialtes kommt nicht vor).

V. peucedani, nicht selten, ab. *athamanthae* selten, *carniolica* sehr häufig, v. *berolinensis* selten.

Sarrothripa undulana Hb. (die Raupe einzeln im Juni auf Eichen).

Hylophila prasinana (Raupe).

Nola cucullatella.

Nudaria mundana.

Calligenia miniata Forst.

Setina irrorella, *mesomella* L.

Lithosia muscerda (Schm. 1 Stück am 15. August 1885), *deplana* Esp., *lurideola*, *complanata*, *sororecula* Hufn. (die Raupe im Herbst auf Flechten häufig).

Gnophria quadra, häufig, *rubricollis* (Schm. und Raupe).

Nemeophila russula, *plantaginis* (Stammform).

Callimorpha dominula, *hera*, häufig.

Arctia caja (die Raupe nicht selten).

Spilosoma mendica, *lubricipeda*, *menthastri*, *urticae* (von diesen Arten fand ich im September die Raupen).

Hepialus sylvinus, *hecta*.

Cossus ligniperda F. (die Raupe im Herbst).

-*Typhonia lugubris* O. (Schm. selten, nur Männchen).

Orgyia antiqua (Raupe).

Porthesia similis (Schm. selten).

- Psilura monacha* (Schm. u. Raupe am Kreuzberge nicht häufig,
 Schm. die gewöhnliche lichte Form).
Bombyx populi L. (Puppe), trifolii, rubi.
Lasiocampa ilicifolia (ich fand am 20. August 1886 eine Puppe,
 der Schm. entwickelte sich im Mai 1887).
Drepana cularia F. (2 Schm.).
Cilix glaucata Sc.
Harpyia vinula (Raupe nicht selten).
Stauropus Fagi (die Raupe mehrmals geklopft).
Notodonta ziczac (Raupe).
Pterostoma palpina (Raupe u. Schm.).
Phalera bucephala.
Thyatira batis (Raupe nicht selten).
Acronycta leporina, aceris, megacephala, alni (Raupe auf rosa canina),
 strigosa (Raupe einzeln auf baumartigen prunus spinosa), cuspis
 (Raupe einzeln auf alnus und prunus spinosa), auricoma, v. mon-
 tivaga (Schm. u. Raupe), ligustri (Raupe im Ebnsthal sehr
 häufig).
Panthea coenobita (eine Raupe am 15. August 1888 am Kreuz-
 berge geklopft).
Mamestra thalassina (Raupe), Pisi (Raupe Ende August auf Aeckern
 sehr häufig), persicariae, dentina, chrysozona Bkh. (Raupe nicht
 selten), serena, advena.
Dianthoecia caesia, v. xanthocyanea, nana Rott., albimacula, capsin-
 cola, cucubali, carpophaga Bkh. (von caesia Raupe u. Schm.,
 von den übrigen Arten fand ich die Raupe).
Polia chi (Raupe u. Schm.).
Hadena lithoxylea, didyma, strigilis.
Rhizogramma detersa Esper (Schm.).
Eriopsis purpureofasciata Piller (Raupe nicht selten Ende August in
 trockenen Wäldern auf der Unterseite von *Pteris aquilina* sitzend).
Euplexia lucipara (Raupe).
Hydroecia nictitans (Schm. bei Tage auf Blüthen sitzend),
 micacea (2 Schm.).
Amphipyra pyramidea.
Panolis piniperda (Raupe einzeln, Kreuzberg).
Calymnia pyralina.
Scoliopteryx libatrix (Schm. u. Raupe häufig).
Xylina socia Rott. (1 Puppe gefunden).
Cucullia verbasci, lychnitis (Raupe), asteris (Raupe), umbratica
 (Schm. selten), lactucae (Schm. u. Raupe), lucifuga (Schm. häufig),
 campanulae (Raupe), gnaphalii Hb. (ich fand die Raupe auf Soli-

- dago virg. Die Raupe lebt zuerst von Solidago-Blättern und dann erst von den Blüten dieser Pflanze, zu einer Zeit, wo die Raupe von cucullia asteris noch sehr klein ist. Die Seltenheit dieser Raupe hat auch seinen Grund in dem leichten Abfallen der Raupe von der Futterpflanze. Diese üble Eigenschaft der Raupe erwähnt schon Treitschke im Band VI, I, pag. 412), absinthii L. (Schm.).
- Plusia chrysis⁷⁷⁵, chryson⁷⁷ Esp., bractea⁷⁷, gamma.
- Anarta myrtilli⁷⁷⁴ (Raupe nicht selten auf vaccinium).
- Chariclea umbra⁸⁰³ Hufn. (Raupe nicht selten auf Salvia pratensis).
- Erastria fasciana L.⁸⁵⁷
- Prothymia viridaria (Schm. sehr häufig).⁸⁷⁶
- Euclidia glyphica.⁸⁹⁶
- Catocala electa.⁹⁰⁹
- Aventia flexula (Schm. selten).⁹³⁸
- Zanclognatha grisealis Hbn.⁹⁴⁶
- Herminia tentacularis L.⁹⁵⁵
- Bomolocha fontis Thnb. (Schm. u. Raupe).⁹⁵⁷
- Hypena rostralis, proboscidalis.^{962, 968}
- Pseudoterpna pruinata Hufn.⁹⁸³
- Geometra papilionaria.⁹⁸⁷
- Acidalia perochraria¹⁰⁰⁴, bisetata³¹, dilutaria³³, holosericata³⁴, aversata⁴⁰, immorata⁴¹, punctata⁶² Tr. (Schm. selten), strigilaria Hb., ornata.
- Zonosoma linearia Hb.⁷⁸
- Pellonia vibicaria.¹⁰⁰⁰
- Abraxas adustata S. V.¹¹⁹²
- Cabera pusaria, exanthemata.^{1349. 57}
- Numeria capreolaria (Schm. nicht selten).¹³⁵²
- Ellopia prosapiaria, nur in der ab. prasinaria (Schm.).¹⁵³
- Eugonia quercinaria ab. carpinaria Hb. (Schm., Männchen).¹³⁵⁷
- Epione apiciaria, advenaria (Schm. u. Raupe).^{1370. 59}
- Venilia macularia L.¹³⁸²
- Macaria alternaria, liturata.^{1383. 13}
- Boarmia secundaria, abietaria⁷⁹, repandata⁷⁹, roboraria⁷³, consortaria⁷⁸ (Schm. u. Raupe), crepuscularia.
- Gnophos dilucidaria¹⁴⁵⁷ (Schm. nicht selten).
- Emarturga atomaria.¹¹⁷⁶
- Halia wauaria L.¹⁴⁷⁹
- Phasiane clathrata.¹⁴⁸³
- Ortholitha limitata¹⁰²⁷, bipunctaria¹⁰⁹³ und ab. gachtaria Fr. (in sehr dunklen Stücken).
- Minoa murinata Sc.¹⁵⁹⁵

Odezia atrata L. (Schm. im Juni sehr häufig, im August Schm. einzeln). ¹⁰⁹⁶

Anaitis praeformata. ¹¹⁰²

Lobophora sexalisata Hb. (Raupe im Herbste von Salix geklopft). ¹¹¹³

Scotosia vetulata, rhamnata Schiff. ^{1115, 26}

Cidaria dotata L. (Schm. in sehr scharf gezeichneten Stücken), ¹¹³³

variata, ³⁷ aptata, ⁴⁸ olivata, ⁴⁹ viridaria L., ⁵⁰ didymata, ⁶⁰ vespertaria, ⁶²

fluctuata, ⁶⁴ montanata, ⁶⁵ ferrugata, ⁷⁰ designata (Schm., einzeln bei

den Häusern), ⁷² cuculata Hufn. (Raupe einzeln), ⁷⁵ galiata, ⁷⁶ albi-

cillata, ¹³⁵ procellata, ⁷⁸ luctuata Hb., ⁷⁹ alchemillata L., ⁸⁰ hydrata, ⁸¹ adae-

quata Bkh., ⁸² obliterata Hufn., ⁸³ bilineata, ⁸⁴ sordidata F., ⁸⁵ vitalbata. ¹³²⁹

Eupithecia venosata, ¹²⁵⁵ pusillata, ⁸⁶ digitaliata, ⁸⁷ fraxinata (Raupe im Juni

auf crataegus), ¹²⁹⁸ scriptaria, ⁸⁸ satyrata, ¹³⁰² isogrammaria, ¹¹⁷³ virgaureata

absinthiata, ⁸⁹ lariciata (von diesen Arten fand ich die Räu-
pen)