Beitrag

zur

Lepidopteren-Fauna von Weyr in Oberösterreich

(an der Eisenbahnlinie Amstetten-Klein-Reifling).

Von

Anton Metzger in Wien.

Die Zeit meines Aufenthaltes in Weyr fiel durch 12 Jahre meistens in den Monat Juli oder Aufangs August; nur im Jahre 1888 sammelte ich einige Tage im Juni, Juli, August und in der ersten Hälfte September.

Mein Sammelgebiet war der, in der nächsten Nähe von Weyr gelegene Kreutzberg, der Weg in die Lindau, der am linken Ennsufer gelegene Hammerschmiedgraben mit dem Wege auf den Almkogel, die Strasse von Weyr nach Reichramming, die Strasse von Weyr nach Hollenstein und der Fussweg über die Loiben nach Klein-Reifling etc. etc.

Parnassius apollo (Schm. nicht häufig).

Aporia crataegi.

Pieris brassicae.

Antocharis cardamines.

Leucophasia sinapis.

Colias hyale (Schm. einzeln).

Rhodocera rhamni.

Polyommatus virgaureae, hippothoe L., dorilis Hufn.

Lycacna aegon, icarus Rott, hylas Esper, meleager Esper, minima Fuesli, semiargus Rott, alcon, arion.

Apatura iris.

Limenitis populi (Schm. einzeln am Kreutzberge).

Vanessa prorsa, c. album, polychloros, urticae, io, antiopa, atalanta, cardui.

Melitaea cinxia, dictynna (Schm. häufig), athalia (Schm. häufig), und ab corythalia, Hb. (Schm. einzeln).

Argynnis euphrosine, dia, lathonia, aglaja, v. eris, adippe, paphia (Schm. sehr zahlreich), u. v. valesina (1 Stück Schm.).

Erebia oeme v. spodia Stgr. (der Schm. flog nicht häufig vom 10. bis 20. Juni 1888), pronoe, aethiops Esp., ligea, euryale. Satyrus, im Verlaufe von 12 Jahren fand ich nicht ein Stück dieses sehr artenreichen Genus.

Pararge maera, megaera (Schm. häufig am Kreutzberge).

Epinephele janira.

Coenonympha iphis, arcania.

Syrichtus alveus Hb.

Nisoniades tages.

Hesperia sylvanus, comma.

Carterocephalus palaemon Pall.

Acherontia atropos, selten.

Sphinx convolvuli, ligustri, pinastri.

Deilephila euphorbiae, elpenor.

Smerinthus ocellata.

Macroglossa stellatarum.

Ino statices.

Zygaena pilosellae Esper, achilleae, meliloti, lonicerae, filipendulae u. ab. cytisi Hübner, sehr einzeln (ephialtes kommt nicht vor). V. peucedani, nicht selten, ab. athamanthae selten, carniolica sehr häufig, v. berolinensis selten.

Sarrothripa undulana Hb. (die Raupe einzeln im Juni auf Eichen).

Hylophila prasinana (Raupe).

Nola cucullatella. 1993

Nudaria mundana.

Calligenia miniata Forst.

Setina irrorella, mesomella L. 189, 27

Lithosia muscerda (Schm. 1 Stück am 15. August 1885), deplana Esp., lurideola, complana, sororcula Hufn. (die Raupe im Herbst auf Flechten häufig).

Gnophria quadra, häufig, rubricollis (Schm. und Raupe).

Nemeophila russula, plantaginis (Stammform).

Callimorpha dominula, hera, häufig.

Arctia caja (die Raupe nicht selten).

Spilosoma mendica, lubricipeda, menthastri, urticae (von diesen Arten fand ich im September die Raupen).

Hepialus sylvinus, hecta.

Cossus ligniperda F. (die Raupe im Herbst).

-Typhonia lugubris O. (Schm. selten, nur Männchen).

Orgyia antiqua (Raupe). 260

Porthesia similis (Schm. selten). 32

Psilura monacha (Schm. u. Raupe am Kreutzberge nicht häufig, Schm. die gewöhnliche lichte Form).

Bombyx populi L. (Puppe), trifolii, rubi.

Lasiocampa ilicifolia (ich fand am 20. August 1886 eine Puppe, der Schm. entwickelte sich im Mai 1887).

Drepana cultraria F. (2 Schm.).

Cilix glaucata Sc.

Harpyia vinula (Raupe nicht selten).

Stauropus Fagi (die Raupe mehrmals geklopft).

Notodonta ziczac (Raupe).

Pterostoma palpina (Raupe u. Schm.).

Phalera buçephala.

Thyatira batis (Raupe nicht selten).-

Acronycta lepórina, aceris, megacephala, alni (Raupe auf rosa canina), strigosa (Raupe einzeln auf baumartigen prunus spinosa), cuspis (Raupe einzeln auf alnus und prunus spinosa), auricoma, v. montivaga (Schin u. Raupe), ligustri (Raupe im Ennsthale sehr häufig).

Panthea coenobita (eine Raupe am 15. August 1888 am Kreutz-

berge geklopft).

Mamestra thalassina (Raupe), Pisi (Raupe Ende August auf Aeckern sehr häufig), persicariae, dentina, chrysozona Bkh. (Raupe nicht selten), serena, advena.

Dianthoecia caesia, v. xanthocyanea, nana Rott., albimacula, capsincola, cucubali, carpophaga Bkh. (von caesia Raupe u. Schm.,

von den übrigen Arten fand ich die Raupe).

Polia chi (Raupe u. Schm.).

Hadena lithoxylea, didyma, strigilis.

Rhizogramma detersa Esper (Schm.).

Eriopis purpureofasciata Piller (Raupe nicht selten Ende August in trockenen Wäldern auf der Unterseite von Pteris aquilina sitzend).

Euplexia lucipara (Raupe).

Hydroecia nictitans (Schm. bei Tage auf Blüthen sitzend), micacea (2 Schm).

Amphipyra pyramidea. 69

Panolis piniperda (Raupe einzeln, Kreutzberg). 25

Calymnia pyralina. 312

Scoliopterix libatrix (Schm. u Raupe häufig). 251

Xylina socia Rott, (1 Puppe gefunden).

Cucullia verbasci, lychnitis (Raupe), asteris (Raupe), umbratica (Schm. selten), lactucae (Schm. u. Raupe), lucifuga (Schm. häufig), campanulae (Raupe), gnaphalii Hb. (ich fand die Raupe auf Soli-

dago virg. Die Raupe lebt zuerst von Solidago-Blättern und dann erst von den Blüthen dieser Pflanze, zu einer Zeit, wo die Raupe von cucullia asteris noch sehr klein ist. Die Seltenheit dieser Raupe hat auch seinen Grund in dem leichten Abfallen der Raupe von der Futterpflanze. Diese üble Eigenschaft der Raupe erwähnt schon Treitschke im Band VI, I, pag. 412), absinthii L. (Sehm.).

Plusia chrysitis, chryson Esp., bractea, gamma.

Anarta myrtilli (Raupe nicht selten auf vaccinium).

Chariclea umbra Hufn. (Raupe nicht selten auf Salvia pratensis).

Erastria fasciana L.

Prothymia viridaria (Schm. sehr häufig). 2003

Euclidia glyphica. 1%

Catocala electa. 909

Aventia flexula (Schm. selten). 138 ...

Zanclognatha grisealis Hbn. 20

Herminia tentacularis L. 955

Bomolocha fontis Thnb. (Schm. u. Raupe). 959

Hypena rostralis, proboscidalis. 562, 558

Pseudoterpna pruinata Hufn. 923

Geometra papilionaria 267

Acidalia perochraria, bisetata, dilutaria, holosericata, aversata, immorata, punctata Tr. (Schm. selten), strigilaria Hb., ornata.

Zonosoma linearia Hb. 💅

Pellonia vibicaria. 1989

Abraxas adustata S. V. 199

Cabera pusaria, exanthemata. 1399. 57

Numeria capreolaria (Schm. nicht selten). 1292

Ellopia prosapiaria, nur in der ab prasinaria (Schm.). 453

Eugonia quercinaria ab. carpinaria Hb. (Schm., Männchen). 1937

Epione apiciaria, advenaria (Schm. u. Raupe).

Venilia macularia L. 322

Macaria alternaria, liturata. 1985/2

Boarmia secundaria, abietaria, repandata, roboraria, consortaria (Schm. u. Raupe), crepuscularia.

Gnophos dilucidaria (Schm. nicht selten).

Emarturga atomaria."

Halia wauaria L: 1999

Phasiane clathrata.

Ortholitha limitata, bipunctaria und ab. gachtaria Frr. (in sehr dunklen Stücken).

Minoa murinata Sc. 1095

Odezia atrata L. (Schm. im Juni sehr häufig, im August Schm. einzeln).

Anaitis praeformata. 1/02

Lobophora sexalisata Hb. (Raupe im Herbste von Salix geklopft). Scotosia vetulata, rhamnata Schiff. 115, 26

Cidaria dotata L. (Schm. in sehr scharf gezeichneten Stücken), variata, aptata, olivata, viridaria L., didymata, vespertaria, fluctuata, montanata, ferrugata, designata (Schm, einzeln bei den Häusern), cuculata Hufn. (Raupe einzeln), galiata, albicillata, procellata, luctuata Hb., alchemillata L., hydrata, adae-4 quata Bkh., obliterata Hufn., bilineata, sordidata F., vitalbata.

Eupithecia venosata, pusillata, digitaliata, fraxinata (Raupe im Juni auf crataegus), scriptaria, satyrata, isogrammaria, virgaureata absinthiata, lariciata (von diesen Arten fand ich die Raupen)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Jahresberichte Wiener entomologischer Verein</u>

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 02

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Weyr in Oberösterreich (an der Eisenbahnlinie Amstetten-Klein-Reifling). 13-

17