download unter www.biologiezentrum.at

Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen

von

Anton Metzger in **Wien.**

Die lepidopterologische Ausbeute meines ersten Aufenthaltes in Friesach im Jahre 1892 wurde von mir im III. Jahresberichte pro 1892 des „Wiener entomologischen Vereines" veröffentlicht.

Im Jahre 1894 verweilte ich abermals vom 22. Mai bis 15. September in Friesach.

Damals beobachtete ich Arten im Jahre 1892 . . 256
wozu im Jahre 1894 als neu hinzukommen 88
so dass sich die von mir in den Jahren 1892 und 1894 beobachtete Gesammtzahl an Arten, Varietäten und Aberrationen auf die Summe von . . . . . 344 stellt.

Ich lasse nunmehr die Aufzählung der neu beobachteten Formen folgen.

Zur Orientierung sei noch bemerkt, dass die Stadt Friesach 635 *m* und die Kulmitzer-Teiche 819 *m* über dem Meere liegen.

Das Radwerk Olsa, derzeit ausser Betrieb, ist von Friesach eine Viertelstunde entfernt.

Anthocharis Cardamines L. Die Schmetterlinge flogen bis Ende Juni, und

aberr. Immaculata Pabst. Ohne den Mittelfleck im Orange der Vorderflügel, sehr einzeln unter der Stammform.

Thecla Spini Schiff. Ein ♀ am 29. Juli (Fischerkogel).

Polyommatus Dorilis Hufn. Ein ♂ am 15. Juli.

„ Phlaeas L. Ein ♀ am 21. Juli.

Lycaena Aegon Schiff. Schmetterling, häufig in der Olsa.

„ Eumedon Esp. Die Schmetterlinge flogen vom 7. Juli an. (Olsa). Eumedon wurde in neuerer Zeit in den österreichischen Alpen noch an folgenden Orten aufgefunden: Bad Einöd,

download unter www.biologiezentrum.at

730 *m*, und in Teufenbach im Murthale; beide Orte liegen in Steiermark (Baron Kalchberg); in Trafoi, Tirol (Habich und Locke), dann im Glocknergebiete (Locke), und

aberr. Fylgia Spångberg. Die Stammform hat auf der Unterseite der Hinterflügel einen weissen Keilfleck (Längsstrahl), welcher von dem Mittelstriche bis zu den Randflecken in Zelle 4—5 reicht. Dieser weisse Keilfleck (Längsstrahl) fehlt der aberr. Fylgia vollständig. Von Fylgia fieng ich nur 2 Schmetterlinge.

Lycaena Argiolus L. Ein ♀ am 1. Juni
„ Cyllarus Rott. Ein ♀ am 24. Mai
„ Arion aberr. Obscura Frey. Schmetterling am 12. Juli
} auf dem Wege zu den Teichen

Vanessa Levana L. Schmetterling am 5. Juni.

„ Polychloros L. Schmetterling am 2. Juli.

„ Antiopa L. Ich fand am 27. Mai einen überwinterten Schmetterling und vom 30. Juni an flogen schon frische Stücke.

Melitaea Aurelia Nick. Der Schmetterling anfangs Juli nur in der Olsa.

Argynnis Ino Rott. Ich fand am 6. Juli die schon meistens abgeflogenen Schmetterlinge (Olsa).

„ Aglaja L. Schmetterling am 12. Juli.

Erebia Aethiops v. Leucotaenia Stgr. Am 16. August ein ♀ auf dem Wege zu den Teichen.

Satyrus Semele L. Schmetterling am 26. Juli (Olsa).

Pararge Hiera F. Der Schmetterling flog nicht selten vom 26. Juni an am Wege zu den Teichen.

Hesperia Lineola O. Schmetterling.

Sphinx Ligustri. Am 18. August fand ich die Raupe in verschiedenen Grössen auf Berberis, am Wege nach Zeltschach.

„ Pinastri L. Am 31. Juli fand ich eine kleine Raupe.

Bembecia Hylaeiformis Lasp. Am 15. August ein ♀ am Wege zu den Teichen.

Ino Globulariae Hb. Schmetterling am 16. Juni.

Zygaena Pilosellae ab. Pluto, Ochs. ♂ am Weg zu den Teichen.

„ Filipendulae ab. Cytisi Hb. War unter der Stammform nicht selten aufzufinden.

Sarrothripa Undulana v. Degenerana Hb. Die Raupen waren anfangs Juli nicht selten in den Zweigspitzen von Salix caprea zu finden.

Spilosoma Lubricipeda Esp. Ein ♀ am 5. Juni.

download unter www.biologiezentrum.at

Hepialus Sylvinus L. Ein ♀ am 14. August.
Dasychira Pudibunda L. Am 30. Juli fand ich eine kleine Raupe an Rubus.
Leucoma Salicis L. Am 4. Juli zwei Schmetterlinge in der Pappel-Allee nach Olsa.
Bombyx Quercus L. Eine beinahe erwachsene Raupe fand ich am 8. Juni.
Stauropus Fagi L. Zwei nicht erwachsene Raupen an Eschen am 25. August.
Notodonta Ziczac L. Raupe am 12. August auf Salix caprea.
Pterostoma Palpina L. Raupe am 22. August auf Salix caprea.
Ptilophora Plumigera Esp. Eine Raupe am 7. Juni auf Ahorn.
Thyatira Batis L. Eine kleine Raupe am 22. August.
Cymatophora Or. F. Die Raupe fand ich im Herbste auf Populus tremula zwischen zusammengesponnenen Blättern.
Diloba Caeruleocephala L. Die Raupe an Obstbäumen am 8. Juni.
Panthea Coenobita Esp. Eine beinahe erwachsene Raupe am 23. August, Olsa.
Agrotis Baja F. Die Raupen anfangs September aus dürren Büschen geklopft.
„ C. nigrum L. Ich habe einen Schmetterling der II. Generation aus einer unter Moos gefundenen Puppe erhalten.
„ Prasina F. Raupe im Herbste aus dürren Büschen geklopft.
Mamestra Brassicae L. Raupe im Herbste.
Chloantha Polyodon Cl. Schmetterling Ende Juni aus dürren Büschen geklopft.
Euplexia Lucipara L. Raupe im Herbste häufig.
Hydroecia Nictitans Bkh. Ein ♀ am 2. September.
Mithymna Imbecilla F. } Die Raupen im Herbste aus dürren
Rusina Tenebrosa Hb. } Büschen geklopft.
Lithocampa Ramosa Esp. Die Raupe fand ich Ende August nicht selten an Lonicera.
Cucullia Lychnitis Rbr. Am 7. September zwei erwachsene Raupen am Wege nach Zeltschach.
„ Asteris Schiff. Raupe auf Solidago, Ende August.
Plusia Bractea F. Ein ♀ am 2. August (Olsa).
Heliothis Peltiger Schiff. Ein ♀ am 8. Juni, Coudenhove-Promenade.
Chariclea Umbra Hufn. Raupe am 10. August auf Geranium.
Euclidia Mi Cl. Schmetterling.
Catocala Electa Bkh. Schmetterling 5. September.
Toxocampa Viciae Hb. Raupe im Herbste aus dürren Büschen geklopft.

download unter www.biologiezentrum.at

Toxocampa Craccae F. Schmetterling am 6. Juni.
Pechipogon Barbalis. Schmetterling am 11. Juni. Die Raupe im Herbste an Birken.
Thalera Fimbrialis Sc. Ein ♀ am 5. August am Fischerkogel.
Jodis Putata L. Ein ♂ am 20. Juni.
Acidalia Dilutaria Hb. } Schmetterling vom 15. Juli an, am
„ Holosericata Dup. } Fischerkogel.
„ Aversata L. Schmetterling nicht selten.
Zonosoma Pendularia Cl. Schmetterling am 14. Juni, die Raupen im August an Birken.
Pellonia Vibicaria Cl. Schmetterling am 13. Juli am Fischerkogel.
Macaria Alternaria Hb. Schmetterling Ende Juni, Coudenhove-Promenade.
Amphydasis Betularius L. Schmetterling; auch die Raupe war im Herbste nicht selten zu finden.
Boarmia Consortaria F. Schmetterling, am 19. Juli.
Eucosmia Certata Hb. Raupe, am 27. Juli.
Scotosia Rhamnata Schiff. Schmetterling, am 30. Juni.
Lygris Reticulata F. Am 7. September zwei Raupen.
Cidaria Juniperata L. Raupe im August, die Schmetterlinge entwickelten sich aus den Puppen am 22. und 23. September.
„ Siterata Hufn. Ein ♀ am 20. August, Olsa.
„ Silaceata Hb. Ein ♀ am 5. Juni.
„ Vitalbata Hb. Ein ♀ am 3. Juli, Olsa.
Eupithecia Oblongata Thnb. Raupe.
„ Linariata F. Raupe.
„ Scabiosata Bkh. Raupe.
„ Isogrammaria H. S. Raupe.
„ Plumbeolata Hw. Schmetterling.
„ Cauchyata Dup. Raupe an den Blättern von Solidago am 2. September.
„ Campanulata H. S. Raupe am 19. August.
„ Assimilata Gn. Raupe an Humulus am 27. Juli.
„ Lariciata Frr. Raupe an Larix am 23. August.
„ Exiguata Hb. Raupe an Berberis vom 14. August an. Die Raupen waren erst am 20. September erwachsen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresberichte Wiener entomologischer Verein

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 05

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen. 29-32