

Coenonympha Pamphilus L. ab. Eburnea mihi

von

Otto Habich in Wien.

Hierzu Tafel I, Fig. 7.

Dieser auf Tafel I, Fig 7 abgebildete und von Herrn H. v. Mitis' Meisterhand gemalte Albino von Coenonympha Pamphilus L. wurde von meinem nun verstorbenen Freunde Schernhammer am 26. Juni 1892 in Moosbrunn (Niederösterreich) gefangen und befindet sich gegenwärtig in meiner Sammlung.

Moosbrunn ist eine allen hiesigen Sammlern wohlbekannte Sumpfsgegend und hat sich, wenn auch von der rings herum auf sie einwirkenden Cultur bedrängt, noch theilweise ihren ursprünglichen Character und damit zusammenhängend ihre autochthone Fauna bewahrt.

Ich erinnere nur an die hier vorkommende Coenonympha Oedippus F., deren sprunghafte Verbreitung, Südfrankreich (Garonne), Schweiz, München (Dachauer Moos), Ungarn (Ofen), Russland (Wolga) etc. auf gleichen Character der von ihr bewohnten Localitäten schliessen lässt.

Ferner wurde diese Aberration von Pamphilus noch von Herrn Kastner am 20. Juni 1890 in Inzersdorf am Wienerberge gefangen, auch Freund Bohatsch besitzt zwei gleiche Stücke und wie mich derselbe versichert, hat er wenigstens 6 weitere Stücke in verschiedenen Sammlungen gesehen, so dass diese schöne Aberration verhältnismässig nicht so selten vorkommt.

Dies hat mich bestimmt, dieselbe zu benennen und ihr wegen ihrer elfenbeingelben Färbung den Namen „Eburnea“ zu geben.

Abgebildet befindet sie sich bereits in Espers Werk: „Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur“. Tafel 78, Fig. 4.

Theilweiser Albinismus tritt häufiger auf, besonders bei dem Genus Erehia, Pararge, Coenonympha etc., kurz, bei Arten, wo die Puppen ohne weiteren Schutz frei auf der Erdoberfläche liegen und rührt wohl meist von zu starker Feuchtigkeit her, welche die Ausbildung des Pigmentes hindert.

Tafel-Erklärung.

Tafel I.

- Fig. 1 **Cleogene Niveata** Sc., Raupe (siehe Seite 5).
 „ 2 **Caustoloma Flavicaria** Hb., Raupe (siehe Seite 25).
 „ 3 ♂ } **Anthocharis Cardamines** L. v. **Phoenissa** Kbg.
 „ 4 ♀ } (siehe Seite 27).
 „ 5 ♂ } **Anthocharis Cardamines** L. v. **Turritis** O.
 „ 6 ♀ } (siehe Seite 27).
 „ 7 **Coenonympha Pamphilus** L. ab. **Eburnea** Habich ♂,
 (siehe Seite 29).

Tafel II (siehe Seite 51—53).

- Fig. 1 **Parnassius Delius** Esp. hermaphr., Oberseite.
 „ 1a „ „ „ „ Unterseite.
 „ 1b „ „ „ „ Taschenbildung
 (ventral gesehen).
 „ 2 **Parnassius Apollo** L. hermaphr., Oberseite.




Fig. 1 Hugo May jun. pinx.

Fig. 2 Ernst Wagner pinx.

Fig. 3-7 H.R.v. Mitis pinx.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [07](#)

Autor(en)/Author(s): Habich Otto

Artikel/Article: [Coenonympha Pamphilus L. ab. Eburnea mihi. 29](#)