

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Ötschergebietes. (I. Nachtrag).

Von

Theodor Trexler von Lindenau.

Im VII. Jahresberichte des Wiener entomologischen Vereines pro 1896 veröffentlichte ich unter „Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Ötschergebietes“ 476

Arten, Varietäten u. Aberrationen von Macrolepidopteren.

In den Jahren 1897 und 1898 habe ich gleichfalls im Ötschergebiete gesammelt und bin ich in der Lage als Ergänzung weitere 93

Arten, Varietäten und Aberrationen zu publicieren, wodurch sich die Gesamtzahl der von mir beobachteten Macrolepidopteren auf 569

stellt.

In meiner oben erwähnten ersten Publication über das Ötschergebiet habe ich eine unrichtige Angabe gemacht, welche ich hiemit richtig stelle:

Auf pag. 41 ist *Nudaria Senex*, Hb. zu streichen und hiefür *Nudaria Mundana* L. zu setzen.

Wie in den früheren Jahren, so habe ich auch jetzt hauptsächlich den Nachtfang beim elektrischen Licht cultiviert, wodurch ich schon wiederholt in den Besitz sehr guter und seltener Arten kam. Die am elektrischen Lichte gefangenen Thiere habe ich diesmal der besseren Übersicht halber mit einem * bezeichnet.

Unter den nachstehend verzeichneten Arten befinden sich auch zwei, welche neu für Nieder-Österreich sind und zwar: *Agrotis Molothina* Esp. und *Hadena Rubrivena*, Tr.

Schließlich muss ich noch Herrn Dr. H. Rebel für die mir bei der Determinierung bewiesene freundliche Unterstützung meinen besten und verbindlichsten Dank aussprechen.

476. *Lycaena Argiades* Pall. Ein Stück am 27. Juli im Sackgraben.
 477. „ *Cyllarus* Rott.
 478. *Melitaea Didyma* ab. *Meridionalis* Stgr. Am 14. Mai und
 16. Juni je ein ♀, von welchen das eine dunkle,
 grünlich schwarze Stück mit einem im k. k. Hof-
 museum befindlichen Stücke vollkommen übereinstimmt.
 479. *Hesperia Thaumasa* Hufn. }
 480. „ *Lineola* O. } Ende Juli im Sackgraben.
 481. *Thyris Fenestrella* Sc. 1 ♂ am 16. Juli in der Steinleiten.
 482. *Zygaena Pilosellae* ab. *Pluto* O. am 16. Juli in Neubruck.
 *483. *Nudaria Mundana* L. Im VII. Jahresbericht des Wiener Ent.
 Vereines auf pag. 41 hatte ich statt dieser Art irr-
 thümlich *Nudaria Senex* Hb. angeführt.
 *484. *Zeuzera Pirina* L. 1 ♂ Mitte August.
 *485. *Lasiocampa Pini* var. *Montana* Stgr. Mitte Juni erbeutete
 ich 2 ♂♂.

Von *Lasiocampa Pini* L. fieng ich auch Stücke,
 bei welchen die Vorder- und Hinterflügel gleichförmig
 rothbraun gefärbt sind; sie dürften jenen Stücken ent-
 sprechen, welche im Handel mit ab. *Brunnea* bezeich-
 net werden.

Unter den vielen *Pini* ♂♂, welche an das
 elektrische Licht kamen, erbeutete ich auch einigemal
 Stücke, welche durch ihre abnorm dunkle Färbung
 derart von allen anderen abweichen, dass sie speciell
 erwähnt zu werden verdienen.

Die Vorderflügel sind einfarbig tief braunschwarz,
 sammtartig, von einer gleichfalls einfarbig rothbraunen
 scharf gezähnten Binde durchzogen. Die Hinterflügel
 sind schmutzig braunschwarz.

Das Hauptmerkmal für diese Stücke ist aber das
 gänzliche Fehlen der bei allen anderen *Pini*-
 Stücken mehr oder weniger auftretenden grau-
 weissen Zeichnung.

Jedenfalls können diese Stücke als eine Localvarität
 betrachtet werden.

- *486. *Drepana Cultraria* F. Mitte Juli.
 *487. *Harpyia Erminea* Esp. Vom 8.—24. Juni kam diese Art
 häufig an das elektrische Licht.
 *488. *Pygaera Pigra* Hufn.

- *489. *Cymatophora Duplaris* L. Mitte Juli.
- *490. *Acronycta Cuspis* Hb. 2 ♂ am 8. und 16. Juli.
- *491. *Agrotis Molothina* Esp. Neu für Nieder-Österreich.
Von dieser seltenen *Noctua* erbeutete ich am 14. Juni 1898, 2 bereits stark abgeflogene ♀♀ und dürfte die eigentliche Flugzeit Ende Mai oder Anfangs Juni sein. Als bisheriger Fundort in Österreich ist Brünn bekannt (Viertl). In Ungarn wurde sie bei Budapest gefangen. (Anker).
- *492. *Agrotis Janthina* Esp. Ein tadelloes reines ♂ am 17. Juli.
- *493. " *Sobrina* Gn. Von dieser seltenen *Noctua* erbeutete ich am 14. August ein schönes reines ♀. Im k. k. Hofmuseum befindet sich gleichfalls ein Stück aus Nieder-Österreich (Salmansdorf).
- *494. *Agrotis Stigmatica* Hb. 1 ♂ am 14. August.
- *495. " *Festiva* Hb. Am 10. Juni ein bereits stark abgeflogenes ♂.
496. " *Simplonia* H. G. Am 23. Juni erbeutete ich ein reines ♂ am Ötscher (Riffelsattel, 1284 m).
- *497. *Charaeas Graminis* L. Ein reines ♂ am 14. August.
- *498. *Mamestra Thalassina* Rott. Vom 7. Juni bis 14. Juli kam diese Eule häufig an das Licht.
- *499. " *Persicariae* ab. *Unicolor* Stgr.
- *500. " *Dentina* Esp. Ende Juni häufig.
- *501. *Dianthoecia Nana* Rott. Am 7. Juni 1 ♂.
- *502. *Hadena Rubrirena* Tr. Neu für Nieder-Österreich. Von dieser seltenen *Noctua* erbeutete ich Mitte Juli ♂ ♀. Bemerkenswerth ist, dass die von mir gefangenen Stücke sich von anderen *Rubrirena*-Stücken unterscheiden. Sie sind kleiner und schwächtiger gebaut, und weisen die Vorderflügel eine lichtgrau angelegte Wellenlinie auf. Ob diese Stücke eine Annäherung zur var. *Hereyniae* Stgr. bilden, bin ich nicht in der Lage zu entscheiden, da mir diese Form unbekannt ist. *Rubrirena* wurde von Rogenhofer und Dorfmeister öfters in Affenz gefangen. Herr Sicher hat sie in Preth (Küstenland) erbeutet. [VII. Jahresbericht des Wiener ent. Vereines pag. 39]. Ausserdem soll sie noch bei Brünn vorkommen.
- *503. *Hadena Sordida* Bkh. Am 9. Juni 1 ♂.

- *504. *Hadena Basilinea* F. Häufig im Juni.
- *505. „ *Rurea* F. Häufig von Mitte Juni bis Mitte Juli.
- *506. „ „ ab. *Alopecurus* Esp. Seltener wie die Stammform. Ich erbeutete ausserdem noch schöne Übergänge zu dieser Form.
- *507. „ *Didyma* ab. *Nictitans* Esp.
- ✓ *508. „ *Ophiogramma* Esp. Von dieser in Österreich so selten vorkommenden *Noctua* erbeutete ich Mitte Juli 2 ♂♂. Lederer fing sie vor vielen Jahren in Floridsdorf. Herr Krüger in Ober-Österreich bei Taufkirchen und Herr Hauptmann Hirschke am Stilsfer-Joch.
- ✓ *509. „ *Strigilis* ab. *Latruncula* Lang. } Mitte Juni.
- ✓ *510. „ „ ab. *Aethiops* Hw. }
- *511. *Naenia Typica* L. Mitte Juli in abgeflogenem Zustande.
- *512. *Leucania Conigera* F. Mitte Juni.
- *513. *Mithymna Imbecilla* F. Gegen Ende Juni.
- *514. *Amphipyra Tragopoginis* L. Ein abgeflogenes ♂ am 29. August.
- *515. *Taenioecampa Pulverulenta* Esp. Mitte April ein abgeflogenes ♂.
- *516. *Dyschorista Fissipuncta* Hw. Anfangs Juli.
- *517. *Plusia Moneta* F. Mitte August ein ♂.
- *518. *Prothymia Viridaria* Cl. Ende Juli, häufig im Sackgraben; hie und da auch am elektrischen Licht.
519. *Zanclognatha Grisealis* Hb. Von Mitte Juni bis Mitte Juli in Neubruck, Kienberg und St. Anton.
520. *Herminia Tentacularia* L. Ende Juni in St. Anton.
521. *Acidalia Dimidiata* Hufn. Ende Juli klopfte ich den Falter aus Hecken.
- *522. „ *Pallidata* Bkh.
523. „ *Holosericata* Dup. Ein ♀ in St. Anton.
- *524. „ *Aversata* ab. *Spoliata* Stgr. Mitte Juni.
525. „ *Remutaria* Hb. Anfangs Juni.
526. „ *Immutata* L. Juni.
- *527. *Zonosoma Pendularia* Cl. Ende Juni.
- *528. „ *Linearia* Hb. Von Mitte Juni bis Mitte Juli.
- *529. *Abraxas Grossulariata* L.
- *530. *Eurymene Dolabraria* L.
- *531. *Hybernia Marginaria* Bkh. Ein ♂ am 10. April.
- *532. *Phigalia Pedaria* F. Ein ♂ am 24. Februar.

- *533. *Boarmia Abietaria* Hb. Ausser am elektrischen Licht noch Mitte Juli in St. Anton.
- *534. „ *Roboraria* Schiff. Vom 7. bis 27. Juni kamen die ♂♂ oft an das Licht. Ich erbeutete auch ein ziemlich dunkles Stück, welches einen Übergang zur ab. *Infuscata* Stgr. bildet.
- *535. „ *Luridata* Bkh. Nur ein stark abgeflogenes ♂ am 17. Juni.
- *536. *Gnophos Glaucinararia* var. *Falconaria* Frr. Ein sehr gut erhaltenes ♂ am 27. Juni.
537. „ *Dilucidaria* Hb. Nicht selten an Felsen im Sackgraben und in St. Anton. Mitte August.
- *538. *Halia Wauaria* L. Am 28. Juni und 13. Juli je ein ♂.
- *539. „ *Brunneata* Thnb. Am 27. Juni ein ♂.
540. *Phasianc Petraria* Hb. In Anzahl Ende Mai in Fürteben.
541. *Ortholitha Bipunctaria* ab. *Gachtaria* Frr. Im Juli an Felsen.
- *542. *Scotosia Vetulata* Schiff.
- *543. „ *Badiata* Hb. Am 10. April ein ♂.
- *544. *Lygris Reticulata* F. Am 15. August ein ♂.
- *545. *Cidaria Bicolorata* Hfn.
- *546. „ *Variata* var. *Obeliscata* Hb. Mitte Juli ein abgef. ♂.
- *547. „ *Siterata* Hufn. Mitte Juni.
- *548. „ *Aptata* Hb. Mitte Juli.
- *549. „ *Viridaria* F. Mitte Juni klopfte ich sie auch häufig aus Hecken.
550. „ *Salicata* Hb. fand ich in Gemeinschaft mit *Cidaria Achromaria* Lah. am 23. Juni am Ötcher in einer Höhe von circa 1400 m.
- *551. „ *Montanata* Bkh. fand ich auch häufig von Mitte bis Ende Juni in Lackenhof und Gaming (Filzmoos).
- *552. „ *Quadrifasciaria* Cl. Ein abgeflogenes ♂ am 11. Juli.
553. „ *Achromaria* Lah. Siehe *Cidaria Salicata* Hb.
- *554. „ *Rivata* Hb. Ein ♂ am 11. Juli.
- *555. „ *Unangulata* Hw. Ein ♀ am 8. Juni.
- *556. „ *Albicillata* L. Ein ♂ am 12. Juni.
- *557. „ *Alechmillata* L. Gegen Ende Juni.
- *558. „ *Adaequata* Bkh. Mitte August.
- *559. „ *Silaceata* Hb. Am 20. Juni ein ♀, am 17. Juli ein ♂.
- *560. „ *Corylata* Thnb. Im Juni.

- *561. *Cidaria Rubidata* F. Ein ♀ am 20. Juni.
- *562. *Eupithecia Linareata* F. Mitte Juni.
- *563. „ *Rectangulata* ab. *Nigrosericeata* Hw. Mitte Juni ein ♂.
- *564. „ *Innotata* Hufn. Ein ♂ Ende Juni.
- *565. „ *Plumbeolata* Hw. Ein ♀ am 23. Juni am Ötscher.
- *566. „ *Valerianata* Hb. Ein ♂ am 12. Juli.
567. „ *Satyrata* Hb. Ein ♀ am 25. Juni in Lackenhof.
- *568. „ *Campanulata* H. S. Ein ♀ am 9. Juni.
- *569. „ *Distinctaria* H. S. (*Extraversaria* H. S.) Ein ♀ am 27. Juni.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [09](#)

Autor(en)/Author(s): Trexler Theodor

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Ötschergebietes. \(I. Nachtrag\). 25-30](#)