

Ein lepidopterologischer Ausflug in die Euganaeen u. nach Battaglia in Ober-Italien.

Von

Heinrich Neustetter in Wien.

Anfang Mai dieses Jahres beschloss ich eine Reise nach dem Süden zu machen und begab mich zuerst nach Battaglia, um von da aus in der Bergkette der Euganaeen, sowie in Battaglia selbst mit seiner nächsten Umgebung zu sammeln.

Mein Aufenthalt währte vom 4. Mai bis 8. Juni, war also viel zu kurz, um eine eingehende Beschreibung liefern zu können; ich will vorerst nur flüchtig bemerken, dass die Bergkette der Euganaeen isoliert in der venezianischen Tiefebene liegt und vulkanischen Ursprunges ist.

Die höchste Erhebung ist der Mte. Ventolone mit 586 m. Diese Berge sind alle sehr steil, so dass man sie eigentlich für viel höher hält, als sie in Wirklichkeit sind. Die meisten derselben sind fast ganz mit Eichen, Buchen, Ahorn, Edelkastanien und verschiedenem Nadelholz bewachsen, welche vereint mit Akazien, Weissdorn, Schlehen, Berberitzen und anderen stacheligen Sträuchern eine fast undurchdringliche Wildnis bilden. In den Thälern und in der Ebene, besonders aber in den vielen Schlossgärten sind südliche Pflanzen, wie Pinien, Cypressen, Magnolien, Feigen, Orangen, Citronen, Oliven, Oleander und viele andere vertreten. Von gewöhnlichen Bäumen wären besonders Weiden, Pappeln, Linden Eschen, Erlen und Platanen hervorzuheben. Ausserdem kommen fast alle Obstbäume vor. Die niederen Pflanzen waren mir vielfach unbekannt und dürften wohl dem Süden eigenthümlich sein. Battaglia selbst, welches seine Entstehung den schwefelhaltigen Heilquellen der Euganaeen verdankt, liegt nur in geringer Höhe über dem Meeresspiegel und ist durch einen breiten Kanal einerseits mit der Etsch, anderseits mit der Brenta verbunden. Von diesem

Kanäle werden wieder kleinere Kanäle abgeleitet, welche das ganze Land bewässern und streckenweise viele Sümpfe bilden. Der Pflanzenwuchs ist derselbe wie oben angegeben und wäre noch der Weinstock, die Maulbeere und viele Sumpfpflanzen beizufügen.

Im Nachfolgenden liefere ich ein Verzeichnis der von mir beachteten Arten und Varietäten:

Papilio Podalirius L. und ab. *Zanclaeus* Z. Von ersterer erbeutete ich einige abgeflogene Stücke auf dem Mte. Cello am 5. Mai. Die var. *Zanclaeus* erhielt ich aus einer in Battaglia gefundenen Raupe und beobachtete sie in den ersten Tagen des Juni am Mte. Picolo und Mte. Alto.

„ *Machaon* L., ferner var. *Sphyrus* Hb. und Aberrationen. Die Stammart überall häufig, darunter Stücke der var. *Sphyrus* angehörend, denn die Grundfarbe aller Flügel ist dunkler und die schwarzblaue Binde der Hinterflügel springt bis an den Querast der Mittelzelle vor und schliesst bei einem am Mte. Picolo gefangenen Stücke denselben ganz ein. Ferner fieng ich an gleicher Stelle wie oben ein Stück mit rothem Fleck am Vorderrande der Hinterflügel und am Mte. Alto ein Stück mit sehr dunkelgelber Grundfarbe; alle Rippen sind bei denselben sehr stark schwarz bestäubt; die dunklen Binden sind so breit, dass die, bei gewöhnlichen Stücken im Apicaltheile der Vorderflügel stehenden gelben Flecken ganz verschwunden sind; auch die gelben Saumflecke sind viel kleiner als gewöhnlich.

Aporia Crataegi L. Häufig in der Ebene in grossen Stücken.

Pieris Brassicae L. Ebenso häufig wie vorige mit stark schwarzer Bestäubung, auch auf Bergen.

„ *Rapae* L. und ab. *Leucotera* Stef. Die Stammart überall häufig, darunter einzeln die ganz weisse ab. *Leucotera*.

„ *Napi* L. Ueberall häufig wie vorige in grossen Exemplaren.

Anthocharis Cardamines L. Diese Art beobachtete ich überall einzeln in kleinen Stücken während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes. Var. *Turitis* scheint hier nicht vorzukommen.

Leucophasia Sinapis L. v. gen. 1 *Lathyri* Hb. und ab. ♀ *Erysimi* Bkh. Ueberall, einzeln darunter ab. *Erysimi*.

Colias Hyale L. Häufig an allen Orten in grossen Stücken.

- Colias Edusa* F. und ab. *Helice* Hb. Seltener als vorige doch überall, von der ab. *Helice* erbeutete ich ein Stück am Monte Cello. 28. Mai.
- Rhodocera Rhamni* L. Ueberall einzeln.
- Thecla Rubi* L. Ich fieng nur ein Stück am 19. Mai am Fusse des Mte. Pendice.
- Polyommatus Dispar* Hw. Ich fieng nur zwei ♀ ♀ auf Sumpfwiesen bei Battaglia, dieselben sind sehr gross, die schwarzen Punkte der Vorderflügel sind in lange Strahlen ausgezogen, die Hinterflügel sind dunkel und nur am Saume und auf den Rippen rothgold bestäubt.
- „ *Dorilis Hufn.* Ueberall einzeln beobachtet.
- „ *Phlaeas* L. Wie vorige in grossen Exemplaren.
- Lycaena* *Argiades* Pall., var. *Polychsperchon* und ab. *Coretas* O. Sowohl die Stammart, als auch die anderen Formen einzeln in den Thälern und der Ebene beobachtet.
- „ *Argyrotoxus* Bgstr. Sehr vereinzelt und nur in den Ebenen in kleinen Stücken beobachtet, die ♀ ♀ mit stark gelber Randbinde auf allen Flügeln.
- „ *Argus* L. Ein abgeflogenes Pärchen in der Ebene gefangen.
- „ *Orion* Pall. Einzeln auf dem Mte. Cello gefangen.
- „ *Baton* Bgstr. Einzeln wie vorige, doch überall in grossen Stücken bis Ende Mai beobachtet.
- „ *Astrarche* Bgstr. Diese Art fieng ich auf allen von mir besuchten Bergen in grossen Stücken mit auffallend breiter Randbinde.
- „ *Icarus* Rott. var. *Cellina* Aust. und ab. ♀ *Caerulea*. Die Stammart überall häufig, darunter einzeln ab. *Caerulea*. Die var. *Cellina* fieng ich in grossen dunkelblauen Stücken, die oberseits fast wie *Argus* aussehen. Im Gegensatze zu diesen *Cellina* fieng ich im Juli desselben Jahres bei Fiume var. *Cellina* in winzig kleinen hellblauen Exemplaren mit etwas weniger ausgeprägter Punktreihe am unteren Rande der Hinterflügeloberseiten. Da diese Form von Fiume so stark von der aus Italien abweicht und am erstgenannten Orte zahlreich fliegt, so würde sie wohl einen eigenen Namen verdienen.

Lycaena Escheri Hb. Einige Stücke am Mte. Cello und Mte. Oro gefangen.

„ *Bellargus* Rott. Ueberall doch nur einzeln.

„ *Hylas* Esp. Wie vorige.

„ *Argiolus* L. Einige Stücke am Fusse des Mte. Pendice erbeutet.

„ *Minima* Fuessl. An allen Orten häufig.

„ *Semiargus* Rott. Nur auf den Bergen in grossen Stücken mit breitem, schwarzen Rande gefangen.

„ *Cyllarus* Rott. und Aberration. In den Thälern der Euganaeen überall einzeln. Die Stücke weichen sehr von der typischen Art ab, die ♂♂ sind glänzend hellblau und grösser, die ♀♀ alle oben schwarz ohne blauen Anflug; die Unterseite ist hellgrau mit an der Flügelwurzel grüner Bestäubung, die Augenflecke sind auf der Hinterflügel-Unterseite mehr oder weniger verloschen und fehlen bei 1 Stücke ganz. Ausserdem fieng ich am Fusse des Mte. Pendice ein ♂, das oberseits nicht von *L. Semiargus* zu unterscheiden ist, denn dasselbe ist dunkelbau mit sehr breitem, schwarzem Rande; ebenso ist der schwarze Strich am Querast der Mittelzelle vorhanden. Die Unterseite aber ist den vorher beschriebenen *Cyllarus* gleich.

Lymenitis Camilla Schiff. Anfangs Juni einzeln in den Thälern der Euganaeen.

Vanessa C. Album L. Einige Stücke an Bergabhängen gefangen.

„ *Urticae* L. Ueberall an Nessel.

„ *Jo* L. Wie vorige.

„ *Antiopa* L. Einzeln in den Gärten beobachtet.

„ *Cardui* L. Ueberall doch nur einzeln.

Melitaea Phoebe Knoch. Var. *Occitanica* und var. *Aetherie* Hb. Die typische *Phoebe* kommt hier nicht vor, sondern die etwas grössere, stärker gezeichnete *Occitanica* und die helle, fast ganz einfärbige *Aetherie*. Beide einzeln in den Euganaeen.

„ *Didyma* O. var. *Meridionalis* Stgr. und var. *Occidentalis* St. Die Stammart kommt ebenfalls nicht vor, sondern überall nur die genannten Varietäten, erstere häufig, letztere nur in einzelnen Exemplaren.

- Melitaea Dictynna Esp. Ich fieng nur ein Stück bei Galzignano in den Euganaeen.
- „ Athalia Rott. Ueberall häufig in kleinen Stücken beobachtet.
- „ Aurelia Nick. Ueberall, doch viel seltener als vorige in kleinen, dunklen Stücken.
- Argynnis Euphrosyne L. Zwei abgeflogene Stücke am Mte. Pendice gefangen.
- „ Dia L. Auch diese Art war schon abgeflogen, als ich in die Euganaeen kam, doch sah ich sie überall.
- „ Lathonia L. Ueberall einzeln.
- „ Aglaja L. Anfangs Juni einzeln um Battaglia.
- Melanargia Galathea var. Procida Hbst. Anfangs Juni überall häufig in grossen Exemplaren.
- Pararge Maera L. In den Euganaeen in abgeflogenen Stücken beobachtet.
- Megaera L. Ueberall, doch wie vorige schon abgeflogen.
- Pararge Aegeria L. Einzeln in der Stammart und in einer Zwischenform, die den Uebergang zu Egerides bildet, beobachtet. Ueberall.
- Epinephele Janira L. und var. Hispulla Hb. Die Stammart und var. von Ende Mai an überall sehr zahlreich.
- Coenonympha Iphis Schiff. Im Mai überall einzeln.
- „ Arcania L. Anfangs Juni überall häufig.
- „ Pamphilus L. und var. Lyllus Esp. Die Stammart war im halben Mai schon abgeflogen, doch erschien noch im selben Monat die 2. Generation Lyllus. Beide überall häufig.
- Spilothyrus Alceae Esp. Den ganzen Mai hindurch überall einzeln.
- „ Altheae Hb. Anfangs Juni einzeln am Fusse des Mte. Cello gefangen.
- Syrictus Carthami Hb. Im Mai überall einzeln.
- „ Alveus Hb. var. Cirsii Rb. Ueberall einzeln.
- „ Serratulae Rbr. Ein Stück im Parke von Battaglia gefangen.
- „ Malvae L. Ueberall häufig in grossen, hellen Stücken.
- „ Sao Hb. Im Mai einige Stücke in den Euganaeen gefangen.
- Nisoniades Tages L. und ab. Unicolor Frr. Die Stammart überall häufig, darunter einzeln ab. Unicolor.

- Hesperia Thaumasa* Hufn. Ueberall einzeln.
 „ *Sylvanus* Esp. Ueberall häufig.
 „ *Comma* L. Wie vorige. Ueberall häufig.
- Smerinthus Ocellata* L. Einzeln in Battaglia gefangen.
 „ *Tiliae* L. Ueberall beobachtet.
 „ *Populi* L. Ein Stück in Battaglia gefangen.
 „ *Quercus* Schiff. Am 24. Mai fieng ich ein frisches ♂ am Mte. Oro.
- Macroglossa Stellatarum* L. Ueberall häufig an Salbei.
 „ *Bombyliformis* O. Einige Stücke an Salbei und Scabiosen gefangen.
- Sesia Chrysidiformis* Esp. Ich fieng ein Stück am 31. Mai an einem Grasstengel. Carara.
- Zygaena Meliloti* Esp. var. *Stenzi* Frr. und ab. *Teriolensis* Sp.?
 Anfang Mai schöpfte ich am Mte. Alto eine kleine Anzahl Raupen, die ich für *Meliloti* hielt. Die kleinsten dieser Raupen giengen in Ermangelung des Futters, welches ich in Folge der weiten Entfernung nicht immer herschaffen konnte, zu Grunde, einige grössere aber verpuppten sich und ergaben Ende Juni in Wien 5 Stück Falter. Dieselben sind alle sechsleckig mit dichter Bestäubung der Vorderflügel und etwas breiter schwarz eingesäumten Hinterflügeln, 4 Stück 2 ♂ 2 ♀ haben alle einen rothen Gürtel und gehören zur var. *Stenzi* Frr., ein Stück aber hat ganz schwarzen Hinterleib und dürfte mit der von Herrn Calberla im 8. Band des Entom. Vereines Iris beschriebenen var. *Teriolensis* Sp. identisch sein.
- „ *Filipendulae* L. var. *Oehsenheimeri* Z. und ab. *Cytisi* Hb. Beide Formen gefangen und aus Raupen gezogen. Ueberall.
- Syntomis Phegea* L. und ab. *Phegeus* Esp. Die Stammart anfangs Juni überall häufig. Von der ab. *Phegeus* zog ich ein Stück aus der Raupe.
- Naelia Ancilla* L. Anfangs Juni einzeln in den Euganaeen gefangen.
Earias Chlorana L. Ein Stück an einer Weide gefangen. Battaglia.
Lithosia Muscerda Hufn. Eine kleine Anzahl aus in Battaglia auf sumpfigen Wiesen gefundenen Raupen gezogen.
 „ *Griseola* Hb. Ebenfalls mit voriger gezogen, die Raupen an Baumstämmen gefunden.

- Lithosia Lurideola* Zink. Aus Raupen gezogen.
- „ *Complana* L. Wie vorige.
- „ *Unita* Hb. Ein Stück am Lichte gefangen.
- „ *Sororecula* Hufn. Einige Stücke am Lichte gefangen.
- Emydia Striata* L. Ein Stück aus einer Raupe geschlüpft.
- Euchelia Jacobaea* L. Einzeln am Lichte gefangen.
- Aretia Caja* L. Einige Raupen gefunden. Battaglia.
- „ *Villica* L. Häufig an Laternen sitzend. Battaglia.
- Spilosoma Fuliginosa* L. Wie vorige.
- „ *Lubricipeda* Esp. Ueberall einzeln beobachtet.
- „ *Menthastri* Esp. Wie vorige.
- „ *Urticae* Esp. Wie vorige.
- Psyche Unicolor* Hufn. Die Säcke häufig an Baumstämmen.
- „ *Vilosella* O. Wie vorige.
- „ *Febretta* Bojer. Einige leere Säcke in Battaglia an Zäunen gefunden.
- „ *Opacella* H. S. Die leeren Säcke an Bäumen angesponnen. Ueberall.
- Epichnopteryx Bombycella* Schiff. Die Falter flogen anfangs Mai abends häufig auf Sumpfwiesen, um Battaglia. Die Stücke sind etwas dunkler als mitteleuropäische.
- Fumea Nudella* O. Die Säcke sehr zahlreich an Zäunen angesponnen. Battaglia.
- „ *Crassiorella* Brd. Wie vorige.
- Leucoma Salicis* L. Als Raupe überall häufig beobachtet.
- Porthesia Chrysorrhoea* L. Wie vorige.
- „ *Similis* Fuessl. Ebenfalls als Raupe beobachtet.
- Oenocera Dispar* L. Raupe überall häufig.
- Bombyx Trifolii* Esp. Die Raupen einzeln im Grase gefunden. Zwei daraus erzogene ♀♀ sind fast ganz rothbraun ohne Binde.
- „ *Rubi* L. Ueberall häufig.
- Lasiocampa Pruni* L. Anfangs Juni ein Stück an einer Laterne gefangen.
- „ *Quercifolia* L. Am Lichte gefangen.
- Saturnia Pyri* Schiff. Einzeln im Mai am Lichte gefangen.
- „ *Pavonia* L. Die Raupen häufig an Brombeerstauden gefunden.
- Aglia Tau* L. Ueberall, aber einzeln beobachtet.
- Drepana Binnaria* Hufn. In den Euganeen einzeln an Eichen.

Harpyia Erminea Esp. 4 Stück in Battaglia an Laternenpfählen gefunden.

Lophopteryx Cuculla Esp. Ein Stück Ende Mai bei Battaglia gefunden.

Pterostoma Palpina L. Häufig an Laternen und Planken. Ueberall.

Cnethocampa Pityocampa Schiff. Ein Stück aus einer im Parke von Battaglia gefundenen Raupe gezogen.

Phalera Bucephala L. Ueberall häufig.

Cymatophora Or. T. Ueberall häufig.

Diloba Caeruleocephala L. Die Raupen überall häufig auf Schlehen.

Acronycta Aceris L. In Battaglia häufig.

„ *Euphrasiae* Brahm. Ein Stück aus unbeachteter Raupe gezogen.

Agrotis Angur F. Einzeln am Lichte gefangen.

„ *Obscura* Brahm. Ein Stück am Lichte.

„ *Pronuba* L. Ueberall beobachtet.

„ *C. nigrum* L. Wie vorige.

„ *Simulans* Hufn. Einige Stücke am Lichte.

„ *Putris* L. Um Battaglia häufig abends an blühenden Blumen.

„ *Exclamationis* L. Ueberall einzeln beobachtet in sehr scharf gezeichneten Exemplaren.

„ *Nigricans* L. Ein Stück am Lichte gefangen.

„ *Saucia* Hb. ab. *Margaritosa* Hw. Ebenfalls ein Stück in Battaglia am Lichte gefangen.

Mamestra Leucophaea View. Ueberall häufig.

„ *Advena* F. Ein Stück in Battaglia gefangen.

„ *Nebulosa* Hufn. Ebenfalls nur ein Stück.

„ *Brassicae* L. Ueberall sehr zahlreich.

„ *Oleracea* L. Wie vorige.

„ *Dentina* Esp. Am Mte. Oro einzeln an Felsen.

„ *Trifolii* Rott. Einzeln abends an Blumen.

„ *Chrysozona* Bkh. Einzeln abends an Blumen.

„ *Cappa* Hb. Ein Stück am Mte. Cello an Felsen.

Dianthoecia Capsincola Hb. Häufig an Blumen.

Hadena Sublustris Esp. Ein Stück in Battaglia.

„ *Strigilis* Cl. und ab. *Latruncula* Lang. Beide Formen überall häufig.

Trachea Atriplicis L. Ebenfalls überall häufig.

Leucania Pallens L. ab. *Ectypa* Hb. Nur in der röthlichen ab. *Ectypa*, häufig an Blumen.

- Leucania* *Obsoleta* Hb. Einige Stücke an Blumen gefangen.
 „ *L: album* L. Einige Stücke an Blumen gefangen.
 „ *Albipuncta* F. Ueberall sehr häufig an Blumen.
 „ *Lithargyria* Esp. Ueberall sehr häufig an Blumen.
Grammesia *Trigrammica* Hufn. Häufig an Blumen.
Caradrina *Morpheus* Hufn. Einige Exemplare an Blumen gefangen.
 „ *Kadenii* Frr. Ein Stück am Mte. Rhua vom Grase aufgescheucht.
 „ *Ambigua* F. Ueberall einzeln am Lichte und Blumen gefangen.
 „ *Taraxaci* Hb. Einige Stücke an Blumen gefangen.
Acosmetia *Caliginosa* Hb. Einzeln auf Sumpfwiesen aus dem Grase aufgescheucht.
Orthosia *Pistacina* F. ab. *Rubetra* Esp. Ein Stück aus einer in Battaglia gefundenen Raupe gezogen.
Xanthia *Fulvago* L. Ein Exemplar in einem Spinnengewebe gefunden.
Scoliopteryx *Libatrix* L. Ueberall sehr gemein.
Colophasia *Lunula* Hfn. In Battaglia abends häufig am Lichte und Blumen.
Cueullia *Verbasci* L. Die Raupen überall häufig an *Verbascum*.
 „ *Lychnitis* Rbr. Ich fand am Mte. Oro an *Verbascum* einige Raupen, die ich zu dieser Art gehörig halte.
 „ *Umbratica* L. Ueberall, doch nur einzeln.
Plusia *Triplasia* L. Ein Stück abends an Blumen gefangen. Battaglia.
 „ *Chrysitis* L. Zugleich mit voriger an Blumen.
 „ *Festucea* L. Ein Stück am Lichte. Battaglia.
 „ *Gutta* Gn. Häufig an Blumen. Ueberall.
 „ *Gamma* L. Ueberall.
Anophia *Leucomelas* L. Ein Stück bei Galzignano auf einer Sumpfwiese gefangen.
Heliaca *Tenebrata* Sc. Ueberall häufig.
Heliopsis *Dipsaceus* L. Ueberall einzeln an Salbei.
Acontia *Lucida* Hufn. Ueberall häufig.
 „ *Luctuosa* Hb. Ueberall, doch weniger häufig.
Thalpocharis *Dardoini* B. Einzeln anfangs Juni am Mte. Pendice.
Erastria *Fasciana* L. Im Parke von Battaglia häufig.
Prothymia *Viridaria* Cl. Ueberall einzeln.

- Agrophila Trabealis* Sc. Ueberall häufig.
Euclidia Mi Cl. Ueberall häufig.
Grammodes Algira L. Ueberall einzeln.
Pseudophia Lunaris Schiff. Einzeln am Mte. Oro in abgeflogenen
 Stücken beobachtet.
Helia Calvaria F. Ein Stück an einer Weide sitzend, gefunden.
 Battaglia.
Zanclognatha Tarsiplumalis Hb. Ueberall einzeln.
 „ *Tarsicristalis* Hb. Ein Stück am Mte. Rhua
 aus einem Gebüsch aufgescheucht.
 „ *Grisealis* Hb. Ein Stück in Battaglia gefangen.
 „ *Tarsipennalis* Tr. Ueberall einzeln beobachtet.
Madopa Salicalis Schiff. Einzeln abends an Blumen.
Hypena Rostralis L. Sehr häufig am Lichte gefangen.
 „ *Proboscidalis* L. Ein Stück in meinem Zimmer
 gefangen.
Hypenodes Costastrigalis Stph. Abends ziemlich häufig an
 Blumen, doch in der Dämmerung schwer zu erbeuten.
Rivula Sericealis Sc. Ueberall am Lichte und an Blumen
 gefangen.
Pseudoterpna Pruinata Hfn. Einzeln auf den Euganaeen.
Nemoria Viridata L. Ueberall einzeln.
 „ *Porrinata* Z. Seltener als vorige in den Euganaeen.
Thalera Fimbrialis Sc. Einige Exemplare am Lichte erbeutet.
 Battaglia.
Jodis Putata L. Ueberall häufig.
 „ *Lactearia* L. Etwas weniger häufig.
Acidalia Pygmaearia Hb. Zahlreich am Mte. Oro erbeutet.
 „ *Trilineata* Sc. Einzeln in den Euganaeen.
 „ *Perochraria* F. R. Wie vorige doch überall.
 „ *Ochrata* Sc. Ueberall einzeln anfangs Juni.
 „ *Sericeata* Hb. 3 Stücke im Parke von Battaglia
 gefangen, wahrscheinlich überall.
 „ *Muricata* Hfn. Ein Stück aus der Raupe gezogen.
 „ *Dimidiata* Hfn. Ein Stück bei Galzignano gefangen.
 „ *Virgularia* Hb. var. *Bischoffaria* H. G. 2 Stücke in
 meinem Zimmer in Battaglia gefangen.
 „ *Straminata* Tr. Einige Stücke in Battaglia gefangen.
 „ *Pallidata* Bkh. Ueberall einzeln.
 „ *Subsericeata* Hw. Ueberall häufig.

- Acidalia* *Obsoletaria* Rbr. Wie vorige.
- „ *Herbariata* F. Ein Exemplar im Zimmer gefangen.
- „ *Filicata* Hb. Einige Stücke in den Euganaeen gefangen.
- „ *Rusticata* F. ab. *Fulpinaria* H. S. Ueberall einzeln, aber nur in der röthlichen ab. *Fulpinaria*.
- „ *Humiliata* Hfn. Ueberall einzeln.
- „ *Holosericata* Dup. 2 Exemplare am Mte. Cello gefangen.
- „ *Degeneraria* Hb. 2 Exemplare am Mte. Pendice vom Gebüsch geklopft.
- „ *Aversata* L. und ab. *Spoliata* Stgr. Ueberall beobachtet.
- „ *Immorata* L. Ueberall häufig.
- „ *Rubiginata* Hufn. Ueberall, die häufigste Art dieser Gattung.
- „ *Marginepunctata* Göeze. Ebenfalls sehr häufig.
- „ *Incanata* L. Ueberall sehr häufig.
- „ *Emutaria* Hb. 2 Exemplare, eines in Battaglia, das andere am Mte. Rhua erbeutet.
- „ *Umbellaria* Hb. Ueberall einzeln.
- „ *Ornata* Sc. Einzeln in sehr grossen Exemplaren.
- Zonosoma* *Punctaria* L. Einige abgeflogene Stücke in den Euganaeen aus dem Gebüsch gescheucht.
- Timandra* *Amata* L. Ueberall, doch nur einzeln.
- Pellonia* *Vibicaria* Cl. und var. *Strigata* Stgr. Beide Formen überall häufig.
- „ *Calabraria* Z. In den Euganaeen sehr zahlreich.
- Abraxas* *Grossulariata* L. In Battaglia sehr häufig als Raupe gefunden.
- „ *Marginata* L. Im Parke von Battaglia nicht selten von Pappeln geklopft.
- Stegania* *Trimaculata*. Im Parke von Battaglia einzeln an Pappeln.
- Cabera* *Pusaria* L. Ueberall einzeln von Erlen geklopft.
- „ *Exanthemata* Sc. und ab. *Pellagraria* Gn. Die Stammart überall häufig an Erlen und Pappeln, von der ab. *Pellagraria* fieng ich ein Stück in Battaglia.
- Rumina* *Luteolata* L. Einzeln in den Euganaeen.
- Epione* *Advenaria* Hb. Ein Stück am Mte. Alto gefangen.
- Venilia* *Macularia* L. Einzeln in den Euganaeen.
- Macaria* *Notata* L. Ein Exemplar in Battaglia am Lichte gefangen.

- Boarmia Perversaria B. Ein Exemplar an einer Mauer in Galzignano gefangen.
- „ Cinctaria Schiff. Einzeln am Lichte gefangen.
- „ Gemmaria Brahm. Ein Stück aus dem Gebüsch gescheucht. Battaglia.
- „ Consortaria F. Ein abgeflogenes Stück am Mte. Picolo gefangen.
- Ematurga Atomaria L. var. Orientaria Stgr. Ueberall häufig nur in der grossen gelben var. Orientaria.
- Phasiane Petraria Hb. 2 Stücke am Mte. Alto gefangen.
- „ Glarearia Brahm. Ueberall einzeln. Die ♂♂ sind sehr dunkelgelb, ♀♀ fast einfarbig weiss mit einer zusammenhängenden Binde auf der Flügeloberseite.
- „ Clathrata L. Ueberall häufig.
- Scoria Lineata Sc. Ueberall einzeln.
- Aspilates Strigilaria Hb. Einige Stücke am Fusse des Mte. Picolo gefangen.
- Lythria Purpuraria L. Einige Exemplare in den Euganaeen gefangen.
- Ortholitha Plumbaria F. Einzeln in den Euganaeen.
- „ Moeniata Sc. Ueberall, häufiger als vorige.
- „ Bipunctaria Schiff. Einzeln in grossen, gelblichen Exemplaren.
- Minoa Murinata Sc. ab. Cinerearia Bd. und ab. Monochroaria H. S. Beide Formen überall häufig.
- Anaitis Praeformata Hb. Ein Stück am Mte. Rhua gefangen.
- Cidaria Vividaria F. In den Euganaeen einzeln an Felsen.
- „ Fluctuata. Ueberall häufig.
- „ Ferrugata Cl. Ueberall häufig.
- „ Sociata Bkh. Ueberall häufig.
- „ Adaequata Bkh. Einzeln in den Euganaeen.
- „ Albulata Schiff. Wie vorige.
- „ Candidata Schiff. Einzeln von Erlen gescheucht.
- „ Bilineata L. Hier ausnehmend selten.
- „ Trifasciata Bkh. Einzeln an Zäunen. Battaglia.
- Eupithecia Oblongata Thnb. Ueberall einzeln.
- „ Innotata Hufn. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- Cledeobia Brunnealis Tr. Ein Exemplar am Mte. Cello gefangen.
- Aglossa Pinguinalis L. Ueberall häufig in Wohnungen und an Mauern.

- Asopia Costalis* F. Sehr zahlreich in den Euganaeen.
 „ *Farinalis* L. Ebenfalls überall häufig.
Scoparia Perplexella Zll. In den Euganaeen häufig an Felsen.
 „ *Dubitalis* H. Ueberall häufig.
 „ *Pallida* Crt. Ein Exemplar am Mte. Pendice gefangen.
Threnodes Pollinalis V. Häufig in den Euganaeen.
Odontia Dentalis V. Einzeln in Battaglia gefangen.
Eurrhyncha Urticata L. Anfangs Juni überall häufig.
Botys Octomaculata L. Ein Exemplar am Mte. Alto gefangen.
 „ *Nigrata* Sc. Einzeln in den Euganaeen.
 „ *Porphyralis* V. Ueberall einzeln.
 „ *Purpuralis* L. Häufiger als vorige.
 „ *Ostrinalis* H. Ebenfalls nicht selten.
 „ *Cespitalis* V. var. *Intermedialis*. Nur in dieser grossen Form überall sehr häufig.
 „ *Cilialis* H. Ein Stück in Battaglia am Lichte gefangen.
 „ *Repandalis* V. Ueberall häufig in der Ebene.
 „ *Nubilalis* H. Einige Stücke, Battaglia.
 „ *Pandalis* H. Ueberall zahlreich.
 „ *Hyalinalis* H. Wie vorige.
 „ *Aurantiacalis* F. R. Einige Exemplare bei Battaglia.
 „ *Trinalis* V. Ein Stück am Mte. Cello gefangen.
 „ *Ochrealis* Dp. Einige Exemplare bei Battaglia gefangen.
 „ *Sambucalis* V. Ein Exemplar in Battaglia gefangen.
 „ *Rubiginalis* H. Einzeln im Parke von Battaglia gefangen.
 „ *Fulvalis* H. Ein Stück am Wege nach Galzignano gefangen.
Eurycreon Verticalis L. Ueberall häufig.
Nomophila Noctuella V. Ueberall sehr häufig.
Pionea Forficaris L. Wie vorige.
Orobena Sophialis F. Häufig an Felsen in den Euganaeen.
Diasemia Literata Sc. Vor Sonnenuntergang überall häufig.
Agrotera Nemoralis V. Ueberall einzeln.
Hydrocampa Nymphaeata L. Sehr zahlreich auf Sumpfwiesen.
Parapoynx Stratiotata L. Verbreitet wie vorige.
Cataclysta Lemnata L. Sehr häufig auf Schilfrohr um Battaglia.
Schoenobius Mucronellus Zek. Ein Stück auf einer Sumpfwiese gefangen.
Chilo Cicatricellus H. Nach Sonnenuntergang einzeln.
Crambus Pratellus Cl. var. Ueberall sehr häufig in kleinen, fast ganz weissen Exemplaren mit verloschener Zeichnung.

- Crambus Chrysonuchellus* Sep. Wie vorige sehr häufig.
 „ *Saxonellus* Zek. Einzeln in den Euganaeen.
Etiella Zinckenella Tr. In der Ebene überall zahlreich.
Pempelia Semirubella Sep. Einige Stücke in den Euganaeen gefangen.
 „ *Obductella* F. R. Einzeln am Mte. Alto gefangen.
 „ *Ornatella* V. Ueberall einzeln.
Hypochalcia Melanella Tr. Ein Stück in Battaglia gefangen.
 „ *Dignella* H. 3 Stücke am Fusse des Mte. Alto gefangen.
 „ *Lignella* Hs. Ein Stück dieser seltenen Art fieng ich zugleich mit voriger am selben Orte, ein anderes am Mte. Picolo.
 „ *Germarella* Zek. 2 Exemplare in den Euganaeen gefangen.
Brephia Compositella Tr. Einzeln in den Euganaeen.
Ephestia Elutella H. Ein Stück in meinem Zimmer gefangen.
Teras Boscana F. Ein Stück in Battaglia gefangen.
Tortrix Corylana F. Ueberall sehr häufig.
 „ *Sorbiana* H. Ein Stück in Battaglia gefangen.
 „ *Heparana* V. Ueberall beobachtet.
 „ *Strigana* H. In den Euganaeen nicht selten.
 „ *Rigana* Sd. Ueberall einzeln beobachtet.
 „ *Löeflingiana* Ld. Ueberall häufig.
 „ *Gerningana* V. Ein Stück in den Euganaeen gefangen.
Sciaphila Wahlbomiana var. *Minorana* H. S. Sehr häufig im Parke von Battaglia.
Olindia Hybridana H. Ein Exemplar bei Battaglia gefangen.
Cochylis Hamana L. Einzeln in der Ebene.
 „ *Straminea* Hufn. Einige Stücke am Gipfel des Mte. Pendice und Mte. Alto gefangen.
 „ *Smeathmanniana* F. Ein Stück. Battaglia.
 „ *Kindermanniana* Tr. Einige Exemplare am Mte. Rhua erbeutet.
 „ *Rupicola* Crt. Ein Stück am Mte. Oro gefangen.
Penthina Profundana V. Ein Stück in Battaglia gefangen.
 „ *Salicella* L. Einzeln. Battaglia.
 „ *Pruniana* H. Ein Stück aus dem Gebüsch geklopft. Battaglia.
 „ *Rivulana* Sep. Ueberall häufig.

- Penthina Cespitana H. ? Ein Stück in Battaglia gefangen, das ich für diese Art halte.
- „ Urticana H. Ueberall häufig.
- „ Lacunana V. Im Park von Battaglia häufig.
- „ Rupestrana Dp. Ueberall häufig.
- „ Lucivagana Zll. Im Parke von Battaglia einige Stücke gefangen.
- „ Trifoliana H. S. Ein Stück in den Euganaeen gefangen.
- Aphelia Lanceolana H. Ueberall häufig.
- Grapholitha Graphana Tr. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- „ Fissana Froel. Einige Exemplare am Mte. Alto gefangen.
- „ Compositella F. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- Tmetocera Ocellana V. Einige Stücke in Battaglia gefangen.
- Strophosona Germmana H. Ein Stück am Mte. Pendice gefangen.
- Steganoptycha Minutana H. ? Ein fragliches Stück, weil sehr abgerieben in Battaglia gefangen.
- Phoxopteryx Comptana Frl. Ueberall häufig.
- „ Derasana H. Wie vorige.
- Blabophanes Feruginella H. Ueberall häufig.
- Tinea Fuseipunctella Fr. Ein Stück im Zimmer gefangen.
- „ Quereicolella H. S. Ein Stück am Mte. Picolo gefangen.
- Oecophora Flavifrontella V. Ueberall an Felsen.
- Adela Degenerella L. Ueberall häufig.
- „ Violella Tr. Häufig an Scabiosen.
- Nemotois Metallicus Poda. Häufig wie vorige.
- Swammerdamia Caesiella H. Ein Stück am Mte. Cello gefangen.
- Plutella Cruciferarum Zll. Ueberall häufig.
- Gelechia Distinctella Zll. Sehr häufig auf Wiesen. Ueberall.
- Brachmia Nigricostella Dp. Auf den Euganaeen häufig.
- Bryotropha Terrella V. Ueberall häufig.
- Lita Atriplicella F. R. Wie vorige.
- Teleia Sequax Hw. Ebenfalls überall häufig.
- Nannodia Stipella H. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- Doryphora Carchariella Zll. In den Euganaeen überall.
- Rhinosia Ferrugella V. Ueberall einzeln.
- Pleurota Aristella L. Ueberall häufig.
- Hyperecallia Citrinalis Sc. In den Euganaeen einzeln.
- Glyphipteryx Thrasonella Sep. In der Ebene häufig.
- Chauliodus Pontificellus H. Einzeln in Battaglia gefangen.

- Elachista Nigrella* Hw. Im Parke von Battaglia ein Stück gefangen.
- Coleophora Ornatipenella* Hb. Häufig in den Eujanacen.
- „ *Onosemella* Brahm. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- „ *Alcionipenella* Kll. Einzeln in Battaglia.
- Gracilaria Syringella* F. In Battaglia sehr häufig.
- Argyresthia Nitidella* F. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- Lithocolletis Ilicifoliella*. Zll. Ueberall häufig. Die Minen sehr zahlreich an Eichenblättern.
- „ *Salicicolella* Sirc. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- Lyonetia Clerkella* L. Sehr zahlreich um Gebüsch.
- Platyptilia Ochrodactyla* Hb. Ueberall häufig.
- Mimaesoptilus Phaeodactylus* Hb. Ein Stück in Battaglia gefangen.
- „ *Pterodactylus* L. Einige Stücke bei Battaglia gefangen.
- „ *Stigmatodactylus* Zll. Ueberall häufig.
- Leioptilus Lienigianus* Zll. Ein Stück am Mte. Alto gefangen.
- Aciptilia Pentadactyla* L. Ueberall sehr häufig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Neustetter Heinrich Michael

Artikel/Article: [Ein lepidopterologischer Ausflug in die Euganaeen u. nach Battaglia in Ober-Italien. 87-102](#)