

Nachtrags-Verzeichnis I.

Zusammengestellt von **Albert Naufock.**

Papilio Podalirius L. gen. aest. Zancleus Z. Diese eigentlich dem Süden angehörige Form, von welcher bisher in Niederösterreich vermeintlich nur Übergangsformen gefunden wurden, hat Herr Neustetter im Juli in mehreren sicheren Exemplaren am Eichkogel gefangen.

Die Exemplare sind vollkommen gleich mit jenen aus Croatien (Fiume) und Istrien, welche als unzweifelhafte „Zancleus Z.“ bestimmt wurden.

Als sicheres Merkmal gibt Hormuzaki an: „Der schwarze Innenrand der Hinterflügel ist durch die gelbe Grundfarbe in 2 Streifen geteilt“; Dr. Staudinger und Dr. Rebel aber nur: „Leib weiß (abdomine albo)“. — Richtig ist jedoch, daß beide Merkmale zusammen treffen müssen.

Übrigens haben die Herren Dr. Günner und Sicher diese Form „Zancleus“ auch in Kalksburg und Herr Maurer solche in Baden gefangen.

Papilio Machaon L. var. Sphyrus Hb. Das gleiche wie von der vorigen gilt für diese, dem Süden eigentümliche Form, welche Herr Schneck in Mödling fieng.

Das Stück stimmt genau mit der im Rühl'schen Schmetterlingswerke enthaltenen Beschreibung von var. Sphyrus Hb. überein.

Im Handel kommen übrigens als angebliche Sphyrus Hb. auch Stücke vor, welche den Spiegelfleck nächst dem Apex haben, dann wo die schwarze Randbinde der Oberflügel nach dem Mittelfelde hin „konkav“ und auf den Adern $\text{III}/_2$ und $\text{III}/_3$ gegen den Discoidal-fleck in vorspringenden Zacken verläuft; ferner das Wurzelfeld der Vorderflügel wohl auch „mehlartig“ bestäubt ist! aber, die schwarze Makel der Hinterflügel steht nicht in direkter Verbindung mit der Randbinde, sondern ist durch die gelbe Grundfarbe davon getrennt.

Thais Polyxena Schiff. ab. Ochracea Stgr. Diese kommt sowohl in typischen Stücken, wie auch in Übergängen vereinzelt unter der Stammform vor.

- Polygonia* (Vanessa) *C. album* L. gen. aest. *Hutschinsoni* Robs. Young (mit braungrauer, weniger gezeichneter Unterseite). Nicht selten im Juni und Juli.
- Pararge* *Maera* L. var. *Adrasta* Hb. (♂ Vorderflügel große ockergelbe Makeln, ♀ fast gänzlich gelb; Hinterflügel unten bleicher). Diese wurde unter der 2. Generation vereinzelt im August von Herrn Neustetter in Hütteldorf und in den Donau-Auen gefangen.
- Thecla* *Spini* Schiff. ab. *Lynceus* Hb. (Vorderflügel mit großen rotgelben Flecken; der Analfleck der Hinterflügel groß, orange, schwarz gerandet). Diese, als südliche Form angesehene Aberration hat Herr Dziurzyński im heurigen Jahre in Kritzendorf (bei Klosterneuburg) unter der Stammform gefangen.
- Chrysophanes* *Thersamon* Esp. Von Herrn Schwingenschuss am 3. September in Eibesthal gefangen.
- Chrysophanus* *Dispar* Hw. var. *Rutilus* Wernb. Diese Var. wurde von Herrn Schwingenschuss heuer auch in Bullendorf, Ebendorf und Eibesthal bei Mistelbach erbeutet.
- Lycaena* *Argyrognomon* Bgstr. ab. *Callarga* Stgr. Diese blaue Aberration des ♀ wurde von Herrn Neustetter am 20. Juni im Orte Mauer gefangen und hat derselbe zugleich berichtet, daß sie auch schon in früheren Jahren von Herrn Krüger gefangen worden ist.
- Lycaena* *Astrarche* Bgstr. gen. aest. *Calida* Bell. (Orange-flecken groß, Unterseite braun, mittlerer Teil der Vorderflügelfransen braun). Diese ist im Juli und August häufig.
- Lycaena* *Cyllarus* Rott. ab. *Andereggi* Rühl (fast ganz schwarze Form des ♀) fand Herr Neustetter häufig, sogar öfter als die typische Form.
- Hemaris* (*Macroglossa*) *Fuciformis* L. }
 — *Scabiosae* Z. } haben 2 Generationen.
- Cerura* *Bicuspis* Bkh. Diese wurde von Herrn Sapletal auf dem Wege zur Rieglerhütte (Galitzinberg—Halterthal) im Juni selbst gefunden und wurde auch ein Paar in copula am Riederberge (nächst Gablitz) von einem anderen Sammler in seiner Gegenwart erbeutet. Tritt also neu hinzu. — Erscheinungszeit 5 bis 6; Rp. 7 bis 8.

Cerura (*Harpyia*) *Furcula* Cl.

— *Bifidia* Hb.

Drymonia (*Notodonta*) *Trimacula* Esp.
var. *Dodonaea* Hb.

} haben zwei
Generationen.

Notodonta *Tritophus* Esp. kommt auch im Leithagebirge vor
und wurde im Mai 1901 daselbst erbeutet.

Lophopteryx *Cuculla* Esp. Diese hat 2 Generationen. — Er-
scheinungszeit 5—6 und 8; Rp. 6, 9 bis 10.

Ocneria *Rubea* F. Herr Schwingenschuss fand am 10. Sep-
tember 1902 frisch geschlüpfte Raupen in Eibesthal.

Gastropacha *Quercifolia* L. gen. aest. Hoegei, Heuäcker
(kleiner). Diese wurde von Herrn Neustetter als nicht
selten konstatiert.

Gastropacha *Populifolia* Esp. gen. aest. Obscura, Heu-
äcker (kleiner und dunkler). Von Herrn Neustetter
konstatiert; ist aber selten.

Thyris *Fenestrella* Sc. hat 2 Generationen und kommt auch
bei Bruck a. d. L. vor.

Acrionicta *Leporina* L.

— *Megacephala* F.

— *Tridens* Schiff.

} haben 2 Generationen.

Simyra *Nervosa* F. Von Herrn Rudolf Naufock wurde im
Juni eine Raupe am Bisamberge gefunden, welcher Fund-
ort somit hinzutritt.

Agrotis *Linogrisea* Schiff. kommt auch in den Donau-Auen vor.

— *Orbona* Hufn. Wurde in Laxenburg und auch in
Eibesthal erbeutet.

— *Primulae* Esp. (*Festiva* Hb.). Diese wurde von Herrn
Schwingenschuss am 29. Juli 1901 auch am Schöpfel
erbeutet.

— *Flammatra* F. Kommt auch bei Bruck a. d. L. vor;
ist übrigens auch laut Angabe des Herrn Predota in
der Lobau gefunden worden.

— *Candelisequa* Hb. Anfang Mai fand Herr Schwingen-
schuss in Unterbergern (Wachau) Raupen, die ihm im
Juli schlüpften.

— *Forcipula* Hb. Herr Schwingenschuss fand bei
Krems Raupen im Mai, die ihm im Juli schlüpften.
Laut Angabe des Herrn Predota kommt dieser Falter
auch am Bisamberge vor.

Agrotis Ypsilon Rott. Der Falter überwintert und wurde auch in mehreren Exemplaren (♂ und ♀) im März erbeutet.
 — *Crassa* Hb. Eine bisher noch nicht beschriebene und nicht benannte Aberration (♀ mit weißen Hinterflügeln) wurde von den Herren Naufock und Predota im August in Kaisermühlen (Donau-Auen) in Anzahl gefunden.

Mamestra Pisi L. }
 — *Dentina* Esp. } haben 2 Generationen.

Dianthoecia Luteago Hb. kommt auch bei Bruck a. d. L. vor.

Miana Bicoloria Vill. sowohl die
 ab. *Furuncula* Hb. (Vorderflügel nach hinten rötlich oder braun) wie auch
 var. *Rufuncula* Hw. (Vorderflügel fast einfärbig rot-grau) hat Herr Neustetter unter der Stammform in den Auen des Praters gefunden.

Bryophila Receptricula Hb. (*Strigula* Bkh.). Diese wurde von Herrn Schwingenschuss Ende August in Bullendorf erbeutet.

Apamea Testacea Hb. Herr Schwingenschuss erbeutete diesen Falter am 22. August in Unter-Olberndorf.

Hadena Ochroleuca Esp. kommt auch bei Bruck a. d. L. vor.
 — *Scolopacina* Esp. kommt auch am Galitzinberge vor.

Polia Polymita L. Herr Schwingenschuss erbeutete die Art Ende August in Bullendorf.

Cloantha Radiosa Esp. Diese hat Herr Predota auch bei Bruck a. d. L. und Herr Klein bei Deutsch-Wagram im Marchfelde gefangen. Letzterer erbeutete am 12. August diesen Falter in Anzahl in ganz frischen Stücken und ist hieraus ersichtlich, daß derselbe auch in zwei Generationen vorkommt, wie die übrigen *Cloantha*-Arten.

Dicycla Oo. L. Kommt in der Hinterbrühl im Juli und August, Rp. 6. vor und tritt demnach neu hinzu.

Senta Maritima Tausch ab. *Wismariensis* Schmidt. Die schwarze Zeichnung in den Vorderflügeln bildet mehr einen Wisch als Striche.

— ab. *Nigrocostata* Stgr. hat einen schwarzen Apicalfleck.
 Beide Aberrationen unter der Stammform. Die Raupe ist übrigens keine Mordraupe.

Leucania Evidens Hb. Wurde von Herrn Schwingenschuss Mitte August in Krems abends erbeutet. Kommt nach Herrn Predota auch in Elsarn vor.

— *Albipuncta* F. hat 2 Generationen.

Perigrapha Cineta F. Diese fand Herr Berger als Raupe im Halterthal (Wiener-Rayon), Herr Predota den Falter bei Bruck a. d. L. und Herr Schwingenschuss in den Wachauerbergen.

Taeniocampa Populeti Tr. überwintert nicht.

Mesogona Acetosellae F. Herr Schwingenschuss klopfte diese in Eibesthal aus dürren Eichenbüschen, und zwar anfangs September.

Cirrhoedia Ambusta F. wurde Ende August in Bullendorf von Herrn Schwingenschuss erbeutet.

Orrhodia Vaccinii L. ab. *Signata* Klem. (Die punktierten Makeln unterhalb des Randes der Vorderflügel schwarz, sonst fast einfärbig.) Tulbingerkogel.

Scopelosoma Satellitia L. ab. *Brunnea*, *Lampa*. (Vorderflügel ohne weiße Makel.) Von Herrn Neustetter einzeln unter der Stammform gefunden.

Cucullia Umbratica L.

— *Chamomillae* Schiff.

— *Xeranthemi* B.

— *Argentea* Hufn.

} haben 2 Generationen.

Heliothis Cognata Frr. Herr Schwingenschuss fand anfangs September Raupen in Hauskirchen, Bezirk Mistelbach.

— *Cardui* Hb. hat 2 Generationen. Anfangs September fand Herr Schwingenschuss Raupen in Eibesthal.

Chariclea Delphinii L. fand Herr Schwingenschuss Ende August in Schrick bei Mistelbach.

Erastria Argentula Hb.

— *Pusilla* View.

— *Deceptor* Sc.

} haben 2 Generationen.

Catocala Fraxini L. ab. *Moerens*, Fuchs (dunkler, Vorderflügel schwarzgrau). Diese kommt unter der Stammform, jedoch selten vor.

— *Puerpera Giorna*. Wurde von Herrn Schwingenschuss am 24. und 28. September in Krems gefangen.

Eccrita Ludicra L. Laut Angabe des Herrn Predota kommt dieselbe auch bei Bruck a. d. L. vor.

<i>Toxocampa Pastinum</i> Tr.	} haben 2 Generationen; bei
<i>Cymatophora Octogesima</i> Hb.	
— <i>Duplaris</i> L.	
— <i>Or</i> F.	} Partinum ist sie kleiner als die erste.

Acidalia Rusticata F. Die Angaben über die Erscheinungszeit dieses in 2 Generationen auftretenden Falters bedürfen einer kleinen Rectification. Es ist im XII. Jahresberichte der Juni für die erste und der September für die zweite Generation angegeben.

Nun fieng aber Herr A. Naufock jun. einige Stücke am 26. Juli auf dem Terrain des Arsenal's in Wien und Herr Prinz einige Exemplare am 10. August in Oberweiden.

Letztere sind kleine Stücke, die unbedingt der 2. Generation angehören. Somit ist wahrscheinlich für die erste Generation der Juni, für die zweite Ende Juli, August bis September anzunehmen.

Chesias Rufata F. fand Herr Schwingenschuss Ende April bei Krems. Desgleichen

Larentia Achromaria Lah. im Mai in Krems;

- *Cucullata* Hufn. ebenso;
- *Flavofasciata* Thnbg. Mitte Juli bei Bruck a. d. L.
- *Nigrofasciaria* Goeze. Diesen schönen Falter erbeutete Herr Schwingenschuss im April und Mai in Krems an Felsen sitzend und Herr Neustetter am 7. Mai in Kalksburg. Im XII. Jahresberichte ist nur Alpeleck am Schneeberg als Fundort angegeben.

Tephroclistia (*Eupithecia*) *Linariata* F. hat 2 Generationen.

- *Irriguata* Hb. Dieselbe kommt auch in Kalksburg und bei Bruck a. d. L. vor.
- *Assimilata* Gn. kommt auch im Wienerwalde vor.
- *Albipunctata* Hw. kommt auch in den Donau-Auen vor.
- *Trisignaria* H. S. ebenso.

Chloroclystis Coronata findet sich auch im Wienerwalde.

Abraxas Sylvata Sc. kommt auch bei Bruck a. d. L. vor.

Opisthograptis Luteolata L. hat 2 Generationen.

Boarmia Selenaria Hb. Herr Schwingenschuss fand diesen Falter Ende August bei Mistelbach häufig an Baumstämmen.

Tephronia Sepiaria Hufn. Desgleichen Anfang August in Krems.
Eubolia Arenacearia Hb. Desgleichen.

— *Murinaria* F. Diese fand Herr Schwingenschuss
Mitte Juli bei Bruck a. d. L. und Ende Juli bei Krems.

Scodiona Conspersaria F. Die Raupen wurden im Mai, die
Falter Ende Juni bei Krems gefunden.

Nola Albula Schiff. wurde nach verlässlicher Nachricht im Juli
1902 in der Lobau gefangen.

Arctia Hebe L. Herr Schwingenschuss fand die Raupen im
September bei Hauskirchen.

Lithosia Griseola Hb. Desgleichen die Raupen im Mai bei
Krems an den Stämmen von *Populus nigro*.

✓ *Zygaena Trifolii* Esp. Diese ist von Herrn Dziurzyński im
heurigen Jahre, und zwar im Monate Juli, bei Kritzen-
dorf gefangen worden.

Der XII. Jahresbericht enthält als Fundort nur Elsarn;
dennoch ist der Falter für Nieder-Österreich als selten
zu betrachten.

✓ — *Carniolica* Sc. ab. *Flaveola* Esp. Wurde von Herrn
Schwingenschuss am 14. August in Krems gefangen.

✓ *Sesia Ichneumoniformis* F. Im August in Krems gefangen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Naufock Albert sen.

Artikel/Article: [Nachtrags-Verzeichnis I. 22-28](#)