

Beitrag zur Lepidopterenfauna von Weyer in Oberösterreich.

II. Nachtrag.

Von

Anton Metzger in Wien.

Im II. Jahresberichte pro 1891 und im X. pro 1899 des Wiener Entomologischen Vereines veröffentlichte ich Beiträge zur Fauna von Weyer; die Anzahl der in diesen beiden Jahresberichten veröffentlichten Arten betrug 361
dazu kommen jetzt die von mir im Jahre 1900 aufgefundenen Arten 33

so daß die Gesamtsumme der von mir in Weyer aufgefundenen Arten, Aberrationen und Varietäten von Macrolepidopteren sich stellt auf 394

Im Jahre 1900 war mein Aufenthalt in Weyer vom 24. Mai bis 14. September.

Die Schädlinge der Ebene: *Stilpnatia Salicis* L.
Euproctis Chrysorrhoea L.
Lymantria Dispar L.
Malacosoma Neustria L. und
Thaumetopoea Processionea L.

kommen in Weyer nicht vor.

Aporia Crataegi L. flog innerhalb 15 Jahren nur einmal.

Porthesia Similis Fuessl., dann *Lymantria Monacha* L., von beiden kommen sowohl die Raupen als die Schmetterlinge nur sehr vereinzelt vor; als Schädlinge sind in Weyer nur *Pieris Brassicae* L. und *Rapae* L. zu rechnen.

Einige Arten sind durch die Überschwemmungen, denen Weyer in den letzteren Jahren öfters ausgesetzt war, beinahe ganz verschwunden wie: *Parnassius Apollo* L.,

Melanargia Galathea L.

Das ganze Gebiet von Weyer ist sowohl an Arten als auch in Bezug auf Anzahl der Individuen arm.

- Colias Phicomone* Esp. Ein ♀ am 2. Juli, Großbergersattel.
- Melitaea Aurinia* Rott. Die Schmetterlinge waren am 23. Juli bereits abgeflogen. Herr Sicher fand *Aurinia* bei Hieflau in besonders schönen, großen Stücken.
- Pararge Aegeria* v. *Egerides* Stgr. Ein ♀ am 15. Juni am Kreutzberg.
- Aphantopus Hyperanthus* L. Dieser sonst überall häufige Schmetterling kommt in Weyer nur auf dem Wege über das Loibl vor.
- Lycaena Cyllarus* Rott. Ein ♀ am 8. Juni, Kreutzberg.
- *Euphemus* Hb. Schmetterling am 2. Juli, Großbergersattel.
- Smerinthus Populi* L. Ein ♀ am 7. Juli.
- Cerura Furcula* L. Eine Raupe am 10. August auf Fagus.
- Pygaera Pigra* Hufn. Raupe im Ennsthal.
- Acronycta Tridens* Schiff. Eine Raupe am 7. September.
- Agrotis Strigula* Thnb. Der Schmetterling war Ende Juni von *Erica* häufig zu klopfen; ebenso häufig war im Herbst die kleine Raupe, welche aber überwintert, zu finden.
- Pachnobia Rubricosa* F. Eine Raupe in Weyer gefunden, der Schmetterling entwickelte sich am 7. Jänner 1901.
- Mamestra Oleracea* L. Diese sonst überall so häufige Art ist in Weyer nur sehr einzeln anzutreffen.
- Dianthoeia Magnolii* B. Die Raupe lebt an *Silene nutans* nur an felsigen, sonnigen Orten, nie in Wiesen wie die ihr sehr ähnliche Raupe von v. *Xanthocyanea*.
- Bombycia Viminalis* F. Die in den Zweigspitzen von *Salix caprea* eingesponnene, häufige Raupe kommt in der Mitte Juni vor; die Schmetterlinge entwickeln sich im Juli.
- Hadena Adusta* Esp. Ein ♀ am 18. Juni.
- Leucania Conigera* S. V. Ein ♀ am 24. Juli.
- Xanthia Fulvago* L. Der Schmetterling nicht selten, Ende August.
- Euclidia Mi* Cl. Schmetterling am Großbergersattel.
- Eccrita Cracca* F. Die Raupe ist Ende August erwachsen. Die Schmetterlinge sind dunkler als die Wiener Stücke.
- Zanclognatha Emortualis* Schiff. Die Raupen lebten Ende August in den Blättern von herabgefallenen Buchenästen; ihr gewöhnliches Futter, die Eiche, kommt dort nicht vor. Wittberg.
- Cheimatobia Brumata* L. Die Raupe ist bei ihrer Seltenheit in Weyer kein Schädling.

- Larentia Silaceata* S. V. Ein ♀ am 8. Juli bei der Schwimmschule.
— *Corylata* Thnbg. Ein ♀ am 13. Juni.
— *Nigrofasciaria* Goeze. Eine Raupe am Kreutzberg.

Tephroclystia Pimpinellata Hb. Die Raupe im September nicht selten an *Pimpinella*.

- *Assimilata* Gn. Raupe Ende August.
— *Exiguata* Hb. Die Raupe auf den Blättern der Stamm-
auswüchse von *Alnus* im September.

Bapta Bimaculata F. Die Raupen auf *Crataegus*.

Amphidasis Betularia L. Eine Raupe am 8. September.

Zygaena Purpuralis Brünich aberr. *Interrupta* Stgr. Ein ♂, bei welchem nicht nur der mittlere, sondern auch der untere Längsfleck breit unterbrochen ist; die Zeichnung eines jeden Vorderflügels weist demnach 5 rote Makeln aus.

Pachytelia Unicolor Hufn. Die Raupe nicht selten an *Erica*. Die Schmetterlinge im Juli.

Epychnopterix Pulla Esp. Die leeren Säcke an Buchenstämmen. Der Schmetterling wird wie in der Wiener Gegend anfangs Mai fliegen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopterenfauna von Weyer in Oberösterreich. II. Nachtrag. 35-37](#)