

lich gewesen, da die geforderten Aktivitäten auch die Freizeit beschlagnahmten, die normalerweise sonst der Wissenschaft gewidmet wird.

V o r l e s u n g : Die übliche Vorlesung im Wintersemester an der Universität in Salzburg konnte wegen der dringenden Vorbereitung der Landesausstellung im Schloß Weinberg nicht gehalten werden.

A u s s t e l l u n g : Da der Titel der Landesausstellung kurzfristig vom "Befreiten Klang" in "Das Mühlviertel - Natur, Kultur, Leben" ausgetauscht wurde, mußten auch die drei Biologen des O.Ö. Landesmuseums einen Teil dieser Ausstellung übernehmen. Mitte September haben wir davon erfahren, vor Weihnachten mußten die Katalogtexte für den Beitragsband fertiggestellt sein! Der Unterzeichnete organisierte Beiträge von R. Krisai, R. Lenzenweger, W. Dunzendorfer, E. Führer, W. Petz, E. Wirnsberger, W. Foissner, H. Wittmann, R. Türk, E.W. Ricek, F. Grims, H. Forstinger, R. Schachl, A. Kump, R. Posch, G. Pils und verfaßte selbst zwei. Das Erstellen des Konzeptes, die Eroberung geeigneter Räumlichkeiten und die Beschaffung von Ausstellungsobjekten verlangten schon in diesem Jahr totalen Einsatz, wenngleich die Ausstellung auch erst im Mai nächsten Jahres eröffnet wird.

A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : Mit der Betreuung der Mykologischen und der Botanischen Arbeitsgemeinschaft war die Abteilung wie in den vergangenen Jahren betraut. Die Programmerstellung und die Abhaltung der Veranstaltungen sowie die Schriftleitung der "Linzer biologischen Beiträge" und der Schriftenreihe "Stapfia" lagen in den Händen des Berichterstatters, wobei die gute Zusammenarbeit mit Kollegen F. Gusenleitner nicht unerwähnt bleiben soll. In der botanischen Sammlung des Museums sortierte F. Grims die Laubmoose neu und das Ehepaar Schübler begann mit dem Sortieren der Pilzexsiccate. Über die weiteren Aktivitäten gibt der Bericht der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Aufschluß.

Doz. Dr. Franz Speta

Botanische Arbeitsgemeinschaft

Die Leitung der Botanischen Arbeitsgemeinschaft hatte 1987 abermals Mag. R. Steinwendtner übernommen. Als Kassier stand Dr. A. Kump zur Verfügung.

Die Botanische Arbeitsgemeinschaft gestaltete 1987 insgesamt 33 Abende: 10 Vortragsabende, 11 botanische Arbeitsabende, 12 Pilzbestimmungsabende. Die Themen der Vorträge waren: Die Flora des Bundeslandes Salzburg (Dr. H. Wittmann, Salzburg, 29.1.). Kreta-Vegetation und Pflanzengeographie einer südägäischen Insel (Doz. Dr. P. Heiselmayer, Salzburg, 12.2.). Pilzfunde im Wasserwald Scharlinz (Ing. R. Schübler, Linz, 9.3.). Botanische Endemiten der Seealpen (Dr. H. Mittendorfer, Ebensee, 12.3.). Tiefer hinein in den Jülich (Bestimmungsschwierigkeiten bei Nichtblätterpilzen (H. Forstinger, Ried/I., 6.4.). Die Augen-

trost-Arten (*Euphrasia*) der Alpen (Dr. Ernst Vitek, Wien, 23.4.).
 Von Alberta nach Arizona (Nordamerika) Teil 1 und 2 (Ing. S. Lock,
 Linz, 4.6. und 5.11.). Die Flora der Hainburger Berge (Dr. L. Kaltofen,
 St. Marien, 22.10.). Mit Landrover und Schlafsack durch Südwestafrika
 (R. Planitzer, Linz-Puchenau, 3.12.).

Im Berichtsjahr wurde von der Botanischen Arbeitsgemeinschaft der
 19. Band der "Linzer biologischen Beiträge" in zwei Heften mit insge-
 samt 504 Seiten herausgegeben, der folgende Artikel enthält:

DONNER, J. - Verbreitungskarten zu P.H. DAVIS "Flora of Turkey, 9",
 3-16.

DOLLFUSS, H. - Neue und bemerkenswerte Funde von Grabwespen (Hymenop-
 tera, Sphecidae) in Österreich, 17-25.

WOLF, H. - Ein Zwitter von *Lasioglossum fulvicorne* (KIRBY) (Hym.,
 Apoidea, Halictidae), 27-28.

ZHU, Ting-Cheng & J. Stan ROWE - A comparison of alpine tundra floras:
 N.E. China and N.W. North America, 29-41.

EBMER, A.W. - Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Dufourea*
LEPELETIER 1841 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta:
 Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Dufoureae) - Nachtrag, 43-56.

FRANK, Christa - Aquatische und terrestrische Mollusken (Gastropoda
 et Bivalvia) aus Nordost-, Ost- und Südostspanien sowie von der In-
 sel Mallorca (Balearen), 57-90.

WITTMANN, H. & W. STROBL - Untersuchungen am Artenpaar *Agrimonia*
eupatoria L. - *A. procera* WALLR. im Bundesland Salzburg (Österreich),
 91-119.

VÖTH, W. - Ergebnis fünfundzwanzigjähriger Beobachtung der Orchideen-
 Populationen im Bezirk Mödling (Niederösterreich), 121-193.

KNERER, G. - Zur Bienenfauna Niederösterreichs: Die Unterfamilie
Halictinae - Nachtrag (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae), 195-200.

SORGER, Friederike & M. MANN - Beiträge zur Flora der Türkei VII,
 201-254.

GUSENLEITNER, J. - Über *Eumenidae* aus Nepal (Hymenoptera, Vespoidea),
 255-270.

NOWOTNY, W. - Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs
 III, 273-294.

MELZER, H. - *Asplenium ruta-muraria* L. subsp. *dolomiticum* LOVIS &
 REICHSTEIN, Die Dolomit-Mauerraute - neu für Österreich, 295-297.

WOLF, H. - Zwitter von *Sphecodes geofrellus* (KIRBY) und *Sphecodes*
rufiventris (PANZER) (Hym., Sphecoidea, Apidae), 299-300.

SAKAGAMI, Shoichi F. and P. Andreas W. EBMER - Taxonomic Notes on
 Oriental Halictine Bees of the genus *Halictus* (subgen. *Seladonia*,
 Hymenoptera, Apoidea), 301-357.

ZETTEL, H. - Beitrag zur Kenntnis der Sigalphinen- und Cheloninen-
 Fauna in Österreich (Hymenoptera, Braconidae), 359-376.

MELZER, H. - Beiträge zur Flora von Friaul-Julisch Venetien (Italien)
 und Slowenien (Jugoslawien), 377-388.

WITTMANN, H. & R. TÜRK - Zur Flechtenflora Oberösterreichs - neue und
 bemerkenswerte Flechten und Flechtenparasiten, 389-399.

- MADL, M. - Über Gasteruptiidae aus Oberösterreich (Hymenoptera, Evaniodea), 401-405.
- GUSENLEITNER, J. - Zwei neue Ancistrocerus-Arten aus dem westlichen Mittelmeergebiet (Hymenoptera, Eumenidae), 407-414.
- WOLF, H. - Zur Kenntnis der Gattung Tachyaetes HAUPT, 1930 (Hymenoptera, Pompilidae). III, 415-459.
- RIEDL, H. - Additional notes on Onosma-Species (Boraginaceae) from Turkey, 461-465.
- Bemerkungen über einige pyrenokarpe Flechten und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen im Pilzsystem, 467-481.
 - & Christa RIEDL-DORN - Der Verwandtschaftskreis von Ferula rigidula de CANDOLLE in China, 483-494.
- SPETA, F. - Die Verbreitung der Corydalis-Arten in Oberösterreich und in den angrenzenden Bundesländern, 495-504.

Die von den Mitarbeitern ausgefüllten Fragebögen enthielten folgende mitteilenswerte Daten:

Ia. Botanische Sammelreisen in Oberösterreich

- FORSTINGER, H., Ried/I.: Almtal, Viechtwang, 28.5.-1.6. - Moosalm bei Burgau, Unterach, 13.6. - Wurzeralm, Spital/P., 15.6. - Aigen/M., Bärenstein, 16.7. - Aigen/M., 18.-20.9. - Zell/Moos, 16.10. - Während des ganzen Jahres im Innviertel, Hausruck- und Kobernaußerwald.
- GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: Prammündung bei Schärding, 3.4. - Donautal: Rannamühl, Rannriedl, Kramesau, 9.5. - Uttenthal östl. Prambachkirchen und Unterreitbach westl. Michaelnbach, 9.6. - Wengerwiesen bei Hofkirchen/Trattnach und Ragering bei Neumarkt/Hausruck, 11.6. - Bad Ischl, Rettenbachleiten, Mehlsachgraben, Leckenmoos, Tauern, Geschwendalm, Hoisenrad, Kuhkogel, 14.6. - Neufelden, Pürnstern, Leibmergut, Doppelham, 20.6. - Sauwald: Zimmerleiten bei St. Ägidi, 25.6. - Mühlviertel, Hinteranger und Mühleckwald, 11.7. - Feichta südl. Höhnhart und Raum Leittrachstetten, 15.7. - Sauwald: Nordseite des Scheffberges, 23.7. - Goisern (Ramsau), Tiefe Scharten, Brennten Kogl (1625 m), sehr reiche Flora! 29.7. - Gstöten bei St. Marienkirchen/Schärding, Innalluvionen, 21.8. - Dachstein: Oberfeld-Hoher Rumppler-Rumppler-Seelein, 27.8. - zwischen Gunkskirchen und Offenhausen: Sirfling, Kappling, Holzling, Wimberg, Krottendorf, 12.9. - Schlögener Schlinge, 1.10. - Schacherteiche bei Kremsmünster, 15.10. - Mühlviertel: Oberschwarzenberg, Gegenbach, Steinernes Meer (schon in Bayern), 17.10. - Unterlauf der Ranna, 5.11. - Mühlviertel: Tal der Großen Mühl zwischen der Mündung des Stockinger Baches und der Schwarzen Kuchl unterhalb Neufelden, 14.11. - Die Herbstexkursionen dienten vor allem Moosstudien!
- HUSS, H., Stadl-Paura: In ganz Oberösterreich Verbreitungsstudien von Ophiocladium hordei (Fungi imperfecti).
- LENZENWEGER, R., Ried/I.: Umgebung Gosausee (Gosau-Lacke), 19.9.

NOWOTNY, W., Riedau: Laufend in ganz O.Ö.

PILS, G., Linz: Ganzjährig im Mühlviertel.

SCHÜSSLER, R., Linz: Fischlhamer Au, 7.5. - Innerbreitenau, 19.5. - Steinbach, 24.5. - Viechtwang, 28.-31.5. - Bad Hall, 14.6. - Grünburg, 3.7. - Meloner Au, 14.7. - Offensee, 16.7. - Schönan, 12.8. - Spital/P., 18.8. - Aigen/M., 17.9.-19.9. - Grünburg, 10.10.-11.10.

SPETA, F., Linz: Hinterstoder, oberh. vom Klinser, 27.7. - Planwiesen bei Grünburg/Steyr, oberh. Dietlgut beim Steyrdurchbruch, 28.7. - Dietlgut bei Hinterstoder, 29.7. - Rund um die Poppenalm, 900-1100 m, 29.7. - Oberh. Baumschlagereith, 1000 m, 30.7. - Katzensgraben, zw. Brunnenthal und Steyrerhütte am Kasberg, 1000 m, 30.7. - Polsterlucke, 625 m, 1.8. - Falkenstein beim Bahnhof Hinterstoder, 600 m, 1.8. - Dietlgut bei Hinterstoder, 3.8. - Polsterlucke, 4.8. - Gleinkersee, 5.8. - Polsterlucke, 6.8., 7.8.

STEINWENDTNER, R., Steyr: Umgebung von Steyr.

TILL, W., Traiskirchen: Kleinere Aufsammlungen im Gebiet des Attersees und des Hölleengebirges im Juli und August.

Ib. S a m m e l r e i s e n v o n O b e r ö s t e r r e i c h e r n a u ß e r h a l b O b e r ö s t e r r e i c h s

FORSTINGER, H., Ried/I.: Spanien, Teneriffa (Anagagebirge, Tenogebirge, Barranco del Inferno, Aguamansa), 7.2.-14.2. - Burgenland, Illmitz, 6.6. - N.Ö., Hundsheimer Berg, 7.6. - Tirol, Nassereith, Fernpaßgebiet, Alpleskopf, Sinnesbrunn, Muthenaualm, 11.-14.7. - Türkei, Fethiye, Ölü Deniz, Üzümlü, 18.-25.8. - BRD, Donautal bei Passau, 8.9. - Italien, Selva di Levico, 9.-13.9. - Kärnten, Knappenberg, 3.-8.10.

GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: Niederösterreich: Lobau, Eichkogel und Frauenstein bei Mödling im Rahmen der Österr. Botanikertagung, 17.5. - Steiermark: Nordseite des Hochschwag bei Greith, 8.9. und Palfau-Gamsstein (1770 m), 9.9. - Niederösterreich: westl. Großegg bei Lassing, 9.9. - Salzburg: Talschlucht des Zinkenbaches südl. des Wolfgangsees, mit Prof. E. Urmi von der Universität Zürich, zwecks Suche des seltenen, nur von drei Orten bekannten Laubmooses Distichophyllum carinatum, hier der locus classicus! Trotz 1 1/2 Tage Suchens nicht gefunden. 26. u. 27.9. - Teneriffa: Mit Heinz Forstinger. Puerto del la Cruz und Raum Buenavista, 8.2. - Aguamansa, besonders Barranco südl. des Ortes, 9.2. - Barranco del Infierno, 10.2. - Montana Roja, La Asomada, Masca im Tenogebirge, El Palmar-Tal, Las Casas-Punta de Teno, 11.2. - Anaga-Gebirge: Llano del los Viejos, Las Casas de la Cumbre, Taganana-Las Palmas, 12.2. - Süd-Spanien: Hinterland von Torremolinos, 11.4. - Rondagebirge: ca. 6 km nördl. San Pedro Alcandara, Raum um Iqualeja und Pujerra, 12.4. - Rondagebirge: ca. 6 km westl. Ronda, Montejaque westl. Ronda, Cueva de

la Pileta, Paß Puerto de Las Palomas bei Grazalema (1375 m), Zahara, 13.4. - Westseite der Sierra de Mijos, ca. 5 km westl. Alora gegen Carratraca, 14.4. - El Torcal südl. Antequera, Salinas de Fuente de Piedra, Paß östl. Carratraca, 15.4. - Rondagebirge: Paß östl. Ronda, Paß Puerto del Vento an der Strecke Ronda-Burgo (1100 m), 16.4. - Malaga: Gibralfara, 17.4. - Torremolinos, 18.4. - Norditalien-Jugoslawien: (Venetien-Friaul-Istrien-Slovenien). Östlich Mestre, 5.8. - Insel Torcello, 8.8. - Palmanova, 9.8. - Östlich Grado, Isola Morisim, Ufer des Isonzo südl. Monfalcone, 10.8. - Bei Oprtalj nahe Motovun in Istrien, 12.8. - ca. 5 km östl. Rovinj, 13.8. - Raum Postojna, 14.8. - Bovec im Isonzotal 15. u. 18.8. - Kaninsky podi am Kanin (2200 m bis 2500 m), 16.8. - Aufstieg zum Krn-See vom Lepenja-Tal aus (600 bis 1400 m), 17.8.

KRISAI, R., Braunau: Korsika, August.

KUMP, A., Linz: Vorarlberg, Feldkirch, Rheinau. - Tirol, Imst.

LENZENWEGER, R., Ried/I.: N.Ö., Waldviertel, Umgebung Litschau, 10.-12.6. - Steiermark, Naßstellen am Pötschenpaß, 4.7. - Steiermark, Pfitzingmoos bei Bad Aussee, 18.7. - N.Ö., Waldviertel, Umgebung Litschau, 28.-31.7. - Kärnten, 3.9. - Steiermark, Wörschach-Moor bei Wörschach, 13.9. - Salzburg, Egelsee bei Abtenau, 2.10.

MITTENDORFER, H., Ebensee: Frankreich, Plateau central, Camarque, 25.9.-9.6. - Julische Alpen vom Vršeč-Paß aus, 20.-25.7. - Nur Einzeltage im Kanal-, Koritnica- und Isonzotal/Jul. Alpen, im Schwarzwald, im Lungau, am Bösenstein/Rottenmanner Tauern, bei der Botanikertagung in der Lobau und bei Mödling, wenige Tage Dalmatien.

PILS, G., Linz: Chile und Argentinien, Andengebiet von Aconcagua bis S-Patagonien, 26.12.1986-15.2.1987. - N.Ö., Gölzer und Steiermark, Veitschalpe, Anfang Juli. - Spanien, Sierra de Gredos, Pico de Almanzor, Siete Logunas, 19.7.-22.7. - Picos de Urbion bei Soria, 25.7.-26.7. - Sierra de Candelario, 1.-12.8. - Picos de Europa, 16.-20.8.

SCHÜSSLER, R., Linz: Burgenland & N.Ö., Lockenhaus und Kalte Kuchl, 18.10.-23.10. - Osttirol, St. Jakob/D., 23.8.-28.8. - BRD, Daun/Eifel, 26.9.-4.10. - Italien, Levico, 10.9.-15.9.

SPETA, F., Linz: Italien: Autobahnraststation bei Bazzera, nahe Venedig, 10.4. - Monte Conero, 250 m, 470 m, 11.4. - Forestra Umbra am Gargano; NW unterh. Ischitella; 10 km NE Cagniano Varano; 4 km E der Abzweigung von der Garganoschnellstraße nach San Nicandro (6 km NE San Nicandro); 10 km N Alberobello, 300m, 12.4. - Griechenland: Insel Korfu: Korfu; Palaeokastritsa, 13.4. - Palaeokastritsa-Lakones-Krini-Vistonas, 380 m, 14.4. - Vitalades, 0-40 m; bei Agios Mathaeos, 80 m, 15.4. - oberh. Nisaki, 100-300 m; um Siniaes, 600 m; Pandokratoras, 700-900 m, 16.4. - Sidari, ca. 5 m; Acharavi; Strand bei Roda, 17.4. - Seen E Liapades, 50-60 m, 18.4., 19.4. - Pindus-Gebirge: Aristi-Vikos-Schlucht; Abzweigung 5 km N Kalpaki, ca. 520 m, 20.4. - Anhöhe vor Dodona, 920 m; Dodona, 21.4. - Jugoslawien: Kozjak oberh. Sućurac bei Split, 120-680 m; Burg Klis, 22.4. - Trogir; zw. Poličnik und Posedarije, 70 m; Südspitze der Insel Pag, 30 m, 23.4. - zw. Karlopat u. Ostarije: Vidovac, 180 m;

unterh. Susan, 400 m; 970 m; 1000 m; E Brusane, 640 m, 24.4.
STEINWENDTNER, R., Steyr: Italien, Corvara, 12.-17.6. - Türkei, Side,
Termessos und angrenzende Berge, 11.-21.10. - N.Ö., Seitenstetten,
Hollenstein, Kürnberg.

Ic Kartierung in Oberösterreich

GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: 7248/4; 7249/3,4; 7450/3; 7546/4; 7549/2;
7646/1; 7649/4; 7746/4; 7748/2,3,4; 7845/1; 7849/1,3; 8247/4; 8253/
3; 8347/2,4; 8348/1; 8448/3.

KRISAI, R., Braunau: 7744/4; 7844/4; 7844/1,2.

STARLINGER, F., Schwanenstadt: 7948/2,4; 7949/1; 8249/3.

STEINWENDTNER, R., Steyr: 7952/4; 7954/3; 8053/2; 8154/1.

IIa Pflanzen, neu für Oberösterreich

Myxomyceten

Dianema depressum (A. LISTER) A. LISTER: Innerbreitenau bei Molln,
10.10.1987, W. NOWOTNY.

Physoarum murinum A. LISTER: Mitterndorf bei Kopfing, 8.7.87,
W. NOWOTNY.

Prototrichia metallica (BERK.) MASSEE: Feuerkogelplateau, 16.7.1987,
W. NOWOTNY.

IIb. Fundorte seltener und bemerkenswerter Arten in Oberösterreich

Pilze

Calocybe chrysenteron (BULL. ex FR.) SING.: "Alm bei Ried i.I.,
H. FORSTINGER.

Ciboria viridifusca (FUCK.) HÖHNEL: Tumeltsham, H. FORSTINGER.

Clitocybe lignatilis (PERS. ex FR.) KARST.: St. Martin i.I., H.
FORSTINGER.

Collybia nivalis (LUTHI & PLOMB) MOS.: Windischgarsten, 20.4.,
HOLLERWEGER.

Coprinus narcoticus (BATSCH ex FR.) FR.: Linz-Wasserwald, 29.7.,
R. SCHÜSSLER.

Entoloma lividocyanulum (KÜHN.) MOS.: Linz-Wasserwald, 15.8.,
R. SCHÜSSLER.

Entoloma sordidulum (KÜHN. & ROMAGN.) ORTON: Antiesenhofen,
H. FORSTINGER.

Fayodia pseudoclusilis (JOSS. & KONR.) SING.: Fleischhacken, Eber-
schwang, H. FORSTINGER.

Flammulastr carpophilus (FR.) EARLE: Grünau im Almtal, H. FORSTINGER.

Galerina ampullaceocystis ORTON: Leinberg, Neuhofen i.I., H. FORSTINGER.

Grandinia stenospora (KARST.) JÜL.: Grünburg/St., 16.5., K. HELM.

Hohenbuehelia petaloides (BULL. ex FR.) SCHULZ.: Mauler, Hohenzell,

H. FORSTINGER.

Lactarius hysginus FR.: Aigen/M., H. FORSTINGER.

Lepiota fulvella REA: Linz-Wasserwald, 15.8., R. SCHÜSSLER.

Lepiota setulosa LGE.: Linz-Wasserwald, 15.8., R. SCHÜSSLER.

Letendrea helminthicola (BK. & BR.) WEESE: Linz-Wasserwald, 27.7., K. HELM.

Mycena citrinomarginata GILL.: Linz-Wasserwald, 5.6. + 22.11., R. SCHÜSSLER.

Otidea bufonia (PERS.) BOUD.: "Alm" bei Ried i.I., H. FORSTINGER.

Panaeolus papilionaceus (BULL. ex FR.) QUEL.: Seiring, Auroldmünster, H. FORSTINGER.

Panus suavisissimus (FR.) SING.: "Spießmöl", St. Johann/W., H. FORSTINGER.

Peziza echinospora KARST.: Linz-Wasserwald, 19.6. + 15.8., R. SCHÜSSLER.

Peziza moravecii (SVRCEK) DONADINI: Mauler, Hohenzell, H. FORSTINGER.

Phaeogalera oedipus (CKE.) ROMAGN.: Eschlried bei Ried i.I., H. FORSTINGER.

Phanerochaete filamentosa (BERK. & CURT.) BURDS.: Hilprechting, Hohenzell, H. FORSTINGER.

Pholiotina striaepes (CKE.) MOS.: Fritzging, Mehrnbach, H. FORSTINGER.

Psathyrella narcotica KITS V. WAV.: Linz-Wasserwald, 9.11., R. SCHÜSSLER.

Psilocybe rhombispora (BRITZ.) SACC.: Antiesenhofen, H. FORSTINGER.

Psilocybe serbica MOSER & HORAK: Tumeltsham, H. FORSTINGER.

Russula pumila ROUZ. & MASS.: Aubach, Mehrnbach, H. FORSTINGER.

Simocybe rubi (BERK.) SING.: Mehrnbach, H. FORSTINGER.

Tilletia controversa KÜHN ap. RABH. (Brandilz): Auf Weizen in Taufkirchen/Pram, Juli 1987, leg. Grims F., det. J. Poelt. Es wurde nur eine Ähre mit zwei befallenen Körnern gefunden. Nach Zogg, H. (1985): Brandpilze Mitteleuropas ist der Parasit erst seit ca. 1950 bekannt in der Schweiz und nunmehr zu einem gefährdeten Getreideschädling geworden. Wieweit der Schädling schon in Österreich verbreitet ist, ist mir nicht bekannt.

Typhula setipes (GREV.) BERTHIER: Tumeltsham, H. FORSTINGER.

M o o s e

Althalamia hyalina (SOMMERF.) HATT.: Dachstein, Nordseite des Hohen Rumpfer, 1800 m, auf Rohhumus einer absonnigen Felsspalte, 27.8.87, F. GRIMS.

Geheebia gigantea (FUNCK) BOULH.: Unterhalb der Tiefen Scharten am Brenntenkogel südl. Goisern, 1250 m, an einer nordseitigen, nassen Wand ein außergewöhnlich großes Vorkommen mit tiefen Polstern, 29.7.1987, F. GRIMS.

Lunularia cruciata (L.) DUM.: Steyr, Altstadt, 10.1987, TOMBEK. (det. H. SCHLUDERMANN).

Paraleucobryum nerve (THED.) LOESKE: Dachstein, Nordostseite des Hohen Rumpfer, 1900 m, Windkanten, 27.8.87, F. GRIMS. Almtal: Maisenkögerl östl. Scharnstein, 800 m, fester Rohhumus im lichten Fichtenwald an der Nordseite, leg. 5.9.83, ein außergewöhnlich niedrig gelegener Fundort dieser Art, die ihre Hauptverbreitung auf Si-

likatgestein oberhalb der Baumgrenze hat, F. GRIMS.

Rhacomitrium elongatum (EHRH.) FRISVOLL: Dachstein, Nordseite des Hohen Rumpler, 1900 m, auf trockenem Rohhumus unter Latschen, 27.8.87, F. GRIMS. Im Salzkammergut vielleicht nicht so selten und nur verkannt. Mühlviertel: Oberschwarzenberg, übererdete Felsblöcke in einer Wiese, 14.10.87, F. GRIMS.

Schistidium trichodon (BRID.) POELT: Dachstein, Nordseite des Hohen Rumpler, 1800 m, sonniges Kalkgestein, 27.8.87, F. GRIMS.

Sphagnum fimbriatum WILSON.: Grabensee, Moos beim Ausfluß, Gem. Perwang, R. KRISAI.

Splachnum ampullaceum HEDW.: Moosalm, Burgau, H. FORSTINGER.

Tetrapodon urceolatus (BRID.) B.S.G.: Dachstein, Nordseite des Hohen Rumpler, 1950 m, Windkanten, 27.8.87, F. GRIMS.

Timmia norvegica ZETT.: Dachstein, beim Rumpler Seelein, 1850 m, in feuchter Halbhöhle, 27.8.87, F. GRIMS.

Bl ü t e n p f l a n z e n

Agrostemma githago L.: Donautal, Baumgartenberg (7754/3), Ruderalfläche, frisch aufgeschüttet, ca. 50 Exemplare, VIII. 1987, H. WITTMANN.

Alyssum saxatile L.: Donautal, ca. 10 Stücke in der südl. Burgmauer von Schloß Rannariedl, wohl Gartenflüchtling, 9.5., F. GRIMS.

Antennaria dioica (L.) GAERTN.: Lichtenberg, E-Seite, Böschung, ca. 780 m (7651/1), G. PILS.

Asperula cynanchica L.: Luftenberg (7752/2), Sept. 1986, G. PILS.

Athamanta cretensis L. s.str.: Mitterweißenbachgraben im Stehrergraben, 8247/2, 670 m, W. STROBL.

Calamagrostis canescens (WEBER) ROTH: Mühlviertel, östl. Hinteranger bei Klaffer in großer Menge in einem aufgelassenen, verlandenden Teich, 11.7.87.

Campanula glomerata L.: bei Schwarzenberg i.M., Straßenrand und benachbarte Wiese (7249/4), Ende VIII.87, G. PILS.

Carex ornithopoda WILLD.: Luftenberg, S-Hang (mit Pulsatilla vulgaris (7752/2)), Ende VI 87, G. PILS.

Carex tumidicarpa N.J. ANDERSSON: NW-Ecke der Schottergrube am rechten Almufer, 2 km NNO Bad Wimsbach-Neydharting, ca. 340 m (7949/1), offene, feuchte Schotterfläche, F. STARLINGER.

Catabrosa aquatica (L.) P.B.: Gstötten bei St. Marienkirchen/Schärding, Schlickflächen der Alluvionen des Inn, 21.8.87, in Duftschmid (1870-1885) wird die Art für O.Ö. als häufig angegeben, durch die Florenkartierung wurde jedoch das Gras nur einmal in Oberösterreich erfaßt.

Galium elongatum K. PRESL: Bei Badhöring nahe St. Florian/Inn, Schlammbank des Innstausees, 31.8.87, ein zweiter Fund am Inn dieser oft verkannten Sippe. Siehe dazu Grims in Speta (1980) Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jb.O.Ö. Mus.-Ver. 125/II, S. 65! - Donautal, Mündung der Ranna, 5.11.1987, F. GRIMS.

Limosella aquatica L.: Leinberg, Neuhofen i.I., H. FORSTINGER.

- Scheuchzeria palustris L.: Seppl Au NE von Sandl, an der tschechischen Grenze (7454/1), G. PILS.
Scutellaria minor L.: Schönau i.M., am Fuß des Steinerberges, Moor beim Lackner, 20.10.87, A. SCHMALZER.
Senecio gaudini GREMLI: Tiefe Scharten am Brenntenkogel südl. Goisern, 1500 m, 29.7.87, F. GRIMS.
Taxus baccata L.: Tal der Großen Mühl: Schwarze Kuchl unterhalb Neufelden, mehrere kleine Bäume, Wiederbestätigung alter Angaben, 14.11.87, F. GRIMS.

I I c . I n t e r e s s a n t e F u n d e
a u ß e r h a l b O b e r ö s t e r r e i c h s

P i l z e

- Bolbitius variicolor ATK.: Italien, Prov.Trento, Torcegno, H. FORSTINGER.
Chamonixia caespitosa ROLLAND: Steiermark, Mühlen, H. FORSTINGER.
Clitocybe josserandii (SING.) SING.: Kärnten, Guttaring, Urtlgraben, H. FORSTINGER.
Cordyceps sphecocephala KLOTSCH: Italien, Prov.Trento, Val di Sella, H. FORSTINGER.
Cortinarius ionosmus MOS., NESP. & SCHWÖB.: Italien, Prov.Trento, Val di Calamento, H. FORSTINGER.
Entoloma corvinum (KÜHN.) NOORD.: Kalte Kuchl, N.Ö., 22.10., R. SCHÜSSLER.
Fomitopsis cystisina (BK.) BOND. & SING.: Levico, Parkanl., Italien, 13.9., R. SCHÜSSLER.
Hydnellum auratile (BRITZ.) MAAS GEST.: Matrei, Osttirol, 28.8., R. SCHÜSSLER.
Panus tigrinus (BULL ex FR.) SING.: Türkei, Fethiye, auf Stumpf von Liquidambar, H. FORSTINGER.
Ramaria fennica (KARST.) RI.: St. Jakob/D., Osttirol, 27.8., R. SCHÜSSLER.
Ramaria neoformosa PET.: St. Jakob/D., Osttirol, 27.8., R. SCHÜSSLER.
Sarcodontia setosa (PERS.) DONK: Kärnten, Eberstein, H. FORSTINGER.
Tyromyces placenta (FR.) RYV.: Levico, Val di Sella, Italien, 12.9., R. SCHÜSSLER.
Woldmaria crocea (KARST.) COOKE: Kärnten, Guttaring, Urtlgraben, H. FORSTINGER.

A l g e

- Euastrum bilobum LÜTKEM.: Kärnten, Ederndorfermoor.

M o o s

- Hookeria lucens (HEDW.) SM.: Frankreich, Korsika, Lac du Creno, R. KRISAI.

Bl ü t e n p f l a n z e n

Lysimachia thyrsiflora L.: Tirol, Weißensee bei Biberwier,
H. FORSTINGER.

Orchis ustulata L.: Niederösterreich, in der Flyschzone bei Behamberg,
R. STEINWENDTNER.

Prunus tenella BATSCH: Niederösterreich, südliches Weinviertel
(7566/4): Weingartenböschung ca. 3,2 km NW Ollersdorf, ca. 215 m,
F. STARLINGER.

II d. Ne o p h y t e n

Amaranthus powellii S. WATSON (= A. chlorostachys): Mehrfach in Mais-
feldern im Raume St. Florian/Inn in Ausbreitung begriffen, durch
die Florenkartierung nur im Eferdinger Becken erfaßt, 31.8.87,
F. GRIMS.

Barbarea stricta ANDRZ. ex BESS: Goisern, Auslauf der großen Schi-
sprungsschanze, 29.7.87. Die Art wurde in O.Ö. bisher vor allem in
den großen Stromtälern gefunden, F. GRIMS.

Setaria viridis (L.) PB. var. major (GAUDIN) POSPICHAL: Um St. Florian/
Inn in Maisfeldern, 31.8.87, durch seine Größe sehr auffallend,
F. GRIMS.

Veronica peregrina L.: Ried/Innkreis, Friedhofgelände, 30.7.1987. Die
Art dürfte bei genauerer Suche in Friedhöfen, Baumschulen, Gärtne-
reien usw. öfter aufgefunden werden, F. GRIMS.

II e. V e r s c h w i n d e n s e l t e n e r P f l a n z e n

Epilobium nutans und viele andere heute seltene Pflanzen von Feuchtbio-
topen sind durch Planierung und Drainage einer Feuchtwiese NNE von
Vorderweißenbach im Mühlviertel (knapp östlich vom Forsthaus Stern-
wald, 920 m) vernichtet worden. H. WITTMANN.

II f. G e f ä h r d e t e r , s c h u t z b e d ü r f t i g e r S t a n d o r t

Magerwiese oberhalb der Großtschlerei in Eidenberg i.M.: Letzter
Fundort von Hypochoeris maculata im Mühlviertel! Außerdem wachsen dort
die bereits seltenen Arten Carex pulicaris, Chamaecytisus supinus,
Listera ovata, Scorconera humilis, Anthurus archeri usw. Schon eine
einmalige kräftige Düngung würde den Bestand gefährden! G. PILS.

F u n d l i s t e - E x k u r s i o n A l m t a l vom 28. bis 31.5.1987

Ergebnisse einer Studentenexkursion der Universität Innsbruck unter der
Leitung von Prof. Dr. M. Moser

1 = oberhalb Viechtwang, 28.5.

2 = Almsee, 29.5.

3a = St. Konrad

3b = Hacklberg
 3c = Grünfleck (alle 30.5.)
 4a = Grünau
 4b = Viechtwang (alle 31.5.)

UREDINALES

Triphragmium	filipendulae	1
Puccinia	actaeae-elymi	2

APHYLLOPHORALES-AGARICALES-TREMELLALES-DACRYMYCETALES

Polyporus	brumalis	1,2,3a,3b
	lepideus	1,2,3a,3b
	squamosus	2,3b
	mori	1
	varius	1,4a
Hygrocybe	nigrescens	4b
Omphalina	ericetorum	2
	epichysium	2
Omphaliaster	asterosporus	2
Clitocybe	sp.	Theuerwanger Fst.
Calocybe	gambosa	1,3b
Melanoleuca	strictipes	3a,3b
Collybia	dryophila	1
	hariolorum	1,2
	butyracea	3b
Micromphale	perforans	1,2,4a
Hohenbuehelia	mastrucata	2
Marasmius	oreades	1
	androsaceus	1,2,3
	bulliardii	3c
Hemimycena	gracilis	1,2,3a
Mycena	alcalina	1,2,3,4a
	amicta	1,2,3
	chlorinella	3a
	galericulata	1,2,3
	hiemalis	1
	niveipes	1
	pura	1,2,3a,3b,4a
	renatii	1,2
	rorida	2,3
	speirea	1,2
	rubromarginata	2,3a
	strobilicola	1
	viridimarginata	3b
Hydropus	subalpinus	1,2
Xeromphalina	campanella	2,3a,3b
Clitopilus	prunulus	1
Entoloma	cetrata	2,3a

Pluteus	atricapillus	1,2,3a,3b
Coprinus	micaceus	2
	lagopus	Ödsee (Schüßler)
Panaeolus	rickenii	3a
	sphinctrinus	3b
Psathyrella	spadiceogrisea	2
	prona ss. Lange	2
	gracilis	2
Bolbitius	vitellinus	3b
Conocybe	tenera	3
Pholiotina	aporos	1,2,3b
	blattaria	1,2
	appendiculata	1
Agrocybe	dura	1
	erebia	Ödsee
	praecox	1,2,3b
Stropharia	semiglobata	3b
Hypholoma	capnoides	3a,4a
	fasciculare	1,2,3b,4a
Psilocybe	crochata	3a
	rhombispora	4b
Kueneromyces	mutabilis	2
Flammulaster	carphophilus	1,2,3c
Tubaria	pellucida	2
Inocybe	dulcamara	3a
	griseovelata (?)	3a
Crepidotus	mollis	4a
Galerina	fallax	3
Schizophyllum	commune	1,2,3
Trametes	confragosa	1
	gibbosa	2
	hirsuta	1,2
	versicolor	1,2,3
Pycnoporus	cinnabarinus	2
Trichaptum	abietinum	2
Fomitopsis	pinicola	1,2,3
Phellinus	pomaceus	3b
Ganoderma	applanatum	2
Gloeophyllum	abietinum	2
	odoratum	2,3a
	sepiarium	2,3b
Fomes	fomentarius	1,2
Stereum	hirsutum	2
Tremella	simplex	4b (auf Aleurod.)
Exidia	glandulosa	3b
Dacrymyces	stillatus	1,2,3
Heterobasidium	annosum	2,3a
Amphinema	byssoides	Grünau (Helm)
Aleurodiscus	amorphus	2,4b

ASCOMYCETEN-MYXOMYCETEN

Dasyscyphus	bicolor	2
	niveus	1
	willkommii	3c
Pyronema	confluens	1
Morchella	crassipes	1
	vulgaris	3
Terzetta	cupularis	1
Acetabula	vulgaris	4
	leucomelas	2,3
Xylaria	hypoxylon	1,2,3
	polymorpha	2
Ustulina	deusta	1,2,3
Diatrype	disciformis	1,2
Hypoxylon	fragiforme	2
Sepultaria	arenosa	3c
Ceratiomyxa	fruticulosa	1,3a
Lycogala	epidendron	1,2,3
Trichia	floriformis	4b

L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s

Die nachfolgende Aufstellung umfaßt botanische Veröffentlichungen über Oberösterreich sowie Veröffentlichungen von Botanikern, die derzeit in Oberösterreich leben, aus dem Jahre 1987. Vereinzelt sind bisher übersehene Publikationen früherer Jahre eingeflochten.

DAUCHER, H. (1987): Reichraminger Hintergebirge - Modell einer "sanften" Tourismus-Erschließung. - ÖKO.L 9/4: 3-14.

DONNER, J. (1987): Verbreitungskarten zu P.H. DAVIS, Flora of Turkey 9". - Linzer Biol.Beitr.19: 3-16.

ECKER, P. (1987): Der ökologische Stellenwert des Aiterbachtales in der Gemeinde Steinhaus/Wels. - ÖKO.L 9/2: 3-15.

FREIDHAGER, R. (1987): Naturnahe fichtenreiche Wälder im Naturschutzgebiet Sengsengebirge (FV Molln, ÖBF). - In H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich": 751-752.

GÖD, St. & K. ZUKRIGL (1987): Das Naturwaldreservat Kogelgassenwald am Hinteren Gosausee (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). - In H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich": 684-705.

GRIMS, F. (1987): Geologie, Vegetation. - In: Heimatbuch Natternbach: 14-19, Eigenverlag G. Wimmer.

- (1987): Überblick über die Vegetation des O.Ö. Donautales zwischen Passau und Aschach an der Donau unter Berücksichtigung von Aspekten der Landschaftsökologie. - In: Die Tallandschaft der Donau zwischen Passau und Aschach. Raumordnungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Landschaft und Erholung. Amt der o.ö. Landesregierung Linz: 32-46.

- GROSSE-BRANCKMANN, H. (1987): Die Corticioiden aus dem Herbar H. Jahn. - Z.Mykol.53/1.
- HAUG, M. (1987): Der Böhmisches Enzian - Erhaltungskultur als Rettung vor dem Aussterben? - ÖKO.L 9/2: 22-25.
- HUSS, H. & R. KOSTKA (1987): Zur Bodennutzung in Nordost-Afghanistan am Beispiel von Spacelab-CIR Weltraumbildern. - Mitt.Geodät.Inst. Techn.Univ.Graz 57: 171-183.
- R. KOSTKA & J.F. DOBREMEZ (1987): CIR-Spacelab-Weltraumfotos und Vegetationskartierung im Khumbu Himal. - Mitt.Geodät.Inst.Tech. Univ.Graz 57: 185-191.
- H. MAYRHOFER & W. WETSCHNIG (1987): Ophiocladium hordei CAV. (Fungi imperfecti), ein für Österreich neuer parasitischer Pilz der Gerste. - Pflanzenarzt 1987/7-8: 11-13 (167-169).
- KARL, H. (1987): Die Donaulandschaft - Lebensraum oder Stauraum? - ÖKO.L 9/3: 3-10.
- KRISAI, R. (1987): Hammerauer Moor und Samer Mösl - Moore in der Großstadt. - Jahrb. Haus der Natur 10: 128-134.
- LAUSCHER, F. (1987): Nachruf auf Maria Roller. - Wetter & Leben 39: 51-52.
- LENZENWEGER, R. (1987): Ein Beitrag zur Kenntnis der Zieralgenflora des Waldviertels (Niederösterreich). - Mikroskop. Nachrichten (Mitteilungsbl.Mikroskop.Ges.Zürich) 1987/8: 60-69.
- (1987): Probe vom Burgerteich bei Haugschlag (Waldviertel). - Mikroskop.Nachrichten 1987/7: 1-6.
- (1987): Zeit und Menschheit. - Festschrift aus Anlaß des 80jährigen Bestandes der Kath. österreichischen Studentenverbindung RUGIA Ried im MKV, 3 pp.
- (1987): Die Zieralgen - eine gefährdete Algengruppe. - Schr.Vereines Verbreitung Naturwiss.Kenntnisse Wien 126: 59-62.
- (1987): Beitrag zur Kenntnis der Zieralgenflora des Salzburger Lungau. - Arch.Hydrobiol.Suppl.78/1: 47-64.
- LIEBEL, G., K. FARASIN, G. SCHRAMAYR, F. SCHANDA & B. STÖHR (1987): Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Umweltbundesamt, Wien. (Oberösterreich: 37-42).
- MASARIÉ, W. (1987): Aluminiumwerk Ranshofen - eine Schadensaufnahme. - Natur & Land 1987/2-3: 34-40.
- MELZER, H. (1986): Notizen zur Flora des Burgenlandes von Nieder- und Oberösterreich. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Österreich 124: 81-92.
- MITTMANNGRUBER, W. (1987): Die Generalsanierung der Naturdenkmäler im Linzer Stadtgebiet. - ÖKO.L 9/3: 18-23.
- MUHAR, S. (1987): Landschaftsökologische Begleitplanung am Beispiel des Traunkraftwerkes Edt. - Wiener Mitt.Wasser, Abwasser, Gewässer 77: B 1-14.
- NOWOTNY, W. (1987): Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs III. - Linzer Biol.Beitr.19: 273-294.
- PILS, G. (1987): Oberösterreichs Orchideen einst und heute - eine Pflanzengruppe als Umweltindikator. - ÖKO.L 9/1: 3-14.
- & F. AICHINGER (1987): Der Hagenberger Schloßpark. Der hervorragende Baumbestand. - Jahresber.Verein Schloß Hagenberg i.M. 2: 11-26.

- PRACK, P. (1987): Der Wald südlich von Hainbuch/NÖ - einige botanische Bemerkungen. - Verein f. Ökologie u. Umweltforschung, Wien, Arbeitsbericht 1986: 45-50.
- PÜHRINGER, N. & F.X. WIMMER (1987): Anwendungsbeispiele naturnaher Uferverbauungsmethoden an Alm und Aiterbach. - ÖKO.L 9/1: 25-28.
- RICEK, E.W. (1987): Cortinarius ferrugineipes spec.nov. - Beitr.Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3: 299-303, 1 t.
- SCHIRMER, P. & W. NOWOTNY (1987): Ein bemerkenswerter Schleimpilzfund aus Oberösterreich: Cribaria meylanii Brandza. - Beitr.Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3: 495-497.
- SCHMID-HECKEL, H. (1985): Zur Kenntnis der Pilze in den Nördlichen Kalkalpen. - Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsber.8.
- SCHMID, S. (1987): Die Bedeutung Botanischer Gärten für den Artenschutz. - ÖKO.L 9/2: 23-24.
- SCHRAMAYR, G. (1986): Oberösterreichs Trockenrasen: aussterbende Vegetation. - Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz 6: 61-62, tt. 66, 68, 71, 72, pp. 223-231.
- SPETA, Elise (1987): Botanische Exkursion nach Korfu. - Jahresber. 1986/87 Bundesgymn.u.wirtschaftsk.Bundesrealgymn.Linz, Körnerstr. 9, 98: 10-13.
- SPETA, F. (1987): Dr. Josef Klimesch - Landeskulturpreis für Wissenschaft 1986. - Oberöstr.Kulturbericht 41/1: 2.
- (1987): Talentförderungsprämien für Wissenschaft. Dipl.-Ing. Dr. Johann Ernst Dieplinger. Dr. Josef Loidl. - Oberöstr.Kulturber. 41/1: 3.
- (1987): Scilla s.l. in Mitteleuropa. - Kurzfassungen der Beiträge zum 4. österreichischen Botaniker-Treffen, 15.-17.5.1987 in Wien: 59-60.
- (1987): Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Brimeura SALISB.: ein Vergleich mit den Gattungen Oncostema RAFIN., Hyacinthoides MEDIC. und Camassia LINDL. (Hyacinthaceae). - Phytion (Horn) 26/2: 247-310.
- SPETA, F. (1987): Die Verbreitung der Corydalis-Arten in Oberösterreich und in den angrenzenden Bundesländern. - Linzer Biol.Beitr. 19: 495-504.
- (1987): Blausternchen, Wiesenglockenblume, Lerchensporn, Edelweiß: Botanik im O.Ö. Landesmuseum. - Oberösterreich, Kulturzeitschr. 37/3: 13-20.
- (1987): Abteilung Botanik. - Jahrb.Oberöstr.Musealvereines 132/II: 58-59.
- (1987): Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jahrb.Oberöstr.Musealvereines 132/II: 60-72.
- STEINDL, H. (1987): Subalpiner Fichtenwald "Hinterer Wieswald" (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). In H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich": 756-791.
- STIEGLECKER, W. (1984): Das Naturraumpotential der Gemeinde Laussa. Das ökologisch-ökonomische Wirkungsgefüge am Beispiel einer Voral-

penlandschaft. - Diss.Wien, 244 pp., 17 Karten.

TÜRK, R., H. WITTMANN & Eva KUPFER-WESELY (1987): Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Oberösterreich II. - *Herzogia* 7: 543-559.
WITTMANN, H. & R. TÜRK (1987): Zur Flechtenflora Oberösterreichs - neue und bemerkenswerte Flechten und Flechtenparasiten. - *Linzer Biol.Beitr.* 19: 389-399.

Doz. Dr. Franz Speta

Mykologische Arbeitsgemeinschaft

Auch heuer wurde die Pilzsuche im Wasserwald Scharlinz fortgesetzt. 254 verschiedene Pilzarten, darunter sehr selten vorkommende, wurden bei 34 Halbtagesexkursionen gefunden. Dieses Schutzgebiet wird bereits das 3. Jahr intensiv erforscht.

Außerdem erstreckte sich die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft mit vielen Privatexkursionen auf das ganze Bundesland Oberösterreich. Und im Landesmuseum fanden an 9 Montagen die obligaten Pilzbestimmungsabende, sowie 3 mykologische Arbeitsabende und an 6 Tagen Herbararbeiten statt.

Das alljährlich stattfindende Mykologentreffen, diesmal das 14., wurde im Vereinshaus in Aigen i.M. in der Zeit vom 17.-20.9. abgehalten und mehrere Mitglieder nahmen an den von Herrn Univ.-Prof. Dr. Meinhard Moser veranstalteten Studientagen der Universität Innsbruck in Viechtwang vom 28.-31.5. teil.

Im Ausland waren unsere Mitarbeiter stark vertreten bei der Dreiländertagung in Daun a.d. Eifel, BRD, vom 26.9.-4.10. und in Levico/Italien, bei Dr. Bruno Cetto vom 10.-15.9.

Und nun noch die Witterungsverhältnisse im Jahr 1987: im gesamten gesehen war es ziemlich feucht und dadurch ergab sich ein ausgezeichnetes Pilzjahr. Damit verbunden wurde das Herbar um einen beträchtlichen Zuwachs an gefriergetrockneten und getrockneten Pilzen bereichert.

Rudolf Schüßler

Abteilung Mineralogie, Geologie und Paläontologie

A u s s t e l l u n g e n

Dezember 1987: "Höhlenbär und Bärenjäger", Museum Lauriacum, Enns.
Vorbereitung der Leihgaben des O.Ö. Landesmuseums für die O.Ö. Landesausstellung 1988 auf Schloß Weinberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [133b](#)

Autor(en)/Author(s): Speta Franz

Artikel/Article: [Oberösterreichisches Landesmuseum. Botanische Arbeitsgemeinschaft. 57-72](#)