

Exkursion: Bochum-Altenbochum, Pilze auf dem Hauptfriedhof

Leitung: Thomas Kalveram, Oliver Czernia, Jan-Arne Mentken & Björn Sothmann, Text: Thomas Kalveram, Protokoll: Jan-Arne Mentken & Thomas Kalveram, Datum: 16.10.2022

Einleitung

Der Bochumer Hauptfriedhof (Zentralfriedhof) ist der größte Friedhof in Bochum. Er zeichnet sich durch große Rasenflächen, Gebüsche und ältere Gehölze aus. Markant sind z. B. Alleen aus Platane und Schwarzkiefer. Der Sheffieldring teilt den Friedhof in zwei Bereiche. Die Exkursion fand ausschließlich im Westteil statt.

Neben den typischen Park- und Friedhofspilzen wie Schopftintling, Tränender Saumpilz und Nelkenschwindling gab es einige Besonderheiten. Bemerkenswert waren z. B. die Kiefernbegleiter Spangrüner Kiefern-Reizker (RL 1 NRW, Abb. 1), Ringloser Butterpilz (Abb. 2) und Gewöhnlicher Erdritterling. Zu den in NRW gefährdeten Arten (RL 3) zählen der Weißstäubling (*Russula delica* agg.) und der Netzsporige Kartoffelbovist (*Scleroderma bovista*). Der Milde Kammtäubling (*Russula insignis*) gilt als stark gefährdet (RL 2 NRW) und der Weinrote Risspilz (*Inocybe adaequata*) als extrem selten (RL R NRW).



Abb. 1: *Lactarius semisanguifluus* – Spangrüner Kiefern-Reizker (T. Kalveram).



Abb. 2: *Suillus collinitus* – Ringloser Butterpilz (T. Kalveram).



Abb. 3: *Agaricus impudicus* – Unverschämter Egerling (O. Czernia).



Abb. 4: *Phyllactinia orbicularis* – Großfrüchtiger Buchenmehltau, Fruchtkörper (B. Sothmann).



Abb. 5: *Lactarius circellatus* – Hainbuchen-Milchling (B. Sothmann).



Abb. 6: *Melastiza cornubiensis* – Mennigroter Kurzhaarborstling (J.-A. Mentken).



Abb. 7: Exkursionsgruppe auf dem Bochumer Hauptfriedhof (C. Buch).

Artenliste

Schlauchpilze

Aleuria aurantia – Orangebecherling

*Bryoscyphus rhytidiadelphus*¹⁾ –

Moosbecherchen auf *Rhytidiadelphus squarrosus*

Cyclaneusma minus – Fensterladenpilz (auf *Pinus nigra*)

Hypomyces microspermus – Kleinsporiger Goldschimmel

Kretzschmaria deusta – Brandkrustenpilz

Melastiza cornubiensis (= *M. chateri*)¹⁾ –

Mennigroter Kurzhaarborstling (Abb. 6)

Phacidium lauri – Stechpalmen-Vulkanbecherchen

Xylaria hypoxylon – Geweihförmige Holzkeule

Ständerpilze

Abortiporus biennis – Rötender Saftwirrling
Agaricus essettei – Schiefknolliger Anis-Champignon
Agaricus impudicus ⁴⁾ – Braunscheckiger Stinkegerling, Unverschämter Egerling (Abb. 3)
Agaricus silvaticus ⁴⁾ – Kleiner Waldchampignon
Agaricus xanthodermus – Karbol-Egerling
Amanita excelsa – Grauer Wulstling
Amanita muscaria – Fliegenpilz
Amanita porphyria – Porphy-Wulstling
Amanita rubescens – Perlpilz
Apioperdon pyriforme – Birnen-Stäubling
Armillaria gallica – Gelbschuppiger Hallimasch
Baeospora myosura – Mäuseschwanz-Rübling
Boletus edulis – Echter Steinpilz
Clavaria falcata ¹⁾ – Weißes Spitzkeulchen
Clavulina rugosa – Runzelige Koralle
Clitocybe fragrans – Kleiner Duft-Trichterling
Clitocybe nebularis – Nebelkappe
Clitopilus prunulus – Mehrläsling
Coprinellus micaceus – Glimmer-Tintling
Coprinus comatus – Schopf-Tintling
Cortinarius hinnuleus agg. – Erdgriechender Gürtelfuß
Entoloma lividoalbum – Weißstieliger Rötling
Galerina clavata ¹⁾ – Entferntblättriger Moos-Häubling
Gastrum fimbriatum – Gewimperter Erdstern
Hortiboletus rubellus – Blutroter Filzröhrling
Hypholoma fasciculare – Grünblättriger Schwefelkopf
Imleria badia – Maronen-Röhrling
Inocybe adaequata ²⁾ – Weinroter Risspilz
Inocybe cincinnata var. *major* ³⁾ – Braunvioletter Risspilz
Inocybe mixtilis ⁴⁾ – Gerandetknolliger Risspilz
Kuehneromyces mutabilis – Stockschwämmchen
Laccaria laccata agg. – Rötlicher Lacktrichterling
Lacrymaria lacrymabunda – Tränender Saumpilz
Lactarius circellatus – Hainbuchen-Milchling (Abb. 5)
Lactarius deterrimus – Fichtenreizker
Lactarius pubescens – Flaumiger Milchling
Lactarius pyrogalus – Hasel-Milchling
Lactarius semisanguifluus ⁴⁾ – Spangrüner Kiefern-Reizker (Abb. 1)
Lactarius controversus – Rosascheckiger Milchling
Laetiporus sulphureus – Schwefelporling
Leccinum scabrum – Birkenpilz
Lepiota cristata – Stink-Schirmling
Lyophyllum decastes – Brauner Büschel-Rasling
Marasmius oreades – Nelken-Schwindling
Melanoleuca polioleuca ³⁾ – Gewöhnlicher Weichritterling
Meripilus giganteus – Riesenporling
Mycena leptocephala – Grauer Nitrat-Helmling
Paxillus involutus s. l. – Kahler Krempling

Phlebia tremellosa (= *Merulius t.*) – Gallertfleischiger Fältling
Psathyrella multipedata – Büscheliger Faserling
Ramaria stricta – Steife Koralle
Russula delica agg. – Gewöhnlicher Weiß-Täubling
Russula insignis ⁴⁾ – Milder Kammtäubling
Russula integra ⁴⁾ – Brauner Ledertäubling
Russula nigricans – Dickblättriger Schwärztäubling
Russula parazurea ⁴⁾ – Blaugrüner Reif-Täubling
Russula queletii – Stachelbeer-Täubling
Russula recondita (= *R. pectinatoides*) ⁴⁾ – Kratzender Kammtäubling
Scleroderma bovista ³⁾ – Netzsporiger Kartoffelbovist
Suillus collinitus – Ringloser Butterpilz (Abb. 2)
Suillus grevillei – Gold-Röhrling
Trametes versicolor – Schmetterlings-Tramete
Tricholoma scalpturatum agg. – Gilbender Erdritterling
Tricholoma terreum – Gewöhnlicher Erdritterling
Tubaria furfuracea – Gewöhnlicher Trompetenschnitzling
Xerocomellus chrysenteron – Gewöhnlicher Rotfußröhrling

Phytoparasiten

Erysiphe alphitoides – Eichen-Mehltau auf *Quercus robur*
Erysiphe arcuata – Kleinfrüchtiger Hainbuchenmehltau auf *Carpinus betulus*
Erysiphe capreae – Kleiner Salweidenmehltau auf *Salix caprea*
Erysiphe urticae – Echter Brennesselmehltau auf *Urtica dioica*
Kuehneola uredines (III) – Weißer Brombeerrost auf *Rubus laciniatus*
Melampsora laricis-populina (III) auf *Populus spec.*
Microstroma album – Eichen-Microstroma auf *Quercus robur*
Phragmidium mexicanum (II) – Scheinerdbeerrost auf *Potentilla indica*
Phragmidium violaceum (III) – Dickwandiger Brombeerrost auf *Rubus laciniatus*
Phyllactinia corni – Kornelkirschen-Hartriegelmehltau auf *Cornus mas*
Phyllactinia fraxini – Großfrüchtiger Eschenmehltau auf *Fraxinus excelsior*
Phyllactinia guttata – Haselmehltau auf *Corylus avellana*
Phyllactinia orbicularis – Großfrüchtiger Buchenmehltau auf *Fagus sylvatica* (Abb. 4)
Puccinia lagenophorae (I) – Australischer Gänseblümchenrost auf *Bellis perennis*
Pucciniastrum epilobii (II) – Tannen-Weidenröschenrost auf *Epilobium hirsutum*
Ramularia rubella – Einzellige Ampfer-Ramularia auf *Rumex obtusifolius*

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	14	123–126	2023
---------------------------	----	---------	------

Sawadaea tulasnei – Spitzahornmehltau auf *Acer platanoides*
Uromyces rumicis (II) – Scharbockskraut-Ampferrost auf *Rumex obtusifolius*
Thecogonia ligustrina – Liguster-Thecogonia auf *Ligustrum vulgare*

Bestimmer:

¹⁾ det. B. Sothmann, ²⁾ det. J.-A. Mentken, ³⁾ det. T. Kalveram, ⁴⁾ det. O. Czernia

Legende Sporenstadien: I = Aezien, II = Uredien, III = Telien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2023

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Kalveram Thomas, Czernia Oliver, Mentken Jan-Arne, Sothmann Björn

Artikel/Article: [Exkursion: Bochum-Altenbochum, Pilze auf dem Haupt-friedhof 123-126](#)