© Bochumer Botanischer Verein e.V.

| Jahrb. Bochumer Bot. Ver. | 8 | 163–164 | 2017 |
|---|---|---|---|

# Exkursion: Witten-Bommern, Ruhrtal an der Nachtigallstraße

(Gemeinschaftsexkursion mit der Biologischen Station in Witten NaWit)

Leitung und Text: ANNETTE SCHULTE & BIRGIT EHSES, Protokoll: CORINNE BUCH & ARMIN JAGEL, Datum: 15.09.2016

Teilnehmer: STEPHANIE BEDNARZ, BEILFUSS, CORINNE BUCH, DIETRICH BÜSCHER, LEAH DAMBERG, SYLVIA DAMBERG, PETRA FUCHS, ARMIN JAGEL, THOMAS KALVERAM, DIETRICH KOLBE, PATRICK MATUSZEWSKI, WOLFGANG RÖLLIG, CHRISTIAN SCHMIDT, IRIS STODER, WOLFGANG WEIRES

## Einleitung

Im touristisch geprägten Wittener Ruhrtal spazierten wir ein Stück entlang des Ruhrtal-Radweges, der Uferbereiche und der Gleisanlagen der Museumsbahn. Neben Resten der Auenvegetation mit verschiedenen Weiden-Arten (*Salix* spp.) wachsen hier viele Neophyten. Doch unter ihnen befinden sich nicht nur Herkulesstaude (*Heracleum mantegazzianum*) und Japanischer Staudenknöterich (*Fallopia japonica*), sondern auch allgemein weniger bekannte Arten wie die Indische Scheinerdbeere (*Potentilla indica*), die zwar nicht giftig, aber auch nicht besonders schmackhaft ist. Schmackhafter dagegen sind die Samen des Drüsigen Springkrauts (*Impatiens glandulifera*), die von den Teilnehmern gekostet werden konnten. Ein bekannter Wuchsort des in der Region seltenen Schlangen-Wiesenknöterichs (*Bistorta officinalis*) in einer Frischwiese wurde aufgesucht, jedoch wurde die Art aufgrund der Jahreszeit nicht gefunden. In den Randbereichen der Bahngleise wuchs Moschus-Malve (*Malva moschata*) und an einem Zaun die Breitblättrige Platterbse (*Lathyrus latifolius*, Abb. 2), eine verwilderte Zierpflanze.

Zum Ausklang der Exkursion besuchten wir den Naturgarten der NaWit, wo wir bei frischem Streuobstwiesen-Apfelsaft die "gärtnerische" Präsentation heimischer Wildstauden genießen konnten.

Abb. 1: Exkursionsgruppe (A. JAGEL).

Abb. 2: *Lathyrus latifolius*, verwildert am Bahngleis (C. BUCH).

## Artenliste

*Acer pseudoplatanus* – Berg-Ahorn
*Aegopodium podagraria* – Giersch
*Aesculus hippocastaum* – Gewöhnliche Rosskastanie, S
*Alliaria petiolata* – Knoblauchsrauke
*Alopecurus pratensis* – Wiesen-Fuchsschwanzgras
*Anthemis tinctoria* – Färber-Hundskamille, E
*Artemisia vulgaris* – Gewöhnlicher Beifuß
*Asplenium trichomanes* s. l. – Braunstieliger Streifenfarn

© Bochumer Botanischer Verein e.V.



*Athyrium filix-femina* – Frauenfarn
*Betula pendula* – Sand-Birke
*Bromus carinatus* – Gekielte Trespe, E
*Calystegia sepium* – Zaunwinde
*Cardamine flexuosa* – Wald-Schaumkraut
*Carduus crispus* s. l. – Krause Distel i. w. S.
*Carex pendula* – Hänge-Segge, E
*Carpinus betulus* – Hainbuche
*Castanea sativa* – Ess-Kastanie
*Circaea lutetiana* – Großes Hexenkraut
*Clematis vitalba* – Waldrebe
*Corylus avellana* – Gewöhnliche Hasel
*Crataegus monogyna* – Eingriffeliger Weißdorn
*Crataegus* spec. – Weißdorn
*Cymbalaria muralis* – Mauerzymbelkraut
*Cytisus scoparius* – Besenginster
*Echium vulgare* – Gewöhnlicher Natternkopf
*Epilobium roseum* – Rosenrotes Weidenröschen
*Equisetum arvense* – Acker-Schachtelhalm
*Eryngium campester* – Feldmannstreu, RL BRG 3
*Eupatorium cannabinum* – Wasserdost
*Euphorbia peplus* – Garten-Wolfsmilch
*Fagus sylvatica* – Rot-Buche
*Fallopa japonica* – Japanischer Staudenknöterich, E
*Fraxinus excelsior* – Gewöhnliche Esche
*Galinsoga ciliata* – Behaartes Franzosenkraut
*Galium album* – Weißes Labkraut
*Geranium macrorrhizum* – Balkan-Storchschnabel, S
*Geranium pratense* – Wiesen-Storchschnabel, E
*Geranium robertianum* – Stinkender Storchschnabel
*Geum urbanum* – Echte-Nelkenwurz
*Helianthus annuus* – Sonnenblume, U
*Heracleum mantegazzianum* – Herkulesstaude, Riesen-Bärenklau
*Humulus lupulus* – Hopfen
*Hypericum perforatum* – Tüpfel-Johanniskraut
*Impatiens glandulifera* – Drüsiges Springkraut
*Lamium album* – Weiße Taubnessel
*Lamium argentatum* – Silberblatt-Goldnessel
*Lamium maculatum* – Gefleckte Taubnessel
*Lathyrus latifolius* – Breitblättrige Platterbse, E (Abb. 2)
*Linaria vulgaris* – Gewöhnliches Leinkraut
*Lonicera periclymenum* – Wald-Geißblatt
*Lychnis coronaria* – Kronen-Lichtnelke
*Malva moschata* – Moschus-Malve
*Oenothera biennis* agg. – Artengruppe Zweijährige Nachtkerze
*Origanum vulgare* – Gewöhnlicher Dost
*Pastinaca sativa* s. l. – Pastinak i. w. S.
*Persicaria hydropiper* – Wasserpfeffer-Knöterich
*Picris hieracioides* – Bitterkraut
*Potentilla indica* – Indische Scheinerdbeere, E
*Quercus robur* – Stiel-Eiche
*Robinia pseudoacacia* – Robinie, K, S
*Rubus* spp. – verschiedene Brombeer-Arten
*Rumex acetosa* – Großer Sauerampfer
*Rumex obtusifolius* – Stumpfblättriger Ampfer
*Salix* spp. – verschiedene Weiden-Arten
*Solidago canadensis* – Kanadische Goldrute
*Solidago gigantea* – Riesen-Goldrute
*Sonchus arvensis* – Acker-Gänsedistel
*Sonchus asper* – Raue Gänsedistel
*Stachys sylvatica* – Wald-Ziest
*Symphytum officinale* – Gewöhnlicher Beinwell
*Symphytum* ×*uplandicum* – Comfrey
*Tanacetum vulgare* – Rainfarn
*Urtica dioica* – Große Brennnessel

Abb. 3: Weiße Flotte auf der Ruhr (A. JAGEL).

Abb. 4: Zeche Nachtigall (A. JAGEL).

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Schulte Bocholt Annette, Ehses Birgit

Artikel/Article: Exkursion: Witten-Bommern, Ruhrtal an der Nachtigallstraße 163-164