

Gesamteinflüsse aller cosmischen Potenzen. Sie sind als lebendige Kälte- und Wärme-, Licht- und Feuchtigkeitsmesser u. zu betrachten; ihre Lebensäußerungen gelten gleichsam als Produkte einer großen Zahl physischer Factoren, die im Gang und Haushalte der Natur vielleicht mehr, wie üblich, in Rechnung gezogen werden sollten.

Unsere verehrlichen Stations-Dirigenten, den Herren Becker, Ebenau und Chelius, so wie allen übrigen Correspondenten, denen wir die hier mitgetheilten Thatsachen verdanken, für ihre uneigennütigen Bemühungen unsern freundlichsten Dank.

Die Beobachtungen der Vegetation wurden angesetzt: zu Schwanheim von Herrn Lehrer Mathes, zu Lorschbach von Herrn Pfarrer Stückrath, zu Rüdelsheim von Herrn Amts-Apotheker Kölges, zu Cronberg von Herrn Lehrer Becker, zu Reichelsheim von Herrn Lehrer Huth, zu Henriettenthal von Herrn Dekanomen Unzicker, zu Bierstadt von Herrn Lehrer Seibert, zu Rod a. d. Weil von Herrn Lehrer Conrad, zu Molsberg von Herrn Lehrer Herber, zu Dornsdorf von Herrn Lehrer Stähler, zu Langenschwalbach von Herrn Kaufmann G. Bange, sen., zu Bleidenstadt von Herrn Lehrer Weber, zu Billmar von Herrn Lehrer Zirvas, zu Ernsthausen von Herrn Lehrer Dörr, zu Ransbach von Herrn Kreissthierarzt Nicol, zu Driedorf von Herrn Forstkandidaten Hagfeld, zu Holzhausen a. d. Heide von Herrn Lehrer Hardt, zu Derubach von Herrn Lehrer Schmidt, zu Gemünden von Herrn Oberschultheissen Böhm, zu Marienberg von Herrn Lehrer Horn.

Möge das Wenige, was wir bieten, nicht ganz ohne Anerkennung bleiben. Die Barometer- und Thermometer-Beobachtungen sind unseres Wissens die ersten in unserem Lande, welche auf wissenschaftliche Genauigkeit Anspruch machen dürfen.

Wiesbaden, im April 1844.

Der Herausgeber.

Täglicher Gang

des

Barometers im Mittel

nebst

Angabe der monatlichen Mittel und Extreme

zu

Wiesbaden, Cronberg und Neufirch.

1842.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Januar 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
	'''	'''	'''		'''	'''	'''
1	337,0	330,9	315,2	Ersp.	5360,6	5266,0	5010,1
2	35,2	29,2	13,5	17	336,8	330,9	315,0
3	33,4	27,4	11,7	18	38,0	31,9	16,0
4	32,5	26,4	10,8	19	37,4	31,7	16,0
5	33,4	27,3	11,0	20	35,7	29,5	13,7
6	34,8	29,0	12,6	21	34,5	28,8	13,1
7	37,7	31,5	15,6	22	32,5	27,1	11,2
8	37,8	31,6	15,8	23	28,0	22,1	05,6
9	35,9	29,9	14,1	24	31,5	25,3	08,8
10	35,3	29,5	13,4	25	30,9	25,5	08,8
11	35,3	29,5	13,3	26	32,7	26,5	10,3
12	35,4	29,4	13,1	27	32,3	26,3	10,2
13	35,0	29,5	13,0	28	33,6	27,9	11,5
14	33,0	27,5	11,4	29	34,4	28,3	12,5
15	33,9	28,5	12,8	30	36,0	30,1	13,5
16	35,0	28,9	12,8	31	37,1	31,0	15,2
Sum.	5360,6	5266,0	5010,1	Sum.	10372,0	10188,9	9691,5
					'''	'''	'''
Monatl. Mittel	zu	Wiesb.	334,6	Cronb.	328,7	Neuf.	312,6
Höchst. St. d. 18.	''	''	338,0	''	331,9	''	316,0
Tieffter St. d. 23.	''	''	328,0	''	322,1	''	305,6
Differenz	''	''	10,0	''	9,8	''	10,4

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Februar 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	335,5	329,5	313,4	15	340,6	334,7	318,9
2	36,7	30,8	14,7	16	40,4	34,4	18,3
3	38,7	32,6	16,1	17	39,4	33,6	17,8
4	39,1	33,5	17,8	18	38,7	32,9	17,3
5	37,6	31,8	16,1	19	38,4	32,4	17,4
6	35,8	29,9	14,3	20	35,6	29,6	14,2
7	35,0	29,3	13,8	21	34,2	28,3	12,9
8	34,9	29,2	13,4	22	33,3	27,6	12,1
9	35,2	29,4	13,3	23	30,3	25,2	10,3
10	36,9	31,0	14,8	24	27,1	22,1	06,9
11	38,4	32,4	16,2	25	28,8	23,0	06,9
12	39,1	33,2	17,3	26	29,4	23,9	08,0
13	38,8	33,1	17,5	27	31,5	25,7	09,7
14	39,3	33,0	17,1	28	31,7	25,6	09,7
Sum.	4721,0	4638,7	4415,8	Summa.	9400,4	9237,7	8796,2
Monatl. Mittel	zu Wiesb.	335,7	Cronb.	329,9	Neuf.	314,2	
Höchst. St. d. 15.	"	340,6	"	334,7	"	318,9	
Tiefster St. d. 24.	"	327,1	"	322,1	"	306,9	
Differenz	"	13,5	"	12,6	"	12,0	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im März 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.			
1	329,0	323,9	308,6	17	335,3	329,4	314,7			
2	33,4	27,1	12,5	18	30,5	24,9	09,6			
3	34,0	27,8	13,1	19	28,0	22,4	07,3			
4	34,2	28,4	13,0	20	27,0	21,4	05,9			
5	34,3	28,0	12,5	21	31,2	25,1	10,8			
6	34,6	28,9	13,2	22	32,4	26,7	11,3			
7	33,2	27,7	12,4	23	32,3	26,4	11,5			
8	31,4	26,1	10,9	24	35,3	29,4	13,0			
9	31,7	25,9	10,4	25	35,1	29,1	13,8			
10	27,7	21,9	06,5	26	29,3	23,9	08,3			
11	36,1	29,9	14,9	27	30,7	24,8	08,9			
12	34,6	28,6	13,2	28	32,3	26,5	10,3			
13	34,2	28,5	13,2	29	34,1	28,1	12,1			
14	37,3	31,1	15,3	30	34,4	28,6	13,1			
15	39,2	33,2	18,0	31	31,7	26,7	12,5			
16	37,7	32,1	17,1	Sum.	10322,2	10142,5	9667,9			
Sum.	5342,6	5249,1	5004,8	Monatl. Mittel	zu Wiesb.	333,0	Cronb.	327,2	Neuf.	311,9
				Höchst. St. d. 15.	"	339,2	"	333,2	"	318,0
				Tiefster St. d. 20.	"	327,0	"	321,4	"	305,9
				Differenz	"	12,2	"	11,8	"	12,1

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im April 1842.

Datum.	Wiesbaden.	Cronberg.	Neufirch.	Datum.	Wiesbaden.	Cronberg.	Neufirch.
1	325,7	320,3	304,7	Ersp.	4991,9	4905,6	4677,0
2	28,0	22,1	06,2	16	333,6	327,9	312,3
3	30,3	24,4	08,7	17	35,2	29,4	13,6
4	34,9	28,6	13,1	18	34,9	29,5	14,1
5	37,3	31,2	15,6	19	34,7	29,1	14,3
6	32,6	27,7	13,2	20	34,2	28,8	14,0
7	29,8	24,3	09,6	21	34,3	28,7	14,0
8	34,6	28,4	12,8	22	33,8	28,5	14,0
9	37,0	30,9	15,4	23	33,5	28,1	13,9
10	36,6	30,9	15,4	24	33,0	27,7	13,4
11	35,1	29,2	14,4	25	33,5	28,6	13,4
12	33,3	27,6	12,6	26	34,9	29,5	13,7
13	32,3	26,7	12,0	27	34,2	28,9	13,5
14	31,4	26,1	11,3	28	34,4	28,8	13,5
15	33,0	27,2	12,0	29	34,3	29,1	13,8
Sum.	4991,9	4905,6	4677,0	30	32,9	27,6	13,0
Summa					10003,3	9835,8	9381,5
Monatl. Mittel	zu Wiesb.	333,4	Cronb.	327,9	Neuf.	312,6	
Höchst. St. d. 5.	"	337,3	"	331,2	"	315,6	
Tieffst. St. d. 2.	"	328,0	"	322,1	"	306,2	
Differenz	"	9,3	"	9,1	"	9,4	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Mai 1842.

Datum.	Wiesbaden.	Cronberg.	Neufirch.	Datum.	Wiesbaden.	Cronberg.	Neufirch.
1	332,6	328,1	312,9	Ersp.	5330,3	5245,0	5004,8
2	32,9	27,6	13,0	17	334,6	329,0	314,8
3	31,6	26,4	12,0	18	32,6	27,5	13,5
4	32,0	26,8	12,1	19	31,3	26,1	12,1
5	32,8	27,4	12,2	20	31,1	26,0	11,2
6	30,1	24,9	09,8	21	32,8	27,4	12,0
7	29,7	24,6	09,3	22	32,4	27,2	11,9
8	30,5	24,8	08,8	23	33,9	27,6	12,4
9	32,9	27,8	11,9	24	31,2	26,5	12,1
10	35,5	29,9	14,2	25	32,8	27,6	12,5
11	35,3	29,8	14,8	26	33,5	28,2	13,2
12	33,7	28,1	13,6	27	33,8	28,5	13,3
13	33,6	28,1	13,7	28	33,9	28,5	13,4
14	34,5	29,5	14,4	29	35,0	29,4	14,3
15	36,6	30,7	16,0	30	34,1	28,8	14,1
16	36,0	30,5	16,1	31	35,2	29,6	14,5
Sum.	5330,3	5245,0	5004,8	Sum.	103,285	10162,9	9700,1
Monatl. Mittel	zu Wiesb.	333,17	Cronb.	327,83	Neuf.	312,9	
Höchst. St. d. 15.	"	336,6	"	330,7	"	316,0	
Tieffster St. d. 7.	"	329,7	"	324,6	"	309,3	
Differenz	"	6,9	"	6,1	"	6,7	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Juni 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	336,5	330,8	315,5	Tröp.	5021,8	4940,4	4722,9
2	35,3	29,8	15,5	16	333,4	327,9	313,1
3	35,3	30,1	15,4	17	34,3	28,6	13,5
4	34,4	28,7	14,4	18	34,3	28,7	13,9
5	33,7	28,1	14,0	19	32,2	27,1	12,4
6	33,8	28,1	14,0	20	31,9	26,8	12,9
7	34,9	29,3	14,7	21	31,4	26,3	11,6
8	35,1	29,7	15,0	22	32,5	26,9	12,3
9	35,1	29,4	14,9	23	32,9	27,4	11,5
10	34,3	29,2	14,8	24	33,6	27,9	12,7
11	35,4	30,3	15,3	25	33,4	27,7	12,8
12	36,0	30,7	15,8	26	32,1	26,5	11,6
13	35,3	29,9	15,6	27	35,7	29,9	14,5
14	34,1	28,8	14,8	28	36,8	31,1	15,6
15	32,6	27,5	13,2	29	35,5	29,9	15,2
Summ.	5021,8	4940,4	4722,9	30	35,4	28,0	13,5
			Summa		10027,2	9861,1	9420,0
Monatl. Mittel zu	Wiesb.	334,3	Cronb.	328,6	Neuf.	314,0	
Höchst. St. d. 28.	"	336,8	"	331,1	"	315,6	
Tiefster St. d. 21.	"	331,4	"	326,3	"	311,6	
Differenz	"	5,4	"	4,8	"	4,0	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Juli 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	332,0	326,6	311,9	Tröp.	5349,5	5259,4	5022,8
2	32,8	27,5	12,4	17	333,0	327,9	313,5
3	33,9	28,1	12,8	18	32,8	27,5	13,4
4	33,3	27,9	13,0	19	32,8	27,4	13,3
5	32,7	27,4	12,7	20	32,1	26,6	12,4
6	35,9	29,8	14,7	21	31,3	25,2	10,9
7	36,0	30,2	15,1	22	32,3	26,4	11,3
8	33,2	27,4	13,4	23	35,2	29,3	14,5
9	32,4	27,1	12,0	24	34,5	29,0	14,2
10	33,6	27,9	13,1	25	32,6	27,1	13,0
11	32,9	27,4	13,4	26	32,7	27,3	12,9
12	33,2	27,5	13,0	27	34,9	29,1	14,4
13	37,1	31,0	15,7	28	34,2	28,9	14,2
14	38,1	32,1	17,0	29	31,1	25,9	11,4
15	37,3	31,6	17,2	30	32,3	26,5	11,5
16	35,1	29,9	15,4	31	33,1	27,3	12,3
Summ.	5349,5	5259,4	5022,8	Summ.	10344,4	10170,8	9716,0
Monatl. Mittel zu	Wiesb.	333,7	Cronb.	328,1	Neuf.	313,4	
Höchst. St. d. 14	"	338,1	"	332,1	(d. 15.)	317,2	
Tiefst. St. d. 29.	"	331,1	(d. 21.)	325,2	(d. 21.)	310,9	
Differenz	"	7,0	"	6,9	"	6,3	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im August 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	335,6	329,5	314,9	Trsp.	5362,3	5275,4	5045,7
2	35,2	29,6	14,9	17	334,5	329,4	315,6
3	33,7	28,2	14,0	18	34,5	29,1	15,2
4	33,2	27,5	13,4	19	33,9	28,8	14,2
5	34,6	29,0	14,3	20	35,4	29,7	15,3
6	33,7	28,1	14,2	21	34,7	29,7	15,4
7	34,2	28,8	14,5	22	34,0	28,6	14,8
8	34,9	29,4	14,7	23	34,0	28,6	14,9
9	34,9	29,4	15,1	24	32,3	27,1	13,6
10	33,0	27,9	13,8	25	31,2	26,3	12,2
11	34,6	29,4	14,5	26	32,5	27,3	12,9
12	37,3	32,0	16,7	27	32,8	27,6	13,4
13	38,5	32,5	18,7	28	34,0	29,1	14,1
14	37,5	32,7	18,4	29	34,0	28,8	14,1
15	36,0	31,2	17,2	30	34,0	28,5	14,0
16	35,4	30,2	16,4	31	33,9	27,9	13,5
Summ.	5362,3	5275,4	5045,7	Summ.	10368,0	10201,9	9758,9

Monatl. Mittel	zu	Wiesb.	334,4	Cronb.	329,9	Neuf.	314,8
Höchst. St. d. 13.	"	"	338,5	(d. 14.)	332,7	(d. 13.)	318,7
Tiefster St. d. 25.	"	"	331,2	"	326,3	"	312,2
Differenz	"	"	7,3	"	6,4	"	6,5

Tägliche mittl. Barometerhöhe bei 0° R. im September 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	335,4	329,8	314,6	Trsp.	5002,9	4920,8	4699,3
2	36,6	30,7	15,6	16	334,4	329,4	314,6
3	36,8	31,1	16,3	17	33,0	27,9	10,4
4	35,8	29,9	15,5	18	32,2	27,0	12,8
5	36,1	30,7	15,6	19	31,2	25,8	11,5
6	33,9	28,4	14,3	20	30,1	24,7	10,4
7	32,6	27,5	13,0	21	29,4	24,0	10,0
8	31,8	26,0	11,4	22	28,7	23,3	08,9
9	32,1	26,4	11,5	23	29,4	23,9	09,0
10	29,4	24,6	09,7	24	29,9	24,3	09,2
11	30,1	24,6	09,6	25	30,3	25,2	09,6
12	30,0	24,6	10,0	26	31,4	26,4	11,1
13	33,3	27,8	13,0	27	30,9	25,7	11,2
14	34,2	29,1	14,6	28	31,8	26,7	11,6
15	34,8	29,6	14,6	29	33,1	27,8	13,5
Summ.	5002,9	4920,8	4699,3	30	34,7	28,9	13,6
				Summa	9973,4	9811,8	9366,7

Monatl. Mittel	zu	Wiesb.	332,4	Cronb.	327,1	Neuf.	312,2
Höchst. St. d. 3.	"	"	336,8	"	331,1	"	316,3
Tiefster St. d. 22.	"	"	328,7	"	323,3	"	308,9
Differenz	"	"	8,1	"	7,8	"	7,4

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Oktober 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	335,8	329,9	313,9	Trsp.	5378,5	5284,5	5045,5
2	36,3	30,4	15,5	17	333,4	328,2	313,6
3	34,3	28,5	13,8	18	29,0	23,7	08,2
4	33,6	28,0	13,2	19	26,3	20,5	05,0
5	35,3	29,5	14,0	20	30,1	24,6	08,9
6	36,2	30,0	14,8	21	33,3	27,0	11,3
7	35,3	29,3	14,4	22	31,9	26,2	10,7
8	37,2	30,7	16,6	23	25,9	20,5	05,0
9	38,4	33,1	17,9	24	27,3	21,3	06,0
10	38,7	33,0	18,1	25	33,3	27,0	11,3
11	37,1	31,4	17,0	26	32,5	26,7	11,4
12	34,6	28,6	14,3	27	33,2	27,1	11,5
13	35,5	29,4	14,6	28	32,1	25,9	10,9
14	36,7	31,0	15,5	29	32,0	26,3	11,0
15	37,1	31,2	15,9	30	34,7	28,9	13,8
16	36,4	30,5	16,0	31	37,0	30,9	15,6
Σum.	5378,5	5284,5	5045,5	Σum.	10350,5	10169,3	9699,7
W. Mittel zu Wiesbaden	333,9	Cronb.	328,0	Neuf.	312,9		
Höchst. St. zu W. d. 10.	338,7	(d. 9.)	333,1	(d. 10.)	318,1		
Tiefster St. " " "	23.	325,9	(d. 19. 23.)	320,5	(d. 19. 23.)	305,0	
Differenz		12,8		12,6		13,1	

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im November 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
1	335,2	329,0	314,6	Trsp.	4994,5	4907,3	4680,1
2	34,7	28,6	14,3	16	331,4	325,6	310,9
3	32,8	27,0	12,5	17	35,9	29,1	14,4
4	33,3	27,6	12,6	18	40,1	33,7	17,4
5	33,2	27,4	12,5	19	38,9	32,8	17,2
6	34,3	28,3	12,6	20	31,2	25,5	10,1
7	34,6	29,1	13,0	21	30,9	25,0	09,9
8	35,1	29,0	13,0	22	28,8	23,6	08,2
9	34,2	28,1	12,7	23	29,4	23,7	08,2
10	33,7	27,7	12,2	24	26,7	21,7	06,0
11	30,3	24,7	09,5	25	26,1	20,9	05,6
12	29,5	23,8	08,5	26	27,1	21,3	05,9
13	31,6	26,0	10,9	27	29,8	24,5	09,5
14	31,0	25,5	10,3	28	29,1	23,6	08,4
15	31,0	25,5	10,9	29	31,9	26,3	10,2
Σum.	4994,5	4907,3	4680,1	30	33,4	27,0	11,5
				Σumma	9965,2	9791,6	9333,5
Monatl. Mittel zu Wiesb.	332,2	Cronb.	326,4	Neuf.	311,1		
Höchst. St. d. 18.	"	"	340,1	"	333,7	"	317,4
Tiefst. St. d. 25.	"	"	326,1	"	320,9	"	305,6
Differenz	"	"	14,0	"	12,8	"	11,8

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Dezember 1842.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cronberg	Neufkirch.
1	338,0	332,0	316,4	Ersp.	5414,0	5314,5	5067,8
2	38,6	32,5	17,2	17	336,6	330,3	315,1
3	38,9	32,6	17,9	18	38,1	31,6	15,9
4	39,7	33,5	18,3	19	38,5	32,2	16,6
5	39,3	32,9	17,9	20	38,9	32,9	17,2
6	38,1	31,7	16,4	21	37,7	31,5	16,6
7	38,1	31,7	16,6	22	36,0	30,0	15,1
8	38,5	32,5	17,0	23	31,9	26,4	11,6
9	39,3	33,0	17,1	24	31,0	25,3	09,8
10	38,9	32,7	17,0	25	34,3	28,1	12,3
11	37,4	31,2	15,7	26	33,5	27,2	11,9
12	37,7	31,6	15,7	27	31,8	25,7	10,5
13	37,8	31,7	16,3	28	34,6	28,6	12,9
14	37,9	31,7	16,1	29	37,0	31,4	15,9
15	38,5	32,2	16,3	30	36,5	30,2	15,2
16	37,3	31,0	15,9	31	34,2	28,5	13,2
Sum.	5414,0	5314,5	50,678	Sum.	10444,6	10254,4	9777,6
Monatl. Mittel	zu	Wiesb.	336,9	Cronb.	330,7	Neuf.	315,4
Höchst. St. d. 4.	"	"	339,7	"	333,5	"	318,3
Tiefster St. d. 24.	"	"	331,0	"	325,3	"	309,8
Differenz	"	"	8,7	"	8,2	"	8,5

Neufkirch, im Jahre 1842.

Oscillation	Tage des höchsten Standes			Tage des tiefsten Standes		
	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
10,8	18	18	18	23	23	23
12,6	15	15	15	24	24	24
12,1	15	15	15	20	20	20
9,4	5	5	5	2	2	2
6,7	15	15	15	7	7	7
4,0	28	28	28	21	21	21
6,3	14	14	15	29	21	21
6,5	13	14	13	25	25	25
7,4	3	3	3	22	22	22
13,1	10	9	10	23	23	23
11,8	18	18	18	25	25	25
8,5	4	4	4	24	24	24

Wiesbad. 340,6 Cronb. 334,7 Neuf. 318,9
 " 225,9 " 320,5 " 305,0

Tab. I. Barometer.

Monatliche Barometer-Mittel bei 0° R. der Stationen Wiesbaden, Cronberg und Neufirch, im Jahre 1842.

Monate.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Höchster Stand			Tiefster Stand			Größe der Oscillation			Tage des höchsten Standes			Tage des tiefsten Standes		
				zu			zu			zu			zu			zu		
				Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.
""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
Januar	334,6	328,7	312,6	338,0	331,9	316,0	328,0	322,1	305,6	10,0	9,8	10,4	18	18	18	23	23	23
Februar	335,7	329,9	314,2	340,6	334,7	318,9	327,1	322,1	306,9	13,5	12,6	12,0	15	15	15	24	24	24
März	333,0	327,2	311,9	339,2	333,2	318,0	327,0	321,4	305,9	12,2	11,8	12,1	15	15	15	20	20	20
April	333,4	327,9	312,6	337,3	331,2	315,6	328,0	322,2	306,2	9,3	9,1	9,4	5	5	5	2	2	2
Mai	333,2	327,8	312,9	336,6	330,7	316,0	329,7	324,6	309,3	6,9	6,1	6,7	15	15	15	7	7	7
Juni	334,3	328,6	314,0	336,8	331,1	315,6	331,4	326,3	311,6	5,4	4,8	4,0	28	28	28	21	21	21
Juli	333,7	328,1	313,4	338,1	332,1	317,2	331,1	325,2	310,9	7,0	6,9	6,3	14	14	15	29	21	21
August	334,4	329,1	314,8	338,5	332,7	318,7	331,2	326,3	312,2	7,3	6,4	6,5	13	14	13	25	25	25
September	332,4	327,1	312,2	336,8	331,1	316,3	328,7	323,3	308,9	8,1	7,8	7,4	3	3	3	22	22	22
Oktober	333,9	328,0	312,9	338,7	333,1	318,1	325,9	320,5	305,0	12,8	12,6	13,1	10	9	10	23	23	23
November	332,2	326,4	311,1	340,1	333,7	317,4	326,1	320,9	305,6	14,0	12,8	11,8	18	18	18	25	25	25
Dezember	336,9	330,7	315,4	339,7	333,5	318,3	331,0	325,3	309,8	8,7	8,2	8,5	4	4	4	24	24	24

B e m e r k u n g e n .

- 1) Jahres-Mittel zu Wiesbaden 333,9 Cronberg 328,3 Neufirch 313,2 3) Höchster Stand d. 15. Febr. zu Wiesbad. 340,6 Cronb. 334,7 Neuf. 318,9
 2) Größe der Oscillation " 9,6 " 9,08 " 9,01 4) Tiefster " d. 23. Okt. " 225,9 " 320,5 " 305,0
 5) Differenz zu Wiesbaden 14,7 Cronberg 14,2 Neufirch 13,9.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Täglicher Gang des Barometers im Mittel nebst Angabe der monatlichen Mittel und Extreme zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch. 1842 1-14](#)