

Täglicher Gang

des

Barometers im Mittel

nebst

Angabe der monatlichen Mittel und Extreme

zu

Wiesbaden, Cronberg und Neufirch.

1846.

Januar 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neufirch.
1	330,9	324,3	309,0	17	332,1	327,4	312,8
2	32,9	28,1	13,6	18	31,6	26,6	12,2
3	38,1	32,9	18,2	19	29,9	25,7	10,9
4	35,6	30,5	15,3	20	30,1	25,4	10,5
5	34,2	29,2	13,8	21	29,8	25,2	10,4
6	36,7	31,5	16,2	22	26,3	21,9	07,0
7	38,8	33,6	18,0	23	27,0	22,0	08,1
8	40,2	35,0	19,7	24	29,0	23,6	08,7
9	41,0	35,9	21,0	25	28,9	24,5	09,6
10	39,6	34,1	19,0	26	25,0	20,2	05,5
11	37,1	32,2	17,2	27	27,8	22,7	08,2
12	35,2	30,5	15,7	28	29,9	25,1	10,4
13	31,8	27,6	12,6	29	29,5	24,8	10,3
14	31,2	26,4	11,5	30	32,4	26,9	12,6
15	33,1	28,3	13,7	31	32,5	27,2	12,8
16	33,4	28,6	13,6	Sum.	10311,6	10157,9	9698,0

Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,63; Cronb. 327,67; Neuf. 312,84.

Höchster Stand d. 9. 341,0; (d. 9.) 335,9; (d. 9.) 321,0.

Tiefster Stand d. 26. 325,0; (d. 26.) 320,2; (d. 26.) 305,5.

Differenz 16,0; 15,7; 15,5.

Februar 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
					///		
1	330,9	325,6	310,7	16	333,7	328,9	314,0
2	30,0	25,3	10,2	17	32,0	27,2	12,2
3	33,3	28,3	13,5	18	31,4	26,5	11,6
4	33,5	28,1	13,6	19	33,4	28,5	13,6
5	31,3	26,9	11,7	20	35,2	30,3	15,3
6	32,3	27,1	12,2	21	36,3	31,2	16,4
7	31,7	26,8	11,7	22	36,6	31,7	16,9
8	31,3	26,4	11,1	23	34,4	29,8	14,8
9	32,2	27,0	12,1	24	32,5	28,3	13,8
10	36,1	30,7	15,4	25	32,1	27,3	12,9
11	32,8	27,3	12,1	26	33,3	28,7	14,4
12	33,2	27,9	13,2	27	32,3	28,1	13,5
13	33,1	28,1	13,0	28	33,2	28,5	14,2
14	33,3	28,1	13,0				
15	35,1	30,2	15,1	Sum.	9326,5	9188,8	8772,6

Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,09; Cronb. 328,10; Neuf. 313,31.

Höchst. Stand d. 22. 336,6; (d. 22) 331,7; (d. 22.) 316,9.

Tiefst. Stand d. 2. 330,0; (d. 2.) 325,3; (d. 2.) 310,2.

Differenz 6,6; Cronb. 6,4; Neuf. 6,7.

März 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= kirch.	Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= kirch.
		///	///		///	///	///
1	335,0	330,2	316,1	17	328,0	323,1	308,7
2	34,7	29,9	15,3	18	28,3	23,6	09,0
3	34,6	30,0	15,7	19	30,1	24,9	10,1
4	31,2	26,4	11,7	20	30,3	25,9	11,0
5	30,9	26,3	11,7	21	30,5	25,8	10,9
6	31,5	26,9	12,1	22	29,3	24,2	08,9
7	31,5	26,8	12,4	23	28,0	23,3	08,3
8	31,9	26,8	12,2	24	28,7	24,1	09,3
9	34,9	29,7	15,5	25	29,3	24,3	09,5
10	37,5	32,2	18,0	26	29,7	24,9	09,7
11	38,8	33,3	19,0	27	31,6	26,7	11,8
12	39,3	34,1	20,1	28	28,2	23,5	08,9
13	37,5	32,6	18,1	29	30,7	24,8	09,1
14	33,9	29,0	14,4	30	34,7	29,8	15,5
15	32,1	27,1	12,6	31	31,0	26,6	11,9
16	29,6	25,3	10,6	Sum.	10293,3	10142,1	9688,1

Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,04; Cronb. 327,16; Neuf. 312,52.
 Höchst. Stand d. 12. „ 339,3; (d. 12.) 334,1; (d. 12.) 320,1.
 Tiefst. Stand d. 17. u. 23. 328,0; (d. 17.) 223,1; (d. 23.) 308,3.
 Differenz 11,3; Cronb. 11,0; Neuf. 11,8.

April 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= firch.	Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= firch.
		///					
1	330,0	325,6	311,3	17	331,8	327,3	313,6
2	29,0	24,2	09,7	18	30,5	25,6	11,9
3	28,4	23,5	08,9	19	31,7	26,8	12,8
4	29,4	24,4	09,7	20	32,4	27,0	13,1
5	27,7	21,9	07,3	21	32,2	27,3	12,9
6	25,1	19,7	05,4	22	31,8	27,3	13,0
7	25,0	19,4	04,3	23	31,1	26,5	12,4
8	24,1	19,6	05,4	24	32,2	27,6	13,4
9	28,6	23,9	09,5	25	32,0	27,4	13,6
10	32,4	27,4	13,0	26	30,1	24,0	10,1
11	30,5	25,6	11,2	27	30,4	25,2	10,4
12	29,8	25,3	10,8	28	32,4	27,4	13,2
13	32,4	27,4	13,3	29	34,3	29,3	15,4
14	32,2	26,8	13,1	30	35,7	30,8	16,2
15	32,3	27,0	12,9				
16	31,9	27,9	14,0	Sum.	9917,4	9769,1	9341,8

Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,58; Cronb. 325,64; Neuf. 311,39.

Höchst. St. d. 30. 335,7; (d. 30.) 330,8; (d. 30.) 316,2.

Tiefst. St. d. 8. 324,1; (d. 7.) 319,4; (d. 7.) 304,3.

Differenz zu 11,6; Cronb. 11,4; Neuf. 11,9.

Mai 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies= baden.	Eron= berg.	Neu= firch.	Datum.	Wies= baden.	Eron= berg.	Neu= firch.
							///
1	337,0	332,1	317,2	17	327,1	322,6	307,9
2	35,1	30,5	16,4	18	28,4	23,8	09,1
3	33,7	29,1	15,0	19	31,4	26,6	11,9
4	32,4	27,9	13,9	20	31,5	27,0	12,7
5	30,3	26,0	11,8	21	32,0	27,2	13,3
6	29,7	24,9	10,6	22	34,6	29,7	16,6
7	30,7	26,1	11,6	23	35,1	30,2	16,7
8	31,7	27,0	12,9	24	35,1	30,4	16,8
9	33,9	28,5	14,6	25	34,3	29,4	15,7
10	33,1	28,4	14,2	26	33,7	28,9	14,7
11	34,4	29,7	15,7	27	33,2	28,3	14,1
12	33,0	28,1	14,2	28	33,9	29,0	14,7
13	29,7	25,1	11,1	29	36,2	31,3	17,0
14	30,2	25,5	11,4	30	36,2	31,4	17,5
15	30,9	26,3	12,3	31	35,4	30,5	16,7
16	27,7	23,3	09,9	Sum.	10311,6	10164,8	9728,2

Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,63; Eronb. 327,80; Neuf. 313,81.

Höchst. St. d. 1. 337,0; (d. 1.) 332,1; (d. 30.) 317,2.

Tiefst. St. d. 17. 327,1; (d. 17.) 322,6; (d. 17.) 307,9.

Differenz zu 9,9; Eronb. 9,5; Neuf. 9,3.

Juni 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
1	335,7	330,7	316,7	17	335,7	331,5	317,9
2	35,8	31,2	17,1	18	35,1	30,2	16,8
3	35,4	30,9	17,2	19	34,4	29,3	15,8
4	36,2	30,3	16,6	20	33,8	28,7	15,4
5	35,5	30,1	16,4	21	34,5	29,6	16,2
6	35,4	29,6	16,1	22	33,2	28,5	15,1
7	34,9	28,7	15,0	23	31,3	26,2	11,9
8	31,5	27,0	13,3	24	28,7	24,3	10,1
9	30,8	26,3	12,4	25	30,8	24,8	10,3
10	33,5	28,4	14,8	26	31,7	26,7	12,9
11	35,2	30,7	17,0	27	30,6	25,8	11,6
12	35,6	30,9	17,4	28	33,3	28,5	14,7
13	34,2	29,8	16,3	29	33,1	28,2	14,5
14	33,8	29,3	15,8	30	33,2	28,3	14,6
15	34,2	29,7	16,1	Sum.	10013,2	9865,6	9453,8
16	36,1	31,4	17,8				

Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,77; Cronb. 328,85; Neuf. 315,13.
 Höchst. St. d. 4. 336,2; (d. 17.) 331,5; (d. 17.) 317,9.
 Tiefst. St. d. 24. 328,7; (d. 24.) 324,3; (d. 24.) 310,1.
 Differenz zu 75; Cronb. 7,2; Neuf. 7,8.

Juli 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Eron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Eron- berg.	Neu- kirch.
1	334,3	329,5	315,5	17	328,8	323,8	309,6
2	34,8	29,9	16,0	18	31,0	25,7	11,1
3	35,4	30,4	17,0	19	32,5	27,7	13,8
4	35,5	30,4	17,3	20	34,8	28,3	14,6
5	32,3	28,1	14,6	21	35,9	29,4	15,4
6	31,2	26,9	12,7	22	33,6	28,1	13,9
7	31,4	26,5	12,2	23	33,7	28,7	14,8
8	32,9	27,8	13,9	24	33,3	27,9	14,3
9	31,2	26,6	12,7	25	33,7	28,2	14,4
10	32,4	27,3	13,3	26	35,4	30,3	16,9
11	34,3	29,0	15,0	27	36,6	31,7	18,5
12	34,4	29,5	15,9	28	35,7	31,1	17,5
13	34,3	28,9	15,5	29	34,6	29,5	16,1
14	32,1	27,3	12,8	30	33,3	28,6	15,1
15	32,7	27,6	14,0	31	32,8	28,0	14,4
16	31,4	26,4	12,9	Σum.	10336,3	10179,6	9751,7

///

Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,43; Eronb. 328,37; Neuf. 314,57.

Höchst. St. d. 27. 336,6; (d. 27.) 331,7; (d. 27.) 318,5.

Tiefst. St. d. 17. 328,8; (d. 17.) 323,8; (d. 17.) 309,6.

Differenz zu 7,8; Eronb. 7,9; Neuf. 8,9.

August 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
	///				///		
1	331,5	326,8	313,8	17	332,2	327,4	313,6
2	31,4	26,6	13,1	18	31,3	26,6	13,1
3	33,4	28,5	14,4	19	31,5	26,7	13,0
4	34,3	29,0	14,6	20	31,8	26,8	12,9
5	32,9	28,3	14,6	21	30,1	25,4	11,4
6	31,9	27,2	13,9	22	31,0	26,1	13,2
7	30,9	26,1	12,6	23	32,2	27,3	14,2
8	31,3	26,6	12,4	24	32,8	28,5	15,5
9	33,0	28,6	13,0	25	33,8	29,0	15,8
10	34,4	29,6	14,4	26	33,7	28,9	15,5
11	34,6	29,9	14,5	27	32,7	27,8	14,5
12	34,5	29,6	14,0	28	32,0	27,1	13,7
13	32,5	27,8	13,2	29	31,3	26,4	13,0
14	32,4	27,1	12,6	30	32,2	27,2	14,4
15	31,8	27,1	13,6	31	33,6	28,6	15,3
16	31,3	26,6	13,8				
				Σmm.	10304,3	10155,2	9727,6

Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,40; Cronb. 327,60; Neuf. 313,79.

Höchst. St. d. 11. 334,6; (d. 11.) 329,9; (d. 25.) 315,8.

Tiefst. St. d. 21. 330,1; (d. 21.) 325,4; (d. 21.) 311,4.

Differenz zu 4,5; Cronb. 4,5; Neuf. 4,4.

September 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
	///					///	
1	333,5	328,7	315,2	17	333,1	328,4	314,5
2	34,7	29,7	16,6	18	31,3	26,5	12,3
3	35,1	30,4	17,1	19	30,5	26,0	12,2
4	34,8	30,1	16,6	20	28,2	23,6	09,6
5	34,6	29,8	16,5	21	28,8	24,1	10,0
6	33,8	29,2	15,7	22	30,5	25,7	11,9
7	33,3	28,6	15,2	23	30,4	25,7	11,9
8	33,6	28,9	15,5	24	30,2	25,5	10,9
9	34,1	29,5	16,1	25	32,0	27,1	12,6
10	35,4	31,9	17,2	26	32,8	27,8	14,0
11	36,4	31,7	18,4	27	32,6	28,2	14,1
12	35,4	30,9	17,5	28	30,8	26,1	12,2
13	34,1	29,5	15,7	29	28,1	23,3	09,7
14	35,2	30,5	16,7	30	29,4	25,2	11,0
15	35,3	30,6	16,7				
16	34,9	30,2	16,5	Sum.	9982,9	9843,4	9430,1

Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,76; Cronb. 328,11; Neuf. 314,34.

Höchst. St. d. 11. 336,4; (d. 10.) 331,9; (d. 11.) 318,4.

Tieft. St. d. 29. 328,1; (d. 29.) 323,3; (d. 20.) 309,6.

Differenz zu 8,3; Cronb. 8,6; Neuf. 8,8.

October 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= kirch.	Datum.	Wies= baden.	Cron= berg.	Neu= kirch.
1	330,6	327,2	313,9	17	328,0	323,6	309,6
2	30,2	25,3	11,7	18	30,4	25,5	11,7
3	29,9	24,9	11,0	19	32,2	27,1	13,8
4	30,9	26,0	12,2	20	30,8	25,7	11,9
5	30,6	25,8	11,4	21	28,8	24,3	09,8
6	31,8	27,0	12,5	22	28,5	23,7	08,6
7	30,9	26,3	11,6	23	32,4	26,9	12,9
8	30,3	25,8	10,8	24	32,0	26,0	12,5
9	32,8	27,8	13,6	25	30,2	25,1	11,0
10	32,4	27,6	13,0	26	32,4	27,2	13,0
11	33,1	27,4	13,4	27	34,4	29,2	15,6
12	29,7	24,8	10,6	28	34,0	29,0	15,3
13	29,7	24,9	10,4	29	33,4	28,3	14,4
14	29,1	24,6	10,0	30	33,6	28,3	14,5
15	26,7	22,2	07,9	31	34,8	29,7	15,7
16	26,5	22,1	08,0				
				Sum.	10261,1	10008,5	9672,3

Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,00; Cronb. 326,08; Neuf. 312,02.

Höchst. St. d. 31. 334,8; (d. 31.) 329,7; (d. 31.) 31,57.

Tieft. St. d. 16. 326,5; (d. 16.) 322,1; (d. 15.) 307,9.

Differenz zu 8,3; Cronb. 7,6; Neuf. 7,8.

November 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.	Datum.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- kirch.
1	335,3	329,9	315,8	17	335,8	331,0	315,8
2	35,6	30,3	15,8	18	34,4	29,4	14,5
3	36,6	31,3	16,6	19	33,8	29,3	14,8
4	37,6	31,7	17,3	20	32,2	27,7	13,1
5	37,7	31,9	17,2	21	32,7	27,5	13,5
6	36,7	31,5	16,7	22	29,4	24,6	09,8
7	37,0	31,7	16,8	23	31,5	26,2	11,7
8	38,2	32,7	18,0	24	31,3	26,1	11,8
9	38,7	33,4	18,8	25	30,4	25,8	11,7
10	36,6	31,8	17,1	26	27,3	22,9	08,7
11	35,7	30,7	16,6	27	25,8	21,1	07,1
12	36,8	31,8	17,3	28	26,1	21,8	07,6
13	36,9	31,8	17,3	29	28,6	24,7	10,1
14	36,4	30,6	16,7	30	31,4	26,1	11,3
15	36,3	30,8	16,4				
16	36,9	32,1	17,3	Sum.	10019,7	9868,2	9433,2

Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,99; Cronb. 328,94; Neuf. 314,44.

Höchst. St. d. 9. 338,7; (d. 9.) 333,4; (d. 9.) 318,8.

Tiefst. St. d. 27. 325,8; (d. 27.) 321,1; (d. 27.) 307,1.

Differenz zu 12,9; Cronb. 12,3; Neuf. 11,7.

December 1846.

Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R.

Datum.	Wies=	Cron=	Neu=	Datum.	Wies=	Cron=	Neu=
	baden.	berg.	firch.		baden.	berg.	firch.
			///				
1	330,3	325,9	311,1	17	329,3	324,0	308,8
2	25,7	21,4	06,5	18	34,4	29,2	14,2
3	28,5	23,2	08,4	19	33,3	27,6	12,2
4	30,3	25,4	10,8	20	33,1	27,6	12,8
5	32,1	27,3	13,3	21	28,1	23,5	07,8
6	33,1	26,6	11,4	22	22,3	17,9	02,5
7	31,4	26,3	12,2	23	19,3	16,3	00,9
8	32,4	27,6	13,2	24	24,6	20,0	05,6
9	33,0	28,6	14,0	25	29,3	24,9	09,2
10	33,1	26,0	11,3	26	34,3	29,1	13,9
11	27,9	22,8	07,7	27	36,3	31,9	16,1
12	27,2	22,2	07,6	28	37,8	33,2	18,0
13	30,2	24,4	09,0	29	37,6	34,0	18,6
14	28,9	23,9	07,9	30	39,6	35,0	19,6
15	27,0	22,0	06,5	31	39,1	33,9	18,5
16	27,2	22,2	06,8	Sum.	10256,7	10103,9	9636,4

Monatl. Mittel zu Wiesb. 330,86; Cronb. 325,93; Neuf. 310,85.

Höchst. Stand d. 30. " 339,6; (d. 30.) 335,0; (d. 30.) 319,6.

Tieft. Stand d. 23. " 319,3; (d. 23.) 316,3; (d. 23.) 300,9.

Differenz 20,3; Cronb. 18,7; Neuf. 18,7.

Tab. VI. Barometer.

Monatliche Barometer-Mittel bei 0° R. der Stationen zu Wiesbaden, Cronberg und Neufirch im Jahre 1846.

Monate.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	Höchster Stand zu			Tiefster Stand zu			Größe der Oscillation zu			Datum des						
				Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cronberg.	Neufirch.	Wies- baden.	Cron- berg.	Neu- firch.	höchsten Standes zu			tiefsten Standes zu			
Januar	332,63	327,67	312,84	341,0	335,9	321,0	325,0	320,2	305,5	16,0	15,7	15,5	9	9	9	26	26	26	
Februar	33,09	28,10	13,31	36,6	31,7	16,9	30,0	25,3	10,2	6,6	6,4	6,7	22	22	22	2	2	2	
März	32,04	27,16	12,52	39,3	34,1	20,1	28,0	23,1	08,3	11,3	11,0	11,8	12	12	12	23	17	23	
April.	30,58	25,64	11,39	35,7	30,8	16,2	24,1	19,4	04,3	11,6	11,4	11,9	30	30	30	8	7	7	
Mai	32,63	27,80	13,81	37,0	32,1	17,2	27,1	22,6	07,9	9,9	9,5	9,3	1	1	30	17	17	17	
Juni	33,77	28,85	15,13	36,2	31,5	17,9	28,7	24,3	10,1	7,5	7,2	7,8	4	17	17	24	24	24	
Juli.	33,43	28,37	14,57	36,6	31,7	18,5	28,8	23,8	09,6	7,8	7,9	8,9	27	27	27	17	17	17	
August	32,40	27,60	13,79	34,6	29,9	15,8	30,1	25,4	11,4	4,5	4,5	4,4	11	11	25	21	21	21	
September	32,76	28,11	14,34	36,4	31,9	18,4	28,1	23,3	09,6	8,3	8,6	8,8	11	10	11	29	29	20	
Oktober	30,00	26,08	12,02	34,8	29,7	15,7	26,5	22,1	07,9	8,3	7,6	7,8	31	31	31	16	16	15	
November.	33,99	28,94	14,44	38,7	33,4	18,8	25,8	21,1	07,1	12,9	12,3	11,7	9	9	9	27	27	27	
December	30,86	25,93	10,85	39,6	35,0	19,6	19,3	16,3	00,9	20,3	18,7	18,7	30	30	30	23	23	23	
Jahresmittel	332,35	327,52	313,25	337,21	332,31	318,01	326,79	322,24	307,73	10,42	9,85	10,28	—	—	—	—	—	—	
	Höchster Stand des Jahres			341,0	335,9	321,0	—	—	—	—	—	—	9. Jan.	9. Jan.	9. Jan.	—	—	—	
	Tiefster Stand des Jahres			—	—	—	319,3	316,3	300,9	—	—	—	—	—	—	—	30. Dec.	30. Dec.	30. Dec.
	Differenz			—	—	—	—	—	—	21,7	19,6	20,1	—	—	—	—	—	—	

Bemerkungen. Zu Wiesbaden und Neufirch wurde Morgens 9 Uhr, Nachmittags 3 Uhr und Abends 9 Uhr beobachtet; zu Cronberg um 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und Abends 10 Uhr.

Uebersicht der wirklich beobachteten monatlichen höchsten und tiefsten Barometerstände bei 0° R. zu Wiesbaden im Jahr 1846.

Monate.	Stand		Unterschied.	Zeit des			
	höchster	tiefster		höchsten Standes.		tiefsten Standes.	
				Datum.	Uhr.	Datum.	Uhr.
Januar	341,1	324,5	16,6	9	9 M.	26	3
Februar .	337,2	328,9	8,3	22	3	2	3
März	339,4	325,3	14,1	12	9 M.	28	9 U.
April	335,9	324,6	11,3	30	9 U.	7	9 U.
Mai	337,2	326,6	10,6	1	9 U.	16	9 U.
Juni	335,5	327,8	7,7	17	9 M.	24	3
Juli .	336,6	328,0	8,6	27	9 M.	17	3
August	334,8	329,6	5,2	11	9 M.	21	3
September	336,6	327,2	9,4	11	9 M.	29	9 U.
October	335,0	326,4	8,6	31	9 U.	16	9 U.
November .	338,8	325,6	13,2	9	9 M.	27 u. 28	3,9 M U
December	339,7	319,5	20,2	30	9 U.	23	9 M.
Jahresmittel	337,32	326,17	11,15	—	—	—	—
Jahr.=Ertr.	341,1	319,5	21,6	9 Jan.	9 M.	23. Dec.	9 M.

Uebersicht der wirklich beobachteten monatlichen höchsten und tiefsten Barometerstände bei 0° R. zu Cronberg im Jahre 1846.

Monate.	Stand		Unterschied.	Zeit des			
	höchster	tiefster		höchsten Standes.		tiefsten Standes.	
				Datum.	Uhr.	Datum.	Uhr.
Januar	336,1	320,2	15,9	9	1	26	1
Februar .	332,1	324,0	8,1	22	7	2	1
März .	334,2	320,8	13,4	12	1	28	10
April	331,2	319,2	12,0	30	10	7	10
Mai	332,2	322,0	10,2	1	10	16	10
Juni	331,8	322,3	9,5	17	7	24	10
Juli	331,8	323,4	8,4	27	1	17	1
August	330,0	325,1	4,9	11 u. 12	7	21	1
September	331,8	322,2	9,6	11	1	29	10
October .	330,0	321,6	8,4	31	10	16	1
November	333,5	320,9	12,6	9	7 u. 10	27	1
December	335,0	315,0	20,0	30	7 u. 10	23	1
Jahresmittel	332,47	321,40	11,08	—	—	—	—
Jahr.-Ertr.	336,1	315,0	21,1	9 Jan.	1	23. Dec.	1

Uebersicht der wirklich beobachteten monatlichen höchsten und tiefsten Barometerstände bei 0° R. zu Neukirch im Jahr 1846.

Monate.	Stand		Unterschied.	Zeit des			
	höchster	tiefster		höchsten Standes.		tiefsten Standes.	
				Datum.	Uhr.	Datum.	Uhr.
Januar	321,0	305,3	15,7	9	9 M.	26	3
Februar	316,3	309,3	7,0	22	9 U.	2	3
März	320,5	307,2	13,3	12	9 M.	28	9 U.
April	316,0	304,3	11,7	30	9 M.	7	9 U.
Mai	317,9	307,8	10,1	30	9 M.	17	9 U.
Juni	318,3	309,8	8,5	17	9 M.	25	9 M.
Juli.	319,7	309,5	10,2	27	3	17	9 U.
August	314,5	311,1	3,4	11	3	21	3
September	318,4	308,9	9,5	11	9 M.	29	9 U.
October	315,7	307,7	8,0	31	9 U.	16	3
November.	318,9	306,9	12,0	9	9 M. 3	27	9 U.
December	319,7	300,5	19,2	30	9 M. 3	23	3
Jahresmittel	318,08	307,36	10,72	—	—	—	—
Jahr.-Ertr.	321,0	300,5	20,5	9 Jan.	9 M.	23. Dec.	3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1845-1848

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Täglicher Gang des Barometers im Mittel nebst Angabe der monatlichen Mittel und Extreme zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch. 1846 82-97](#)