

## Nachtrag

zur siebenten Besprechung mittelhheinischer Macrol  
lepidopteren.

Der noch andauernde Abendfang theils an Haideblüthe, theils an Köder, hat 2 weitere neue Aberrationen zu meiner Kenntniss gebracht, die noch benannt und wenigstens kurz charakterisirt werden sollen, indem ich mir eine eingehendere Besprechung für das nächste Heft vorbehalte.

### 1. *Agrotis margaritacea* Bkh.

**Ab. immaculata:** Vorderflügel zeichnungslos, licht weisslich blaugrau, am Saume breit bräunlich bestäubt, ohne den sonst üblichen schwarzen, viereckigen Fleck zwischen den fehlenden Makeln unterhalb des Vorderrandes.

Von Bornich, aus dem Lennig (Rheinberge), 21. 8. 1900 Abends an Haideblüte.

### 2. *Agr. plecta* L.

**Ab. rubricosta:** Der Vorderrand der Vorderflügel breit veilroth (statt weissgelb), von der Färbung des übrigen Flügels nicht verschieden.

Von Bornich, 9. 8. 1900, an Köder in meinem Hausgarten unter vielen Stücken von gewöhnlichem Aussehen.

Bornich, den 22. August 1900.

A. Fuchs.

---