

XIV

	Seite		Seite
<i>curvirostra</i> <i>Brid.</i>	8	<i>Starkeana</i> <i>Brid.</i>	8
<i>cylindrica</i> <i>Brid.</i>	9	<i>viridula</i> <i>L.</i>	7
<i>fugax</i> <i>Brid.</i>	7		
<i>geniculata</i> <i>Brid.</i>	4	Zygodon	
<i>leptodon</i> <i>Brid.</i>	7	<i>conoideus</i> <i>Hook.</i>	16
<i>mucronata</i> <i>Bruch.</i>	7	<i>lapponicus</i> <i>Br. & Sch.</i>	16
<i>pusilla</i> <i>Brid.</i>	3	<i>viridissimus</i> <i>Brid.</i>	16

Verbesserungen.

- Seite 8 Z. 7 v. u. lies *Dermatodon rubellus* statt *Anacalypta lanceolata*.
- 12 Z. 14 *Grimmia anodon* muss nach Nro. 96 stehen.
 - 13 zu Nro. 103 als Standort »auch auf dem Altkings«.
 - 15 Nro. 135 lies *leiocarpum* st. *leucocarpum*.
 - 17 bei Nro. 151 ist der Standort »verlassene Waldwege bei der Platte (Genth)« auszustreichen und zu
 - 18 *Physcomitr. ericoides* die Nro. 153a und zu dem Standorte »auf verlassenen Waldwegen bei der Platte (Genth)« hinzuzufügen (nach Originalexemplaren aus Hübener's Sammlung).
 - 20 Z. 13 v. unten l. *Homberg* st. *Stomberg*.
 - 28. Das *Hypnum heterophyllum* Hübener ist nach Originalexemplaren, in Hamburg gesammelt, aus seinem Herbar nur eine, auf schattigem Standorte gewachsene Form des *Hypnum rutabulum*, welche auch im ganzen Taunus vorkommt.
 - 31 Z. 8 v. o. l. *textorum* st. *textorum*.
 - 47 Z. 9 v. u. *Pleurochismatis* zu streichen.
 - 55 Z. 9 v. o. l. *Rebouilla* st. *Reboulia*.
 - 60 Z. 10 v. o. l. *ambitu* st. *ambita*.
 - 80 Nro. 556 l. *glebulosa* st. *globulosa*.
 - 83 Z. 6 v. o. l. *Bodenthal* st. *Rodenthal*.
 - 84 Z. 8 v. u. l. *theiodes* st. *theodes*.
 - 84 Z. 6 v. u. l. *grauer* st. *grüner*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1849

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Verbesserungen. XIV](#)