

Schichtenaufnahme

der Hydrobienschichten (Normalprofil) in den Steinbrüchen
des Bonner Bergwerks- und Hüttenvereins nordöstlich von
Budenheim bei Mainz.

Von

K. Fischer.

+ 124 — 123,70 m über N. N.	— Schwach humoser Ackerboden (durchsetzt von einzelnen Geröllen). Funde aus der Römerzeit sind westlich von Mainz wesentlich seltener, wie in der Richtung auf Zahlbach und Weisenau zu. Die dort verhältnismäsig häufigen Abfallgruben treten bei Budenheim nicht in Erscheinung. Der Fund eines Steinsargs im Abraum der dortigen grossen Kalkbrüche (1908) beweist jedoch auch hier nachbarliche Siedlung.	Alluvium
+ 123,70 — 122,50 m	— Flugsand.	
+ 122,50 — 121,00 m	— Grober Kies, fast ausschliesslich aus Maingeröllen zusammengesetzt (bemerkenswert ist das häufige Auftreten von kleinen »Karneol«-Geschieben). Auf der oft trichterförmig ausgehöhlten Felsoberfläche des Hydrobienkalks sind hier und da Reste gelblicher, eisen-schüssiger Sande mit Milchquarzkieseln zu beobachten. An der Sohle dieser Taschen (Westseite des Bruchs) zeigten sich sogar einmal handbreite Ablagerungen von bis nussgrossem Bohnerz (noch weiter westlich in grösserer Mächtigkeit schon lange bekannt!).	Diluvium ? Dinotherien-sande

+ 121,00 — 119,40 m	— Gelbliche stark zersetzte, mergelige Kalke (»Hydrobia elongata« ist darin einzeln, nicht schichtweise verteilt).	Obere Hydribienschichten
+ 119,40 — 119,20 m	— Graugrüner, fetter Ton mit kohligem Einlagerungen.	
+ 119,20 — 119,00 m	— Lose aufgehäufte Hydrobien mit geringem Zwischenmittel, einheitlich mit »Sapropel« durchgefärbt.	
+ 119,00 — 118,70 m	— Dünnschichtiger, grauer Ton, mit kreidigen Lagen wechselt lagernd (Diatomeenabsätzen vergleichbar)!	
+ 118,70 — 118,40 m	Sapropelitband, gegen die obere Schichtfuge reiner = dunkler werdend. Darin: »Hydrobia elongata« in Massen; desgl. Land- und Süßwasserschnecken als: Gyraulus dealbatus, Gyraulus applanatus, Planorbis cornu, Cepaea subglobosa-subsoluta (stark gekielte Varietät), Carychium antiquum etc.; ausserdem Wirbeltierreste.	
+ 118,40 — 116,50 m	Gelber Ton mit kleinen Kalkkonzessionen, im Strich eingelagert.	
+ 116,50 — 116,30 m	Gelber Ton mit grossen Kalkseptarien.	
+ 116,30 — 107,00 m	Dünnschichtige Kalkmergel, fast ausschliesslich aus Hydrobien mit geringem Bindemittel aufgebaut, wechselt lagernd mit dünnschichtigen Letten- und Tonbändern.	
+ 107,00 — 104,50 m	Harte Felsenkalke, von Spalten vertikal zerklüftet. Bausteinlage. An sehr vielen Stellen sind die dichten Kalke durch lockere, zellige Algenkalke ersetzt. Schicht der	

	grösseren eingeschwemmten Landschnecken. Darunter: <i>Cepaea maguntiana</i> , var. <i>major</i> , <i>Monacha punctigera</i> , <i>Galactochilus inflexum mattiacum</i> , <i>Clausilia bulimoides</i> etc.	
+ 104,50 — 103,00 m	— Schalenanhäufungen der » <i>Hydrobia elongata</i> « in tonigem Bindemittel. Einige durch Sapropel dunkel gefärbte Fossilbänder durchziehen diesen Horizont; sie enthalten massenhafte Schälchen von kleinen Landschnecken der Uferzone, ausserdem Wirbeltierreste (Knochenschicht Herm. von Meyers 1850).	
+ 103,00 — 102,30 m	— Grünlich graue, etwas zersetzte, tonige Kalksteine, darin an Fossilien: <i>Melanopsis Fritzei</i> , <i>Vivipara pachystoma</i> etc.	Untere Hydrobien-schichten
+ 102,30 — 100,00 m	— Bräunliche und gelbliche Letten, dünn schichtig, durchzogen von Kalkseptarien.	
+ 100,00 — 85,00 m	— Blauschwarze, fette Schieferletten mit Gipskristallen und Fischresten. » <i>Hydrobia elongata</i> « meist vereinzelt eingebettet, desgl. Phryganeenlarven. Von eingeschwemmten Landschnecken tritt <i>Cepaea subglobosa-subglobosa</i> schon in der charakteristischen Form aus den tieferen »Corbiculaschichten« auf. (An der oberen Schichtgrenze »Wasserhorizont.«)	
+ 84 m über N. N.	— Tiefschwarze Letten mit <i>Hydrobia inflata</i> und <i>Hydrobia elongata</i> var. <i>procera</i> , beide vereinzelt.	Corbicula-schichten

Abschluss der Untersuchungen im August 1922.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [76](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Schichtenaufnahme der Hydrobienschichten \(Normalprofil\) in den Steinbrüchen des Bonner Bergwerks- und Hüttenvereins nordöstlich von Budenheim bei Mainz. 78-80](#)