

- A. Segm. 1—2 gefleckt; 2 $\frac{1}{2}$ ♀. *nana*. n. sp.
 B. Segm. 1—4 gefleckt; 3 ♀. *octomaculata*. Sm. (S. 237.)
- II. Hinterleib nicht gefleckt.
 A. Ränder der Segmente breit blaß gefärbt; 4 ♀. *aterrima*. Latr.
 B. Ränder der Segmente nicht blaß gefärbt.
 a. Thorax und Hinterleib sehr grob punktiert; 4 ♀.
 phaeoptera. Latr.
 b. Thorax und Hinterleib ziemlich fein punktiert; 2—2 $\frac{1}{2}$ ♀.
 pygmaea. n. sp.

Nachträge zu den Vesparien.

- 1) *Odynerus exilis* findet sich auch bei Weilburg; Anfangs Juli gefangen.
- 2) *O. Antilope* bei Weilburg im Juni auf *Bryonia* gefangen.
- 3) *Eumenes coarctata*. L. (*coronata* Pz.) bei Weilburg im Juni auf *Bryonia* gefangen.
- 4) *Pterocheilus simplicipes*. H. S. bei Weilburg gefangen.
- 5) *Symmorphus fuscipes*. H. S. ebenfalls bei Weilburg gefangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Nachträge zu den Vesparien 306](#)