Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Literatur

Hier haben die Leserinnen und Leser dieses Buches die Möglichkeit, in der umfangreichen Hintergrundliteratur nach weiterführenden Büchern, Zeitschriftenartikeln und Karten zu suchen.

Die Erscheinungsjahre reichen von 1666 bis heute.

- ADAM, K.D. (1964): Die Großgliederung des Pleistozäns in Mitteleuropa. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, **132**: 12 S.; Stuttgart.
- ALBERMANN, J. (1939): Zur Geologie der Quarzgänge des Taunus und Hunsrück. – Dissertation Universität Bonn. – 137 S.; Bonn.
- ANDERLE, H.-J. (1984): Postvaristische Bruchtektonik und Mineralisation im Taunus – Eine Übersicht. – Schriftenreihe der Gesellschaft deutscher Metallhütten- und Bergleute, **41**: 201–217; Weinheim (Verlag Chemie).
- ANDERLE, H.-J. (1987a): The evolution of the South Hunsrück and Taunus Borderzone. – In: ZIEGLER, P.A. (Hrsg.): Compressional Intra-Plate Deformations in the Alpine Foreland. – Tectonophysics, **137**: 101–114; Amsterdam (Elsevier).
- ANDERLE, H.-J. (1987b): Entwicklung und Stand der Unterdevon-Stratigraphie im südlichen Taunus. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **115**: 81–98; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J. (1998): 1.2 Taunus. – In: Geologie und hydrothermale Mineralisationen im rechtsrheinischen Schiefergebirge. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **Sb. 1**: 28–33; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J. (2010): Lage und Bedeutung der bisher tiefsten Bohrung Wiesbadens. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **131**: 77–86; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J. & KIRNBAUER, T. (1993): Das Schwer-spat-Vorkommen von Naurod im Taunus (Bl. 5815 Wehen) – eine prävaristische Gangmineralisation. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **121**: 91–123; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J. & KIRNBAUER, T. (1995): Geologie von Naurod im Taunus. – In: 650 Jahre Naurod 1346–1996. Nauroder Chronik bis zur Gegenwart. – 85–103; Wiesbaden-Erbenheim (Marianne Breuer Verlag).
- ANDERLE, H.-J. & MEISL, S. (1974): Geologisch-Mineralogische Exkursion in den Südaunus. Exkursion A1 am 1.10.1973. Geowissenschaftliche Tagung in Frankfurt a. M. – Fortschritte der Mineralogie, **51**: 137–156; Stuttgart.
- ANDERLE, H.-J. & RADTKE, G. (1999): 1. Geologische Aufnahme entlang der ICE-Neubaustrecke Köln – Rhein/Main – 2. Erkundungsbohrung Wallau im nördlichen Teil des Oberrheingrabens. – Geologie in Hessen, **5/1999**: 12–18; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J. & RADTKE, G. (2001): Beobachtungen zur oligozänen Meeresküste in Wiesbaden. Küstensedimente beiderseits von Nero- und Rambachtal. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **122**: 23–42; Wiesbaden.
- ANDERLE, H.-J., BARGON, E., THIEL, E. & WEIDNER, E. (1984): Ein zersetzter Basaltgang in Wiesbaden-Sonnenberg – seine geologische Stellung und bodenkundliche Bedeutung. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **112**: 199–217; Wiesbaden.
- BALDNER (1666): Vogel-, Fisch- und Thierbuch; Straßburg. – Faksimile Druck 1974; Stuttgart (Müller & Schindler).
- BALTRUSCH, M., GRAF, J., GROSS, G. & HEINMANN, D. (1989): Numerische Simulation von Kaltluftabflüssen im Raum Wiesbaden. – Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz (Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt), **79**: 47 S.; Wiesbaden.
- BARTZ, J. (1950): Das Jungpliozän im nördlichen Rheinhessen. – Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, (4) **1**: 201–243; Wiesbaden.

- BAUMANN, G. (Hrsg.) (1957): Johann Wolfgang Goethe. Tagebücher, Bd. II. 1811–1823. – 1139 S.; Stuttgart (Cotta Nachf.).
- BEST, G. (1975): Feinstratigraphie der Hydrobienschichten (Untermiozän, Mainzer Becken). – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, **4**: 75–183; Mainz.
- BÖHM, H. (1964): Eine Klimakarte der Rheinlande. – Erdkunde, **18**: 202–206; Bonn.
- BOENIGK, W. (1978): Zur petrographischen Gliederung der Mosbacher Sande im Dyckerhoff-Steinbruch, Wiesbaden/Hessen. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, **16**: 91–126; Mainz.
- BRÜNING, H. (1970): Zur Klima-Stratigraphie der pleistozänen Mosbacher Sande bei Wiesbaden (Hessen). – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, **9**: 204–256; Mainz.
- BUNGENSTAB, G. (2000): Deutschlands höchster Baum. – Mitteilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft, **85**: 109–112; Großhansdorf.
- CZYSZ, W. (1995): Die Wiesbadener heißen Quellen von der Eiszeit bis zur Gegenwart. Teil 1: Geologie – Archäologie – Geschichte. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **116**: 5–39; Wiesbaden.
- CZYSZ, W. (1998): Die Wiesbadener heißen Quellen von der Eiszeit bis zur Gegenwart. Teil 2: Der Kochbrunnen im 19. Jahrhundert. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **119**: 5–38; Wiesbaden.
- CZYSZ, W. (2000a): Die Wiesbadener heißen Quellen von der Eiszeit bis zur Gegenwart. Teil 3: Probleme der chemischen Begriffsbildung im Spiegel der Badeliteratur. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **121**: 9–40; Wiesbaden.
- CZYSZ, W. (2000b): Vom Römerbad zur Weltkurstadt. Geschichte der Wiesbadener heißen Quellen und Bäder. – Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden, **7**: 401 S.; Wiesbaden.
- CZYSZ, W. (2004): 175 Jahre Nassauischer Verein für Naturkunde und Naturwissenschaftliche Sammlung des Museums Wiesbaden 1829–2004. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **125**: 372 S.; Wiesbaden.
- DAHMER, G. (1938): Fährten, Wohnbauten und andere Lebensspuren mariner Tiere im Taunusquarzit des Rheintaunus. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **85**: 64–79; Wiesbaden.
- DAHMER, G. (1946): Gotlandium (Mittel-Ludlow) mit *Dayia navicula* im Taunus. – Senckenbergiana, **27**: 76–84; Frankfurt am Main.
- DAHMER, G. (1952): Graptolithen aus den „Grauen Phylliten“ des Taunus. – Notizblatt des hessischen Landesamtes für Bodenforschung, (VI) **3**: 82–86; Wiesbaden.
- Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.) (2002): Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 mit Beiheft; Hannover.
- Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.) (2011): Stratigraphie von Deutschland IX-Tertiär, Teil 1: Oberrheingraben und benachbarte Tertiärgebirge. – Schriftenreihe der deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, **75**: 461 S., 51 Abb; Hannover.
- DOEBL, F., MOHAWED-AWAL, H., ROTHE, P., SONNE, V., TOBIEN, H., WEILER, H. & WEILER, W. (1972): Ein „Aquitän“-Profil von Mainz-Weisnau (Tertiär, Mainzer Becken). Mikrofaunistische, sedimentpetrographische und geochemische Untersuchungen zu seiner Gliederung. – Geologisches Jahrbuch, **A 5**: 141 S.; Hannover.
- EHMKE, W. (2001): Ist der Klimawandel auch in Wiesbaden und im Taunus feststellbar? – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **122**: 43–58; Wiesbaden.
- EPPLE, A. (1957): Die Fledermäuse im Rhein-Main-Gebiet. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **93**: 96–108; Wiesbaden.
- FELTEN, H. & KOCK, D. (1979): Fledermausbeobachtungen in Gebieten des südlichen West-Deutschlands 1945–1979. – Myotis, **16**: 3–82; Bonn.
- FISCHER, K. & WENZ, W. (1914): Die Landschneckenkalke des Mainzer Beckens und ihre Fauna. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **67**: 21–154; Wiesbaden.
- FLOHN, H. (1988): Das Problem der Klimaänderungen in Vergangenheit und Zukunft. – 228 S.; Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).

- FÖRSTERLING, G. (1998): Biostratigraphische und lithostratigraphische Untersuchungen in den Cerithien-schichten im Kalksteinbruch Mainz-Weisenau – speziell zur Abgrenzung des Unteren Teils der Oberen Cerithienschichten. – unveröffentlichte Diplomarbeit Universität Mainz. – 136 S.; Mainz.
- FÖRSTERLING, G. & REICHENBACHER, B. (2002): Lithofazies und Fischfaunen der Mittleren und Oberen Cerithien-Schichten (Ober-Oligozän – Unter-Miozän) im Mainzer Becken – paläoökologische und paläogeographische Implikationen. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **237**: 293–317; Frankfurt am Main.
- FRANKE, W. (1998): 1.1 Geotektonischer Überblick. – In: Geologie und hydrothermale Mineralisationen im rechtsrheinischen Schiefergebirge. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **Sb. 1**: 15–28; Wiesbaden.
- FUCHS, A. (1929): Die unteren Gedinneschichten der Gegend von Wiesbaden. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **80** (II): 74–86; Wiesbaden.
- FUCHS, H.-J. & WERNER, M. (2002): Zur Klimaökologie des Donnersberges in der Nordpfalz. – Mitteilungen der POLLICHA, **87**: 19–41; Bad Dürkheim.
- GALLADÉ, M. (1926a): Die Oberflächenformen des Rheintaunus und seines Abfalles zum Main und Rhein. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **78**: 1–100; Wiesbaden.
- GALLADÉ, M. (1926b): Kleine Beiträge zur Taunusgeologie. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **78**: 154–157; Wiesbaden.
- GEBHARDT, H., KINZELBACH, R. & SCHMIDT-FISCHER, S. (Hrsg.) (1996): Gebietsfremde Tierarten. Auswirkungen auf einheimische Arten, Lebensgemeinschaften und Biotope. Situationsanalyse. – 314 S.; Landsberg (Ecomed).
- GEISSERT, F. (1970): Mollusken aus den pleistozänen Mosbacher Sanden bei Wiesbaden (Hessen). – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, **9**: 147–203; Mainz.
- GEITER, O. & KINZELBACH, R. (2002): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. 1. Allgemeines. – Texte des Umweltbundesamtes, **25**: 1–173; Berlin.
- GODMANN, O. (1995): Beobachtung eines Wochenstubenquartiers der Kleinen Bartfledermaus. – Natur und Museum, **125** (1): 26–29; Frankfurt am Main.
- GODMANN, O. (1996): Vorkommen und Schutzproblematik der Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) im Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **117**: 69–80; Wiesbaden.
- GODMANN, O. (1999): Nachweis der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) in Wiesbaden. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **120**: 173–174; Wiesbaden.
- GRIESEMER, T.W. (2002): The Bolboforma Signal. A Distinct Level for Correlating Lower Oligocene Deposits (NP 22), the Melania Clay Formation of Northern Hesse (Hessian Depression) with the Middle Pechelbronn Formation of the Mainz Basin (Rhine-Palatinate, Germany). – In: GÜRS, K. (ed.): Northern European Cenozoic Stratigraphy. – Proceedings of the 8th Biannual Meeting RCNNS/RCNPS: 57–66; Flintbek.
- GRIMM, K.I. & GRIMM, M.C. (2003): Geologischer Führer durch das Mainzer Tertiärbecken. – In: GRIMM, K.I., GRIMM, M.C., NEUFFER, F.O. & LUTZ, H. (Hrsg.): Die fossilen Wirbellosen des Mainzer Tertiärbeckens. Teil 1-1. – Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Bh., **26**: 158 S.; Mainz.
- GRIMM, K.I. & RADTKE, G. (2002): Lithographische Gliederung im Rupelium/Chattium des Mainzer Beckens, Deutschland: Wallau-Subformation („Unteres Rupelton“); Bodenheim-Formation/Selztal-Gruppe. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **129**: 127–131; Wiesbaden.
- GRIMM, K.I., GRIMM, M.C. & SCHINDLER, T. (2000): Lithostratigraphische Gliederung im Rupelium/Chattium des Mainzer Beckens, Deutschland. – Neues Jahrbuch Geologie Paläontologie Abhandlungen, **218**: 343–397; Stuttgart.
- GROSSMANN, H. (1976): Flora vom Rheingau. Ein Verzeichnis der Blütenpflanzen und Farne sowie

- ihrer Fundorte. – Senckenberg-Buch, **55**: 329 S.; Frankfurt am Main.
- GÜRS, K. (1995): Revision der marinen Molluskenfauna des Unteren Meeressandes (Oligozän, Rupelium) des Mainzer Beckens. – Dissertation Universität Mainz. – 443 S.; Mainz.
- HAAS, G. (2002): Entwicklung der Makro-Invertebratengemeinschaft im hessischen Rhein- und Untermainabschnitt in den Jahren 1993 bis 1999. – Umwelt und Geologie (Schriftenreihe des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie). – 176 S.; Wiesbaden.
- HAHN, H.-D. (1990): Fazies grobklastischer Gesteine des Unterdevons (Graue Phyllite bis Taunusquarzit) im Taunus (Rheinisches Schiefergebirge). – Dissertation Universität Marburg/Lahn. – 173 S.; Marburg.
- HECKER, U. (2001a): BLV Handbuch Bäume und Sträucher, 3. Aufl. – 478 S.; München (BLV Verlagsgesellschaft).
- HECKER, U. (2001b): Wald- und Parkbäume. – 95 S.; München (BLV Verlagsgesellschaft).
- HEIM, D. (1970): Zur Petrographie und Genese der Mosbacher Sande. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, **9**: 83–117; Mainz.
- HEINECK, F. (1929): Das geologische Relief des mittleren und westlichen Taunus und seines südlichen Vorlandes in der geologischen Heimatsammlung des Naturhistorischen Museums in Wiesbaden. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **89** (1): 75–79; Wiesbaden.
- HENRICH, F. (1905): Über das Vorkommen von erdiger Braunkohle in den Tertiär-Schichten Wiesbadens. – Zeitschrift für praktische Geologie, **13**: 409–413; Berlin.
- HESS, P. & BREZOWSKY, H. (1952): Katalog der Grosswetterlagen Europas. – Berichte des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone, **33**: 39 S.; Bad Kissingen.
- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.) (1993-2000): Avifauna von Hessen, 4 Bde. – 2470 S.; Frankfurt am Main (Eigenverlag).
- Hessisches Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden (Hrsg.) (1987): Natur in Hessen. Biotopkartierung im besiedelten Bereich. Handlungsleitfaden. – 30 S.; Wiesbaden (Selbstverlag).
- HÖLTING, B. (1977): Bemerkungen zur Herkunft der Salinarwässer am Taunusrand. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **97**: 211–221; Wiesbaden.
- HORCH, D., WEDRA, C. & PEUKERT, M. (1999): Referenzflächenuntersuchung der im besiedelten Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden vorkommenden Biotoptypen, unveröffentlichtes Manuskript; Wiesbaden (Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden).
- HOTTENROTT, M. (1989): Palynostratigraphischer Bericht Schulberg Wiesbaden, unveröffentlicht, Archiv. – 3 S.; Wiesbaden (Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie).
- HOTTENROTT, M. (2004): Über kalkfreies „Kalktertiär“ im Untergrund von Wiesbaden. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **131**: 11–25, 1 Abb., 1 Tab., 1 Taf., Anhang; Wiesbaden.
- JAKOBUS, R. (1993): Untersuchungen zur Genese und Ausbildung der postvaristischen Quarz- und Buntmetallerz-Gänge des Osttaunus. – Dissertation Universität Frankfurt/M. – 180 S.; Frankfurt am Main.
- JENDRITZKY, G. (1988): Das Bioklima in der Bundesrepublik Deutschland. – Beilage zum Deutschen Bäderkalender; Hannover (Akademie für Raumforschung und Landesplanung).
- KADOLSKY, D. (1988): Stratigraphie und Molluskenfaunen von „Landschneckenkalk“ und „Cerithienschichten“ im Mainzer Becken (Oberoligozän bis Untermiozän?). – Geologisches Jahrbuch, **A 110**: 69–133; Hannover.
- KELLER, T. & RADTKE, G. (2007): Quartäre Mosbach-Sande und kalktertiäre Ablagerungen im NE Mainzer Becken (Exkursion L am 14. April 2007). – Jahresberichte und Mitteilungen des oberrheinischen geologischen Vereins, N.F., **89**: 307–333; Stuttgart.
- KELLER, T., REICHENBACHER, B. & GAUDANT, J. (2002): Erstbeschreibung von Atheriniden-Skeletten (Pisces, Teleostei, Atheriniformes) mit Otolithen in situ aus den Unteren Hydrobien-Schichten (Wiesbaden-Formation) des Mainzer

- Beckens, mit einem Beitrag zur Sedimentologie und Paläoökologie. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **237**: 319–343; Frankfurt am Main.
- KINKELIN, F. (1889): Der Pliocänsee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe. – Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft, **1889**: 39–161; Frankfurt am Main.
- KINKELIN, F. (1892): Die Tertiär- und Diluvialbildungen des Untermainthales, der Wetterau und des Südrandes des Taunus. – Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten, (IX) **4**: 1–302; Berlin.
- KINZELBACH, R. (1991): Die Körbchenmuscheln *Corbicula fluminalis*, *Corbicula fluminea* und *Corbicula fluviatilis* in Europa (Bivalvia: Corbiculidae). – Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, **29**: 215–228; Mainz.
- KIRNBAUER, T. (1997): Die Mineralisationen der Wiesbadener Thermalquellen (Bl. 5915 Wiesbaden). – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **118**: 5–90; Wiesbaden.
- KIRNBAUER, T. (1998): Geologie und hydrothermale Mineralisationen im rechtsrheinischen Schiefergebirge, 2.4.1 Pseudomorphosen- und Kappenquarzgänge. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **Sb. 1**: 176–184; Wiesbaden.
- KIRNBAUER, T. & STERRMANN, G. (1997): Arsenate in den Pseudomorphosenquarz-Gängen des Taunus: Erstnachweis von Segnitit und Ba-Pharmakosidertit. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **118**: 108–110; Wiesbaden.
- KLAUSING, O. (1974): Hessen – Naturräumliche Gliederung 1 : 200.000. – Hessische Landesanstalt für Umwelt; Wiesbaden.
- KLAUSING, O. (1988): Die Naturräume Hessens. – Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz (Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt), **67**: 1–43; Wiesbaden.
- KLAUSNITZER, B. (1993): Ökologie der Großstadtfauna, 2. Aufl. – 454 S.; Stuttgart (Gustav Fischer).
- KLÜGEL, T. (1997): Geometrie und Kinematik einer variszischen Plattengrenze. Der Südrand des Rhenoharzynikums im Taunus. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **101**: 215 S.; Wiesbaden.
- KOCH, C. (1865): Das Wesentliche der Chiropteren mit besonderer Beschreibung der in dem Herzogthum Nassau und in den angränzenden Landestheilen vorkommenden Fledermäuse. – Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, **17/18**: 261–593; Wiesbaden.
- KOCH, C. (1880a): Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte von Preußen und den Thüringischen Staaten, Lieferung 15, Blatt Platte. – 37 S.; Berlin.
- KOCH, C. (1880b): Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten, Blatt Wiesbaden. – 33–37; Berlin.
- KOCH, C., FACH, A. & WINTER, E. (1875): Über die Fortsetzung der Wassergewinnungsarbeiten für die Stadt Wiesbaden, unveröffentlichtes Gutachten vom 3. August 1875; Wiesbaden [ESWE-Bücherei Nr. 260].
- KOENIGSWALD VON W. (1983): Die Säugetierfauna des süddeutschen Pleistozäns. – In: MÜLLER-BECK, H. (Hrsg.): Urgeschichte in Baden-Württemberg. – 166–216; Stuttgart (Theiss).
- KOENIGSWALD VON W. (1994): Obermiozäne Säugetiere aus dem Ur-Rhein von Eppelsheim. – In: KOENIGSWALD VON, W. & MEYER, W. (Hrsg.): Erdgeschichte im Rheinland: Fossilien und Gesteine aus 400 Millionen Jahren. – 239 S.; München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).
- KÖPPEN, W. (1931): Grundriss der Klimakunde. – 388 S.; Berlin.
- KOLFSCHOTEN, T. v. & TURNER, E. (1996): Early Middle Pleistocene mammalian faunas from Kärlich and Miesenheim I and their biostratigraphical implications. – In: TURNER, C. (Ed.): The early Middle Pleistocene in Europe. – 227–253; Rotterdam (Balkema).
- KOPP, K. (1986): Wasser von Taunus, Rhein und Ried. Aus zwei Jahrtausenden Wiesbadener Wasserversorgung. – 327 S.; Wiesbaden (Stadtwerke).
- KORNECK, D., SCHNITTLER, M., KLINGENSTEIN, F., LUDWIG, G., TAKLA, M., BOHN, U. & MAY, R. (1998): Warum verarmt unsere Flora? Auswertung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen

- Deutschlands. – Schriftenreihe für Vegetationskunde, **29**: 299–444; Bonn.
- KORTE, E. (1999): Bestandsentwicklung der Fischarten der hessischen Rheinaue 1994–1997 – Reproduktionsstrategien, Jungfischauftreten, Gefährdung, Entwicklungstendenzen. – Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz (Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt), **268**: 186 S.; Wiesbaden.
- KORTE, E. (2001): Bestandsaufnahme der Rheinfischfauna im Jahr 2000 im Gewässersystem des Rheins – Studie im Auftrag des rheinlandpfälzischen Ministeriums für Umwelt und Forsten und des hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten. – 97 S.; Frankfurt am Main (Forschungsinstitut Senckenberg).
- KOWARIK, I. (2003): Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. – 380 S., Stuttgart (Ulmer Verlag).
- KRAUSE, C. (1988): Lithostratigraphische Profilaufnahme in den obersten Corbicula- und tieferen Hydrobienschichten im Steinbruch Wiesbaden-Amöneburg (Neogen, Mainzer Becken). – Diplomarbeit Universität Mainz. – 75 S.; Mainz.
- KRAUSE, C. (1991): Der Grenzbereich Corbicula-/Hydrobienschichten speziell im Tertiärprofil Wiesbaden-Amöneburg (Hessen). – Geologisches Jahrbuch Hessen, **93**: 23–65; Wiesbaden.
- KUBELLA, K. (1951): Zum tektonischen Werdegang des südlichen Taunus. – Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, **3**: 81 S.; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. (1995): Ein geologisches Profil vom Taunus zum Main. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **116**: 73–80; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. (1996): „Milchquarzkies“, „Randfazies“ und Unteroligozän bei Wallau, Main-Taunus-Kreis. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **117**: 65–68; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. (2007): Geologie auf Schritt und Tritt – am Wiesbadener „Rheinsteig“. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **128**: 119–136; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. (2011): Manganknollen aus dem Taunus. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **132**: 133–142; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. & SEIDENSCHWANN, G. (1993): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1 : 25000. Bl. 5818 Frankfurt a. M. Ost, 3. Aufl. – 308 S.; Wiesbaden.
- KÜMMERLE, E. & SEIDENSCHWANN, G. (2009): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1 : 25000, Bl. 5817 Frankfurt a. M. West, 3. Aufl. – 308 S.; Wiesbaden.
- LANGE, G. (1857): Der Wisperwind. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **12**: 420–423; Wiesbaden.
- LAUTERBORN, R. (1917): Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstroms. II. Teil. – Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung B. – 70 S.; Heidelberg.
- LAUTERBORN, R. (1918): Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstroms. III. Teil. – Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung B. – 87 S.; Heidelberg.
- LEISTIKOW, K.U. (1993): Parkbäume aus Nordamerika. – Palmengarten Sonderheft, **20**: 94 S.; Frankfurt am Main.
- LELEK, A. (1976): Ichthyology of the Upper Rhine River. – Revue Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes, **40**: 652–653; Casablanca.
- LELEK, A. & BUHSE, G. (1992): Fische des Rheins – früher und heute. – 214 S. Berlin–Heidelberg (Springer Verlag).
- LELEK, A. & KÖHLER, C. (1989): Zustandsanalyse der Fischgemeinschaften im Rhein (1987–1988). – Fischökologie, **1**: 47–64; Köln.
- LELEK, A., KORTE, E. & KRÜGER, U. (1994): Ichthyologische Untersuchungen der Hessischen Rheinaue. – Studie im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten & Naturschutz. – 80 S.; Wiesbaden.
- LEPPLA, A. (1924): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundes-

- staaten, Blatt Königstein (3370). – 34 u. 50–52; Berlin.
- LEPPLA, A. & STEUER, A. (1923): Geologische Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten, Bl. Wiesbaden-Kastel, Lieferung 15, 2. Auflage, mit Erläuterungen. – 4 u. 52 S.; Berlin; Nachdruck als 3. Auflage, Wiesbaden 1971.
- LEPPLA, A., MICHELS, F. & SCHLOSSMACHER, K. (1930): Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, Blatt Wehen, 2. Auflage; Berlin.
- LEPSIUS, G.R. (1883): Das Mainzer Becken geologisch beschrieben. – Rheinische naturforschende Gesellschaft Mainz [Festschrift]. – 181 S.; Darmstadt (Bergsträsser).
- LESER, H. (2008): Stadtökologie in Stichworten, 2. Aufl. – 320 S; Stuttgart (Borntraeger).
- LEYDECKER, G. (1986): Erdbebenkatalog für die Bundesrepublik Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 1000-1981. – Geologisches Jahrbuch, **E 36**: 3–83; Hannover.
- LIPPOLT, H.J., BARANYI, I. & TODT, W. (1975): Die Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen Oberrheingraben. – Aufschluß, **Sb. 27** (Odenwald): 205–212; Heidelberg.
- LIST, K. (1850): Ueber die chemische Zusammensetzung des Taunusschiefers. – Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, **6**: 126–134; Wiesbaden.
- LOŽEK, V. (1964): Quartärmollusken der Tschechoslowakei. – Rospravy Ústředního Ústavu Geologického, **31**: 374 S.; Praha.
- MARELL, D. (1989): Das Rotliegende zwischen Odenwald und Taunus. – Geologische Abhandlungen Hessen, **89**: 128 S.; Wiesbaden.
- MEISL, S. (1995): III.C.3 Igneous Activity. – In: DALLMEYER, R.D., FRANKE, W. & WEBER, K. (Hrsg.): Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. – 118–131; Berlin (Springer).
- MEYNEN, E. & SCHMITHÜSEN, J. (Hrsg.) (1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. – Bad Godesberg (Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung).
- MICHELS, F. (1926): Der Ursprung der Mineralquellen des Taunus. – Berichte der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft, **56**: 225–238; Frankfurt am Main.
- MICHELS, F. (1931): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, Blatt Eltville-Heidenfahrt (3406). – 79 S.; Berlin.
- MICHELS, F. (1932): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, Blatt Wehen (3369). – 40–44.; Berlin.
- MICHELS, F. (1934): Trinkwassergewinnung (insbesondere durch Stollen) im südöstlichen Rheinischen Schiefergebirge (Taunus). – Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, **85**: 530–539; Berlin.
- MICHELS, F. (1956): Zur Geologie der Wiesbadener Mineralquellen. – Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, **106**: 113–117; Stuttgart.
- MICHELS, F. (1960): Sind die „Grauen Phyllite“ im Goldsteintal bei Wiesbaden devonisch oder silurisch? – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **95**: 10–12; Wiesbaden.
- MICHELS, F. (1961): Zur Geologie des Wiesbadener Raumes und seiner Mineral-Quellen. – Ärztliche Mitteilungen, **46**: 1214–1220; Köln.
- MICHELS, F. (1963): Kraft aus der Erde Schoß. – Wiesbaden, festliche Kur- und Kongreß-Stadt, **23**: 4–7; Frankfurt am Main.
- MICHELS, F. (1964): Von der Wiesbadener Thermalquellenspalte. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **97**: 37–39; Wiesbaden.
- MICHELS, F. (1966): Die Wiesbadener Mineralquellen (neue Beiträge zur Klärung ihrer geologischen Position), nebst einem Anhang über C.E. STIFFTS Ansichten über die Genese unserer Mineralquellen. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **98**: 17–54; Wiesbaden.
- MICHELS, F. & THEWS, J.D. (1971): Die Thermalwasserbohrung Schützenhofquelle in Wiesbaden. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **101**: 75–81; Wiesbaden.
- MICHELS, F. & WIESNER, E. (1968): Ein Grenzprofil Inflata – Hydrobienschichten im Dyckerhoff-schen Steinbruch am Hambusch, südsüdöstlich

- Wiesbadens. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **99**: 22–26; Wiesbaden.
- MÖDDEN, C. (1996): Korrelierungen auf der Basis fossiler Säugetiere im untersten Miozän des Mainzer Beckens und der westlichen Molasse. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh., **202**: 111–116; Stuttgart.
- MÖDDEN, C., SCHÄFER, P., REICHENBACHER, B., SCHWARZ, J. & KADOLSKY, D. (2000): Säugetiere, Fisch-Otolithen, Ostracoden, Mollusken und Charophyten aus den Süßwasser-Schichten (Oligozän) von Wolfsheim im Mainzer Becken. – Paläontologische Zeitschrift, **74**: 343–361; Stuttgart.
- MÖLLERS, F. (2010): Wilde Tiere in der Stadt. – 173 S; München (Knesebeck).
- MORDZIOL, G. (1911): Geologischer Führer durch das Mainzer Tertiärbecken. – Sammlung geologischer Führer, **16**: 1–167; Berlin.
- Natura 2000 (1992): Richtlinie 92/93 EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. – Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, **L 206**: 7–50; Brüssel.
- NAU, B.S. (1787): Oekonomische Naturgeschichte der Fische in der Gegend um Mainz. – 22 S.; Mainz (Schillerscher Verlag).
- NEUBAUR, F., DÄSEM, W. & ZINGEL, D. (1968): Nachrichten zur Vogelfauna des Gebietes zwischen Schierstein und Niederwalluf. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **99**: 133–152; Wiesbaden.
- NEUBAUR, F., PETERSEN, R. & HELVERSEN VON, O. (1962): Vogelfauna eines kleinen Gebietes bei Schierstein und Niederwalluf im Rheingau. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **96**: 60–95; Wiesbaden.
- PRELL-MÜSSIG, R. (1965): Das jüngere Tertiär (Oberes Rupel bis Aquitan) bei Bruchsal (Foraminiferen, Fazies, Stratigraphie). – Jahreshefte geologisches Landesamt Baden-Württemberg, **7**: 229–301; Freiburg.
- RADTKE, G. (1999): Erkundungsbohrung Wallau im nördlichen Teil des Oberrheingrabens. – Geologie in Hessen, **5**: 17–18; Wiesbaden.
- RADTKE, G. & KÜMMERLE, E. (2004): Neudefinition von fünf stratigraphischen Einheiten im Tertiär (Miozän) des Hanauer Beckens und des Oberrheingrabens (Deutschland): Niederrad- bis Bockenheim-Formation. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **131**: 27–44; Wiesbaden.
- RADTKE, G. & MARTINI, E. (Hrsg.) (2007): Die Bohrungen Wallau im nordöstlichen Mainzer Becken (Rotliegend, Pechelbronn-Gruppe, Bodenheim-Formation). – Geologische Abhandlungen Hessen, **116**: 273 S.; Wiesbaden.
- RADTKE, G. & MARTINI, E. (2008): Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Miozän): Frankfurt-Formation [= Obere Hydrobien-Schichten]. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **135**: 47–59; Wiesbaden.
- RAPP, J. & SCHÖNWIESE, C.-D. (1996): Atlas der Niederschlags- und Temperaturtrends in Deutschland 1891-1990. – Frankfurter geowissenschaftliche Arbeiten, **B 5**: 255 S.; Frankfurt am Main.
- REICHENBACHER, B. (2000): Das brackisch-lakustrine Oligozän und Unter-Miozän im Mainzer Becken und Hanauer Becken: Fischfaunen, Paläoökologie, Biostratigraphie, Paläogeographie. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, **222**: 1–143; Frankfurt am Main.
- REICHENBACHER, B. & KELLER, T. (2002): Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Oligozän – Miozän), Teil 2: Wiesbaden-Formation [= Untere Hydrobien-Schichten]. – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, **31**: 99–122; Mainz.
- REICHHOLF, J.H. (2007): Stadtnatur. – 318 S; München (oekom).
- REINACH VON A. (1890): Das Bohrloch im Neuen Wiesbadener Schlachthause. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **43**: 35–38; Wiesbaden.
- REINACH VON A. (1900): Ueber einige Versteinerungs-Fundpunkte im Bereich des Taunus. – Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, **52**: 165–166; Berlin.

- REINACH VON A. (1907): Neuere Aufschlüsse im Tertiär des Taunusvorlandes. – Abhandlungen der Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, N.F., **24**: 54–60; Berlin.
- REITZ, E., ANDERLE, H.-J. & WINKELMANN, M. (1995): Ein erster Nachweis von Unterordovizium (Arenig) am Südrand des Rheinischen Schiefergebirges im Vordertaunus: Der Bierstadt-Phyllit (Bl. 5915 Wiesbaden). – Geologisches Jahrbuch Hessen, **123**: 25–38; Wiesbaden.
- RENKHOFF, O. (1980): Wiesbaden im Mittelalter. – Geschichte der Stadt Wiesbaden, **2**: 1–398; Wiesbaden.
- RITTER, F. (1887): Zur Geognosie des Taunus. – Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft Frankfurt a.M., **1886/87**: 109–124; Frankfurt am Main.
- RÖMER, A. (1862/63): Verzeichniß der im Herzogthum Nassau, insbesondere in der Umgebung von Wiesbaden vorkommenden Säugethiere und Vögel. – Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, **17/18**: 1–77; Wiesbaden.
- ROSE, O. (1936): Versteinerungen im Taunusquarzit des Rheintaunus. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, **83**: 49–58; Wiesbaden.
- ROSENBERG, F. & MITTELBACH, G. (1996): Geogene Arsenanreicherungen im Wiesbadener Bergkirchenviertel. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **124**: 175–189; Wiesbaden.
- ROTHAUSEN, K. & SONNE, V. (1984): Mainzer Becken. – Sammlung Geologischer Führer, **79**: 203 S.; Berlin (Borntraeger).
- SANDBERGER, F. (1847): Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Herzogthums Nassau. – 144 S., 1 Kt.; Wiesbaden.
- SANDBERGER, F. (1850): Ueber die geognostische Zusammensetzung der Umgegend von Wiesbaden. – Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, **6**: 1–27; Wiesbaden.
- SANDBERGER, F. (1858–1863): Die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens. – 459 S. (Textband); 35 Taf. (Tafelband); Wiesbaden (Kreidel).
- SANDBERGER, F. (1883): Ueber den Basalt von Naurod bei Wiesbaden und seine Einschlüsse. – Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, **33**: 33–60; Wien.
- SANDBERGER, G. (1857): Vergleichender Beitrag zur Fauna der warmblütigen Wirbelthiere des Mittelrheins (Die Säugethiere und Vögel des Herzogthums Nassau). – Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preußischen Rheinlande und Westfalens, **14**: 69–106; Bonn.
- SCHÄFER, P. (2000): Zur Stratigraphie und Genese der tertiären Sedimente zwischen Eisenberg und Lautersheim im südwestlichsten Teil des Mainzer Beckens. – Jahresberichte und Mitteilungen des oberrheinischen geologischen Vereins, N.F., **82**: 175–222; Stuttgart.
- SCHÄFER, P. & KADOLSKY, D. (1998): Zur Gliederung eines Tertiärprofils von Budenheim bei Mainz, insbesondere zur stratigraphischen Stellung und Genese der “Milchquarzsotter“ (Oberoligozän) im nordwestlichen Rheinhessen (Mainzer Becken). – Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Bh., **21**: 115–132; Mainz.
- SCHÄFER, P. & KADOLSKY, D. (2002): Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Oligozän – Miozän), Teil 1: Oberrad-Formation [= Obere Cerithiensichten, oberer Teil] und Rüssingen-Formation [= *Inflata*-Schichten]. – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, **31**: 73–98; Mainz.
- SCHÄFER, W. (1974): Der Oberrhein – sterbende Landschaft? – Natur und Museum, **104**: 331–334; Frankfurt am Main.
- SCHÄFER, W. (1977): Der Oberrhein als ökotechnisches Problem. – Deutsche Architekten- und Ingenieur-Zeitschrift, **15**: 14–16; Berlin.
- SCHARFF, F. (1877): Die Glättung der grauen Steine bei Naurod. – Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft, **1876/77**: 72–74; Frankfurt am Main.
- SCHIRMER, W. (1994): Der Mittelrhein im Blickpunkt der Rheingeschichte. – In: KOENIGSWALD VON W. & MEYER, W. (Hrsg.): Erdgeschichte im Rheinland: Fossilien und Gesteine aus 400 Millionen Jahren. – 239 S.; München (Verlag Dr. Friedrich Pfeil).

- SCHLIRF, M., NARA, M. & UCHMANN, A. (2002): Invertebraten-Spurenfossilien aus dem Taunusquarzit (Siegen, Unterdevon) von der „Rossel“ nahe Rüdesheim. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **123**: 46–63; Wiesbaden.
- SCHMID, G. (Hrsg.) (1949): Goethe. Die Schriften zur Naturwissenschaft. 2. Band. Schriften zur Geologie und Mineralogie 1812–1832. – 438 S.; Weimar.
- SCHMIDTGEN, O. (1910): *Mastodon arvernensis* CR. et JOB. aus den Mosbacher Sanden. – *Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der Großherzoglichen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt*, (4) **31**; Darmstadt.
- SCHNEIDERHÖHN, H. (1912): Pseudomorphe Quarzgänge und Kappenquarze von Usingen und Niedernhausen im Taunus. – *Neues Jahrbuch für Mineralogie für 1912*, **2**: 1–32; Stuttgart.
- SCHÖNWIESE, C.-D. (1979): Klimaschwankungen. – 181 S., Berlin (Springer).
- SCHÖNWIESE, C.-D. (1995): Klimaänderungen. – 224 S., Berlin–Heidelberg–New York (Springer).
- SEMMEL, A. (1969): Quartär – Erläuterungen zur Geologischen Karte 1:25000, Bl. 5916 Hochheim a. M., 3. Auflage. – 51–59; Wiesbaden.
- SEMMEL, A. (Hrsg.) (1974): Das Eiszeitalter im Rhein-Main-Gebiet. – *Rhein-mainische Forschungen*, **78**: 215 S., Frankfurt am Main.
- SEMMEL, A. (1996): Geomorphologie der Bundesrepublik Deutschland, 5. Auflage. – 199 S.; Stuttgart (Steiner).
- SEMMEL, A. (2001): Das Quartär am Nordrand des Oberrheingrabens. – *Jahresberichte und Mitteilungen des oberrheinischen geologischen Vereins, N.F.*, **83**: 113–130; Stuttgart.
- SOLLE, G. (1941): Die Usinger Klippen, der schönste der Pseudomorphosenquarz-Gänge des Taunus. – *Natur und Volk*, **71**: 19–29; Frankfurt am Main.
- SOMMERMANN, A.-E., MEISL, S. & TODT, W. (1992): Zirkonalter von drei verschiedenen Metavulkaniten aus dem Südtanunus. – *Geologisches Jahrbuch Hessen*, **120**: 67–76; Wiesbaden.
- STENGEL-RUTKOWSKI, W. (2008): Hydrogeologischer Führer zu den Kochsalz-Thermen in Wiesbaden. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **129**: 103–116; Wiesbaden.
- STERRMANN, G. (2006): Die Pseudomorphosen- und Kappenquarzgänge des Taunus. – *Geo-Zentrum, VHS-Bad Homburg, M 4b*. – 9 S.; Bad Homburg.
- STERRMANN, G. (2007): Die Quarzgänge von Naurod und Bremthal. – *Geo-Zentrum, VHS-Bad Homburg, M 13*. – 7 S.; Bad Homburg.
- STERRMANN, G. (2010): Silbergehalt von Bleierz (Bleiglanz) und Fahlerz aus dem Taunus und der Lahnmulde. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **131**: 53–76; Wiesbaden.
- STERRMANN, G. (2011): Untersuchungen von Schwarzem Glaskopf aus dem Taunus und der Lahnmulde. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **132**: 113–132; Wiesbaden.
- STIFFT, C.E. (1823): Einige Beobachtungen über den Basalt im Nassauischen. – *Taschenbuch für die gesammte Mineralogie*, **17**: 501–526; Frankfurt am Main.
- STIFFT, C.E. (1831): Geognostische Beschreibung des Herzogthums Nassau, in besonderer Beziehung auf die Mineralquellen dieses Landes. – XII + 606 S.; Wiesbaden (Schellenberg).
- STREITZ, H. (2001): Über Fundorte einiger bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. – *Hessische Floristische Briefe*, **50**: 77–83; Darmstadt.
- STREITZ, H. (2005): Die Farn- und Blütenpflanzen von Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Verbreitung und Gefährdung am Beginn des 21. Jahrhunderts. – *Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft*, **562**: 1–402; Frankfurt am Main.
- STRUVE, W. (1973): Die ältesten Taunus-Fossilien. – *Natur und Museum*, **103**: 349–359; Frankfurt am Main.
- SÜSSMANN, P. (2000): Verschiedene Berechnungen von Temperaturmitteln. – *Monatliche Witterung, Berichte des Verbandes deutschsprachiger Amateurmeteorologen*, **7/2000**: 24–25; Walluf.

- TERBERGER, T. (2002): Die Altsteinzeit im Mainzer Becken – „Mainz zur Eiszeit“. – *Acta Praehistorica et Archaeologica*, **34**: 23–47; Berlin.
- THEWS, H.-D. (1971): Hydrogeologie des Stadtgebietes von Wiesbaden. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Wiesbadener Wasserversorgung. – *Wissenschaftlicher Bericht über Untersuchungen und Planungen der ESWE Stadtwerke Wiesbaden AG*, **1**: 23–34; Wiesbaden.
- THEWS, H.-D. (1974): Die hydrogeologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet und Infiltrationsgelände des Wasserwerks Schierstein. – *Wissenschaftlicher Bericht über Untersuchungen und Planungen der ESWE Stadtwerke Wiesbaden AG*, **2**: 55–63; Wiesbaden.
- THOMÄ, C. (1842): Geschichte des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau. – VI + 196 S.; Wiesbaden (Friedrich'sche Buchhandlung).
- TOBIEN, H. (1980): A Note on the Mastodont Taxa (Proboscidea, Mammalia) of the „Dinotheriensande“ (Upper Miocene, Rheinhessen, Federal Republic of Germany). – *Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen*, **9**: 187–201; Mainz.
- TOBIEN, H. (1986): Die paläontologische Geschichte der Proboscider (Mammalia) im Mainzer Becken (BRD). – *Mainzer naturwissenschaftliches Archiv*, **24**: 155–261; Mainz.
- TOBIEN, H. (1988): Einige Daten zur Systematik und Biostratigraphie der Rodentier und Lagomorphen (Mammalia) aus dem Kalktertiär des Mainzer Beckens (Oberoligozän – Untermiozän). – *Geologisches Jahrbuch*, **A 110**: 345–358; Hannover.
- UNZICKER, CH. (1844): Wanderzeiten der gewöhnlichsten Zug- und Strichvögel, welche im Jahr 1842 im Herzogthum Nassau beobachtet wurden. – *Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau*, **1**: 102–112; Wiesbaden.
- UNZICKER, CH. (1849): Bemerkungen über mehrere Vögel, welche in den Jahren 1845–1848 zu Schierstein a. R. wahrgenommen wurden. – *Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau*, **4**: 237–247; Wiesbaden.
- WAGNER, W. (1938): Das Mainzer Becken. Eine Zusammenstellung unter besonderer Berücksichtigung der Rheintaltektonik. – *Jahresberichte und Mitteilungen des oberrheinischen geologischen Vereins, N.F.*, **27**: 25–62; Stuttgart.
- WENZ, W. (1921): Das Mainzer Becken und seine Randgebiete. – 352 S.; Heidelberg (Ehrig).
- ZIEGLER, P.A. (1987): Late Cretaceous and Cenozoic intra-plate compressional deformations in the Alpine foreland – a geodynamic model. – *Tectonophysics*, **137**: 389–420; Amsterdam.
- ZINGEL, D. (1962): Beutelmeise (*Remis pendulinus*) bei Schierstein am Rhein. – *Orn. Mitt.*, **14**: 156; Schlangenbad.
- ZINGEL, D. (1969): Die Vogelwelt des Schiersteiner Schloßparkes. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **100**: 153–168; Wiesbaden.
- ZINGEL, D. (1988): Die Entwicklung des Brutvogelbestandes im Schloßpark Wiesbaden-Biebrich (1957-1968 bis 1987). – *Luscinia*, **46**: 19–40; Frankfurt am Main.
- ZINGEL, D. (1990): Zum Vorkommen des Halsbandsittichs im Schloßpark von Wiesbaden-Biebrich. – *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, **112**: 7–23; Wiesbaden.
- ZINGEL, D. (1993): Zum Vorkommen des Halsbandsittichs im Schloßpark von Wiesbaden-Biebrich. – *Gef. Welt*, **117**: 64–66, 96–98; Bad Homburg.
- ZINGEL, D. (1997a): Zum Verhalten von Halsbandsittich und Alexander-Sittich (*Psittacula krameri* und *Psittacula eupatria*) im Schloßpark von Wiesbaden-Biebrich und in ihren Heimatländern. – *Orn. Mitt.*, **49**: 143–165; Schlangenbad.
- ZINGEL, D. (1997b): Halsbandsittich (*Psittacula krameri*), Alexandersittich (*Psittacula eupatria*), Mönchsittich (*Myopsitta monachus*). – In: *Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.): Avifauna von Hessen*, 3. Lieferung. – Abschn. 15.1.1.1 1-6, Abschn. 15.1.1.2 1–3, Abschn. 15.1.2.1 1-2; Echzell (Eigenverlag).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [SB_2](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Alphabetisches Verzeichnis der zitierten Literatur 213-223](#)