Literatur

AG "Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens" der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V. (BVNH) (2008): Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens, 4. Fassung – 188 S.; Wiesbaden (Auftraggeber/Herausgeber Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz).

AK Mykologie Bingen-Gaulsheim (2003-2014): Pilz-Fundlisten von Binger Wald, Ingelheimer Wald, Soonwald, Rheintal, Nahetal; Bingen-Gaulsheim.

ALTENKIRCH, F.-C. (1926): Lorch im Rheingau – Die Geschichte der Stadt vom Ursprung bis zur Gegenwart; 174 S.; Lorch (Stadtverwaltung).

ANDERLE, H.-J. (2007): Einblicke in die Geologie des Taunus zwischen Limburg und Wiesbaden. – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F., **89**: 123-149; Stuttgart.

ANDERLE, H.-J., MASSONE, H.J., MEISL, S., ONCKEN, O. & WEBER, K. (1990): Southern Taunus Mountains. – In: FRANKE, W. & WEBER, K. (Hrsg.): Field Guide Mid-German Crystalline Rise & Rheinisches Schiefergebirge. – Int. Conference on Paleozoic Orogens in Central Europe, Göttingen, Giessen, Aug. - Sept. 1990: 125-148; Göttingen, Gießen.

ARNOLD, E.N. & BURTON, J.A. (1979): Pareys Reptilien- und Amphibienführer Europas. – 270 S.; Hamburg, Berlin (Verlag P. Parey).

BAYRHOFFER, J.D.W. (1849): Übersicht der Moose, Lebermoose und Flechten des Taunus. – Jb. Ver. Naturkde. Herzogthum Nassau, **5**: 57-103; Wiesbaden.

BELÍN, V. (1999): Tagfalter, Widderchen und Glasflügler der Tschechischen und Slowakischen Republik. – 96 S., 34 z. T. doppelseitige Farbtafeln; Zlín (Vít Kabourek, Sokolská).

BELLMANN, H. (1993): Heuschrecken, beobachten, bestimmen, 2. Aufl. – 349 S.; Naturbuch-Verlag, Augsburg.

BÖHM, P., FRIEDRICH, K. & SABEL, K.- J. (2007): Die Weinbergsböden von Hessen. – Umwelt und Geologie, Böden und Bodenschutz in Hessen, **7**: 35 S.; Wiesbaden.

BREITENBACH, J. & KRÄNZLIN, F. (Hrsg.) (1984-2005): Pilze der Schweiz, Bde. 1-6; insgesamt 2123 S.; Luzern, Schweiz (Mykologia).

CARLÉ, W. (1975): Die Mineral- und Thermalwässer von Mitteleuropa. Geologie, Chemismus, Genese. Wispertal und seine Quelltäler. – S. 202; Stuttgart (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft).

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs – DVGW (2006): Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete, Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser. – DVGW-Regelwerk, Technische Regeln, Arbeitsblatt **W 101** Juni 2006, 19 S.; Bonn (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.).

DIETZ-LENSSEN, M. (2013): Die Mainzer Zeit des Rheingaus. Kurfürstliche Vergangenheit – Von Willigis bis Napoleon. – 192 S; Mainz (Verlag Bonewitz).

DUCHSCHERER, G.-I. (1962): Die Anfänge der Besiedlung des Rheingaus. – In: 75 Jahre Rheingaukreis. – 151-153; Rüdesheim (Kreisausschuss des Rheingaukreises).

EHMKE, W. (1989): Das Klima des Rheingau-Taunus-Kreises. – Heimatjahrbuch des Rheingau-Taunus-Kreises, **1989**: 47-57; Bad Schwalbach.

EHMKE, W. (2002): Die Witterung des Jahres 2001 in Westhessen. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **123**: 139-147; Wiesbaden.

EHMKE, W. (2011): Das Klima und die Pflanzen und Tierwelt von Lorchhausen und Umgebung. – In: AUGSTEIN, W., EHMKE, W., HOLDINGHAUSEN, F.-A., NIES, H. & POHL, E.: Lorchhausen – Geschichte und Geschichten eines Weindorfs. – 118-147; Lorch (Heimatverein Lorchhausen e. V.).

EHMKE, W., ANDERLE, H.-J. & SABEL, K.- J. (2008): Kurzer Überblick über die abiotischen Faktoren im Hohen Taunus. – Geobot. Kolloq., **21**: 3-8; Frankfurt am Main.

EHRENBERG, K.-H., KUPFAHL, H.-G. & KÜMMERLE, E. (1968): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25000 Blatt Nr. 5913 Presberg, 2. Aufl. – 201 S.; Wiesbaden.

ELLENBERG, H. & C. (1974): Wuchsklima-Gliederung von Hessen 1:200000 auf pflanzenphänologischer Grundlage; Wiesbaden (Hessischer Minister für Landwirtschaft und Umwelt).

FRANK, W.R. & ANDERLE, H.-J. (2001): Geologische Übersichtskarte 1:200000 CC 6310 Frankfurt a. M. West; Hannover (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe).

FREILIGRATH, F. (1844) (zitiert aus: Freiligraths gesammelte Werke. – Berlin, Leipzig, o. J.

FROMMER, U. (2014): Die Stechimmen-Fauna des Oberen Mittelrheintals. Neue Untersuchungen an xerothermen Hanglagen bei Lorch. – Hessische faunistische Briefe, **33**(1-3): 13-49, Darmstadt.

FUCHS, A. & LEPPLA, A. (1930): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, Lieferung 288 Blatt Bad Schwalbach. – 70 S.; Berlin (Preußische Geologische Landesanstalt).

GEIER, T. (1995): Neuere Beobachtungen zu gefährdeten und bemerkenswerten Lepidopteren im Gebiet des Rheingaus. — Nachr. entomol. Ver. Apollo, N.F., **15**: 439-469; Frankfurt/Main.

GRENZ, M. & MALTEN, A. (Bearb.)(1996): Rote Liste der Heuschrecken (Saltatoria) Hessens, 2. Fassung, Stand: September 1995. – 29 S.; Wiesbaden.

GRÖGER, F. (2006 u. 2014): Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze und Röhrlinge in Europa, Teil 1 und 2, Regensburger Mykologische Schriften Bde. 13 und 17. – insges. 1323 S.; Regensburg (Regensburgische Botanische Gesellschaft).

HAUSCH, I. (1999): Zippammern (Emberiza cia) im Rheingau. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **120**: 105-111; Wiesbaden.

HEIMES, P. (1993): Die Verbreitung der Reptilien im westlichen Taunus. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **114**: 41-57; Wiesbaden.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie – HLUG (2007): Bodenkarte von Hessen 1 : 50000, L 5912 Kaub, bfd50-65-l5912-07-12-05; Wiesbaden.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie – HLUG (2010): Karte und Bericht zur Gewässergütekarte 2010.
www.hlug.de –> Startseite › Wasser › Fließgewässer › Fließgewässer – Biologie

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie – HLUG (2013): Grundwasserbeschaffenheitsbericht 2012. – 87 S.; Wiesbaden.

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Verbraucherschutz - HMUKLV (2014): Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen – Maßnahmenprogramm 2015-2021.
www.flussgebiete.hessen.de > Öffentlichkeitsarbeit

Hessisches Statistisches Landesamt (Hrsg.) (2012): Flächennutzung Lorch/Rhein 2011 in %, Auszug aus der Hessischen Gemeindestatistik 2012; Wiesbaden.

HOLZAPFEL, E. & LEPPLA, A. (1904): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preußen und benachbarten Bundesstaaten, Lieferung 111 Blatt Caub. – 34 S.; Berlin (Königlich Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie).

HORAK, E. (2005): Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. – 555 S.; München.

HUME, R. (2013): Vögel in Europa. Über 500 Arten; London, New York, Melbourne, München, Dehli (Kindersley Verlag).

INGRISCH, S. & KÖHLER, G. (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 629. – 460 S.; Magdeburg.

Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) (2009): Masterplan Wanderfische Rhein – Bericht Nr. 179.
www.iksr.org

JÄGER, E.J. (Hrsg.) (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Aufl. – 930 S.; Heidelberg (Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg).

JEDICKE, E. (1992): Die Amphibien Hessens. – 152 S.; Stuttgart (E. Ulmer).

Knudsen, H. & Vesterholt, J. (Hrsg.) (2012): Funga Nordica, 2 Bde. – 1083 S.; Copenhagen, Dänemark (Nordsvamp).

KOCK, D. & J. ALTMANN (1999): Die Wildkatze (*Felis silvestris* SCHREBER 1777) im Taunus. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **120**: 5-21; Wiesbaden.

KORNECK, D. (1960): Das Mesobrometum collinum agrostidetosum tenuis (subass. nov.). – Hess. florist. Briefe, **100**: 13-16; Darmstadt.

KORNECK, D., SCHNITTLER, M., KLINGENSTEIN, F., LUDWIG, G., TAKLA, M., BOHN, U. & MAY, R. (1998): Warum verarmt unsere Flora? Auswertung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Deutsch-

lands. – Schriftenr. Vegetationskde., **29**: 299-444; Bonn – Bad Godesberg (Landwirtschaftsverlag).

KRIEGLSTEINER, G.J. (1994): Über neue und kritische Makromyceten in Deutschland XV - Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas Bd. IX: 107-108; Schwäbisch-Gmünd (Einhorn).

KRIEGLSTEINER, G.J. (Hrsg.) (2000-2010): Die Großpilze Baden-Württembergs, Bde. 1–5. – 3021 S.; Stuttgart (Ulmer).

KÜNNERT, R. (1965): Erster Nachtrag zu "Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete". — Entomol. Z., **75**: 105-113; Stuttgart.

KÜNNERT, R. (1969): Zweiter Nachtrag zu "Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete". — Entomol. Z., **79**: 136-137; Stuttgart.

LANGE, A. & ZEHM, A. (1993): Die Geradflüglerfauna (Insecta: Orthopteroidea und Blattopteroidea) von Nollig, Mückenkopf und Weiselberg bei Lorch am Rhein. – Hessische Faunistische Briefe, **13(2)**: 17-30; Darmstadt.

LEDERER, G., & KÜNNERT, R. (1961-1964): Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete. – Entomol. Z., **71** (1961): 173-204, 213-219, 261-276, **72** (1962): 25-40, 232-236, 237-250, **73** (1963): 189-194, 237-243, 253-260, 262-268, 271-280, **74** (1964): 5-16, 24-32, 39-41; Stuttgart.

Lepiforum: Bestimmungshilfe (umfangreiches Bildarchiv mit Fotos fast aller mitteleuropäischen Schmetterlingsarten).
www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Bestimmungshilfe

LÖTSCHERT, W. (1973): Pflanzengesellschaften im Rhein-, Main- und Taunusgebiet. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **102**: 16-68; Wiesbaden.

LUDWIG, E. (2007): Pilzkompendium, Bd. 2 (Textband, Abbildungsband). – 723 S; Berlin (FUNGICON).

LUDWIG, W. (1952): Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheide-Theorie. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **90**: 6-47; Wiesbaden.

LÜTGE, F. (1979): Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. – 644 S.; Berlin Heidelberg New York (Springer).

MAAS, S., DETZEL, P. & STAUDT, A. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken (Saltatoria) Deutschlands, 2. Fassung,

Stand Ende 2007. – Naturschutz und Biologische Vielfalt, **70(3)**: 577-606; Bonn-Bad Godesberg (Bundesamt für Naturschutz).

MEYER, W. & STETS, J. (1996): Das Rheintal zwischen Bingen und Bonn. – Sammlung Geologischer Führer, **89**: 386 S.; Berlin, Stuttgart (Gebr. Borntraeger).

MITTMEYER, H.-G. (1973): Die Hunsrückschiefer – Fauna des Wisper-Gebietes im Taunus. – Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., **101**: 16-45; Wiesbaden.

MITTMEYER, H.-G. (1978): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25000 Blatt Nr. 5813 Nastätten, 2., neu bearb. Aufl. – 112 S.; Wiesbaden.

NIEHUIS, M. (2006): Der Libellen-Schmetterlingshaft in Rheinland-Pfalz und Hessen. – Fauna und Flora Rheinland-Pfalz, **10(4)**: 1267-1302; Landau.

OBERDORFER, E. (Hrsg.) (1977–1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teile I – IV, 2. Aufl. – Jena, Stuttgart, New York (G. Fischer-Verlag).

Regierungspräsidium Darmstadt (2012): Lachs.
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/ => Umwelt & Verbraucher > Landwirtschaft/Weinbau > Fischerei > Fischartenschutz > Lachs

SCHARPFF, H.-J. (1968): VII Hydrogeologie. – In: EHRENBERG, K.-H., KUPFAHL, H.-G. & KÜMMERLE, E.: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen 1:25000 Blatt Nr. 5913 Presberg, 2. Aufl. – 110-125; Wiesbaden.

SCHNEIDER, J. (2014): Stand der Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses (*Salmo salar* L.) in der Wisper (Hessen). – Bericht für das Regierungspräsidium Darmstadt. – 65 S.; Frankfurt/M.

SCHÖLLER, H. (1996): Rote Liste der Flechten (Lichenes) Hessens. – Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz. – 76 S.; Wiesbaden.

SCHOTTHÖFER, A., SCHEIDT, N., BLUM, E. & RÖLLER, O. (2014): Tagfalter in Rheinland-Pfalz beobachten und erkennen. – 248 S., Farbabbildungen aller 131 Arten; Neustadt an der Weinstraße (Eigenverlag der POLLICHA).

SEMMEL, A. (1964): Junge Schuttdecken in hessischen Mittelgebirgen.– Notizbl. hess. L.-Amt. Bodenforsch., 92: 275-285; Wiesbaden.

SEMMEL, A. (2007): Das Quartär im Rhein-Taunus und im Oberen Mittelrhein-Tal. Kolluvien, Solifluktionsdecken, Laacher Bimstuff, Rhein-Terrassen (Exkursion F am 13. April 2007). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., NF., **89**: 217-233; Stuttgart.

SEUFERT, K.R. (1983): ...ist ein feins Ländlein. Eine Kulturgeschichte des Rheingaus von den Anfängen bis zur Gegenwart. – 255 S.; Eltville (Walther).

SÖDER, D. (2014): Kulturdenkmäler in Hessen, Rheingau-Taunus-Kreis I.2 (Altkreis Rheingau), Teilband 2: 608-697; Wiesbaden (Landesamt für Denkmalpflege).

STAMM, K. (1981): Prodromus der Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. – VI + 229 S; Solingen (Selbstverlag K. Stamm).

STEINER, A., RATZEL, U., TOP-JENSEN, M. & FIBIGER, M. (2014): Die Nachtfalter Deutschlands. – 878 S., 76 Farbtafeln; Østermarie (BugBook Publishing).

STELLWAAG sen., F. (1965): Die Pflanzenwelt des Rheingaues. – Das Rheingaubuch, **1**: 45-77; Rüdesheim/Rh.

STELLWAAG sen., F. (1983): Der Färberwaid (*Isatis tinctoria*) in Lorch und Umgebung. – In: Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung (Hrsg.): Heimatforschung, Heimatliebe. Der Rheingau in Geschichte, Kunst und Kultur. – 127-129; Mainz (Verlag Philipp von Zabern).

STENGEL-RUTKOWSKI, W. (1987): Die Säuerlinge des Westtaunus – Nachzügler eines neogenen Vulkanismus oder Vorboten künftiger tektonischer Aktivität? – Geol. Jb. Hessen, **115**: 331-340; Wiesbaden.

STENGEL-RUTKOWSKI, W. (2002): Trinkwasserversorgung aus Grubengebäuden des ehemaligen Bergbaus im Rheingau- Taunus- Kreis (Rheinisches Schiefergebirge). – Jb. nass. Ver. Naturkde., **123**: 125-**138**: Wiesbaden.

STRESEMANN, E. (1974): Exkursionsfauna für die Gebiete der DDR und der BRD – Band Wirbeltiere, 6. Aufl. – 370 S.; Berlin (Volk und Wissen-Verlag VEB).

STRUCK, W.-H. (1979): Die Bildung des Rheingau-Taunus-Kreises aus historischer Sicht. – Nass. Annalen, 90: 124-155; Wiesbaden.

STRUCK, W.-H. (1962): Überblick über die Geschichte des Rheingaus. – 75 Jahre Rheingaukreis. – 153-162; Rüdesheim (Kreisausschuss des Rheingaukreises).

STRUPPMANN, R. (1981): Chronik der Stadt Lorch im Rheingau. – 176 S.; Lorch Eltville (Maria Kaufmann Stiftung).

SVENSSON, L., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D. (2011): Der Kosmos-Vogelführer: Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens/IV, 2. Aufl.; Stuttgart (Kosmos).

TERBERGER, T. & WEIDENFELLER, M. (2012): Eiszeitjäger in der Landeshauptstadt. – Archäologische Denkmäler in Hessen, **173**: 24 S.; Wiesbaden.Frankfurt/M. (J.W. Goethe-Universität).

TISCHENDORF, S. & FROMMER, U. (2004): Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) an xerothermen Hanglagen im Oberen Mittelrheintal bei Lorch unter Berücksichtigung ihrer Verbreitung im Naturraum und in Hessen. – Hessische faunistische Briefe, **23(2-4)**: 25-122, Darmstadt.

TOUSSAINT, B. (1981): Ermittlung der Leerlaufkoeffizienten nach MAILLET und des effektiv nutzbaren Gesteinshohlraums in hessischen Flußgebieten durch Auswertung der Abflüsse im Trockenjahr 1976. – Dt. gewässerkdl. Mitt., **25**: 70-84; Koblenz.

TOUSSAINT, B. (2002): Hydrologisch relevante Geofaktoren im Wispergebiet unter Berücksichtigung der Witterung im Jahr 2001. – Jb. nass. Ver. Naturkde., **123**: 149-166; Wiesbaden.

TOUSSAINT, B. (2014): Abfluss der Wisper und Grundwasserverhältnisse im Westtaunus, speziell im Gebiet der Stadt Lorch a. Rh. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **135**: 109-144; Wiesbaden.

TOUSSAINT, B. & SALAY, G. (1979): Methodische Untersuchungen zur Ermittlung der Grundwasserneubildungsrate.– Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F. **61**: 193-249; Stuttgart.

UEBELER, M., EHMKE, W., NAWRATH, S., KÖNIG, A. & WITTIG, R. (2008): Ergebnisse der floristischen Kartierung im Hohen Taunus. – Geobot. Kolloq., **21**: 23-42; Frankfurt/M. (J.W.Goethe-Universität).

VAN DEN BRINK, F.H. (1975): Die Säugetiere Europas, 3. Aufl. – 271 S.; Hamburg, Berlin (Verlag P. Parey).

VOLK, O. (1998): Wirtschaft und Gesellschaft am Mittelrhein vom 12. bis zum 16. Jh. – Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau, **63**: 1041 S.; Wiesbaden.

WACHMANN, E. & SAURE, C. (1997): Netzflügler, Schlamm- und Kamelhalsfliegen: Beobachtung, Lebensweise. – 159 S.; Augsburg (Naturbuch-Verlag).

WetterKontor: www.wetterkontor.de/de/monatswerte-station.asp?id=10637.

WIRTH V., HAUCK, M. & SCHULTZ, M. (2013): Die Flechten Deutschlands, 2 Bände. – 1244 S.; Stuttgart (Ulmer).

WIRTH, V., HAUCK, M., DE BRUYN, U., SCHIEFELBEIN, U., JOHN, V. & OTTE, V. (2009): Flechten aus Deutschland mit Verbreitungsschwerpunkt im Wald. – Herzogia, 22: 79-107; Halle.

WIRTH, V., HAUCK, M., BRACKEL, W. VON, CEZANNE, R., DE BRYUN, U., DÜRHAMMER, O., EICHLER, M., GNÜCHTEL, A., JOHN, V., LITTERSKI, B., OTTE, V., SCHIEFELBEIN, U., SCHOLZ, P., SCHULTZ, M., STORDEUR, R., FEUERER, T. & HEINRICH, D. (2011): Rote Liste und Artenverzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt, **70(6)**: 7-122; Bonn-Bad Godesberg.

ZOSKE, S. (2009): Wasser-Wacht an der Wisper. – Reportagen aus der Umwelt. – 14 S.; Wiesbaden (Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: SB_3

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Literatur 291-299