

Pupina ephippium Gredl., sehr klein und kuglig. — Von Pao-tschin-fu: Buliminus Hunancola Gredl., die grössere, narbige Form. — Von Yuen-chou-fu im Westen von Hunan: Stenogyra (Opeas) Fortunei Pfr.; ich sah diese Art bisher nur hyalin.

II. Aus der Provinz K u e i - t s c h e u , ausser den früher aufgeführten Novitäten: *Helix chinensis* var. *accrescens* Heude, grösser als Heude's Abbildung, unweit der Provinzial-Hauptstadt gesammelt; — *Moussonia Paxillus* Gredl., bei Thien-heu-san.

Diagnosen neuer Arten.

Von
H. v. Maltzan.

1. *Helix (Zenobia) saxivaga* n. sp.

Aff. *H. montivagae* West., sed. t. multo majore, multo magis globosa, pro latitudine altiore, anfractu ultimo non angulato lentius accrescente, ante aperturam minus dilatato. Apert. fere altiore quam latiore.

Alt. 8—9 $\frac{1}{2}$, diam. min. 9 $\frac{1}{2}$, maj. 10 $\frac{1}{2}$ —11; alt. apert. 5 $\frac{1}{2}$ —6, lat. apert. 5 $\frac{1}{2}$ —6 mm.

Hab. Boliqueime Olhao, Silves, Algarve.

2. *Helix Cynetarum* n. sp.

T. conico-depressa, umbilicata, umbilico modico, solidissima, griseo-cornea, albido indistincte radiata, late albocingulata; spira humilis, convexo-conica; apex minimus, acutiusculus. Anfr. 6 $\frac{1}{2}$, arcte voluti, superne subconvexi, inferne convexi, sutura impressa disjuncti, substriati, ultimus subangulatus, ante aperturam zona annulari aurantiaca cinetus. Apert. parum obliqua, rotundata, vix excisa, labio crassissimo, albo, subremoto, superne bisulcato exstructo.

Alt. 5 $\frac{1}{2}$, diam. maj. 9; alt. apert. 4, lat. apert. 4 $\frac{1}{2}$ mm.
Hab. Boliqueime, Algarve.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Maltzan Hermann, Freiherr zu Wartenberg und Penzlin

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten. 235](#)